

헤모퀸퓨어 캡슐

Fe 철 결핍성 빈혈의 예방 및 치료

복용하시기 전에 설명서를 주의깊게 읽어보시고, 반드시 제품과 함께 보관하십시오.

[제품명] 헤모퀸퓨어캡슐

[원료약품 및 그 분량] 1캡슐(390.0 mg) 중

■유효성분 : 폴리사카리드철착염(KP) 76.1 mg(철로서 35 mg), 시아노코발라민 1000배산(KP) 12.0 mg(시아노코발라민으로서 12 μ g), 폴산(KP) 0.5 mg, 토코페롤아세이트2배산(KP) 50.0 mg(비타민 E로서 25 IU)

■첨가제(동물유래성분) : 유당수화물(소, 우유)

■기타 첨가제 : 경질무수규산, 스테아르산마그네슘, 전분글리콜산나트륨, 캡슐

[성상] 회색의 분말이 충전된 상, 하부 적갈색의 경질캡슐제

[효능·효과] 1. 다음 경우의 비타민 E의 보급 – 노년기 2. 철 결핍성 빈혈의 예방 및 치료

[용법·용량] 만 8세 이상 및 성인 : 1일 1회, 1회 1캡슐 복용

[사용상의 주의사항]

1. 경고

1) 철 함유제제는 만 6세 이하의 어린이가 사고로 과량 복용하였을 경우 중독성 사망을 일으킬 수 있으므로 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것

- 1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
- 2) 만 12개월 미만의 젖먹이
- 3) 혈색소증(철대사 이상으로 철이 간장, 췌장(이자)에 침착하는 질환), 헤모시데린침착증, 비철결핍성 빈혈
- 4) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

3. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것

1) 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제

4. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것

- 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 2) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
- 3) 소화성궤양, 만성궤양성대장염, 국한성대장염 등의 위장질환 환자
- 4) 심장 순환기계기능 장애 환자
- 5) 신장장애 환자
- 6) 저단백혈증 환자

5. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것

- 1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우 : 위부불쾌감, 설사, 변비, 발진, 발적, 두드러기, 가려움, 광선과민반응, 복부·위통증, 경련, 구토, 열, 혼수
- 2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있다.
- 3) 에스트로겐을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전성 소인이 있는 환자가 비타민 E를 복용할 경우 혈전증의 위험이 증가될 수 있다.
- 4) 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B12를 1일 10 μ g 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있다.
- 5) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈심부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다.
- 6) 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용투여시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것

7) 우발적으로 과량복용 한 경우

8) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

6. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것

2) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피할 것

7. 저장상의 주의사항

1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것

2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것


3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃)보관


[포장단위] 30캡슐/PTP(10캡슐/PTP*3), 60캡슐/PTP(10캡슐/PTP*6)

[제조사] 경남제약(주) 충청남도 아산시 신창면 서부남로790번길 49

※ 개봉방법



① 포장 뒷면의 절취선을 따라 1정씩 자르세요.



② 모서리의 표시된 부분을 화살표 방향으로 벗깁니다.

※ 기타주의

1. 허가된 효능·효과와 다른 용도로 사용시에는 예상하지 못한 부작용이 나타날 수 있습니다.

2. 사용기한이 지난 제품은 변질의 우려가 있으므로 복용을 금하시기 바랍니다.

3. PTP포장을 개봉하여 복용시 가끔 캡슐에 포장물이 같이 따라오는 경우가 있으니 복용시 캡슐에 포장물이 있는지 꼭 확인하시고 복용하시기 바랍니다.

※ 올바른 사용법을 모르거나 의문사항이 있는 경우 의사·약사 및 자사 소비자 상담실로 문의하시기 바랍니다.

(소비자 상담전화 : 080-232-8600, www.kyungnampharm.com)

※ 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오염된 제품이 발견될 경우 공정거래위원회고시 “소비자분쟁 해결 기준”에 의거 구입한 곳에서 교환 또는 환불받을 수 있습니다.

※ 의약품의 용어설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 의약품통합정보시스템 「<https://nedrug.mfds.go.kr>」 → 「의약품 등 검색」을 참조하시기 바랍니다.

※ 의약품 사용 후 부작용 발생 시 한국의약품안전관리원에 피해구제 신청을 할 수 있습니다. 부작용 보고 및 피해구제 신청 : 한국의약품안전관리원(1644-6223, 14-3330)

경남제약(주)