



8 806581 087100



【원료약품 및 그 분량】 1정(1060 밀리그램) 중

유효성분:

푸르셀티아민(KP)	60 mg
벤포티아민(KP)(티아민염산염으로서 43.38 mg)	60 mg
비스벤티아민(KP)(티아민염산염으로서 3.5 mg)	4 mg
콜린타르타르산염(별규)	100 mg
리보플라빈부티레이트(KP)	50 mg
니코틴산아미드(KP)	100 mg
판토텐산칼슘(KP)	50 mg
이노시톨(KP)	100 mg
피리독살포스페이트수화물(KP)	50 mg
폴산(KP)	0.4 mg
메코발라민(KP)	1 mg
d-비오틴(USP)	0.2 mg
콜레칼시페롤농축분말(EP)(비타민 D로서 1000 IU)(동물유래성분: 양, 양모).....	10 mg
산화마그네슘(KP)(마그네슘으로서 30.16 mg).....	50 mg
산화아연(KP)(아연으로서 12.85 mg).....	16 mg
감마-오리자놀(KP)	5 mg
유비데카레논(KP)	10 mg
셀레늄함유건조효모(KP)(셀레늄으로서 20.0 ug)	37.04 mg

첨가제: 경질무수구산, 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 크로스카르멜로스나트륨, 탭셀드빨간색(99R1259), 폴리에틸렌글리콜6000, 히드록시프로필셀룰로오스

【성상】 적갈색의 타원형 필름코팅정

【효능·효과】

○ 다음 경우의 비타민 D, B₁, B₂, B₆의 보급

— 육체피로 — 임신·수유기 — 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력 저하 시

— 발육기 — 노년기

— 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같다.

- 뼈, 이의 발육불량
- 구루병의 예방
- 다음 증상의 완화: 신경통, 근육통, 관절통(요(허리)통, 어깨결림 등), 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염
- 각기 · 눈의 피로

【용법·용량】 만 12세 이상 및 성인: 1일 1회, 1회 1정 복용

【사용상의 주의사항】

1) 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

- (1) 고칼슘혈증(hypercalcemia: 혈액중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태) 환자, 유육종증(sarcoidosis: 원인을 알 수 없는 전신 염증질환), 신장(콩팥)질환 환자 (2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자 (3) 만 12개월 미만의 젖먹이 (4) 신장(콩팥) 결석 환자 (5) 심한 증상의 신부전 환자

2) 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.

(1) 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제 (2) 레보도파

3) 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

- (1) 의사의 치료를 받고 있는 환자 (2) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아 ① 비타민 D는 모유로 분비되어 산생아에게 고칼슘혈증을 일으킬 수 있다. (3) 소화성궤양, 만성궤양성대장염, 국한성(특정 부분에 나타나는)대장염 등의 위장질환 환자 (4) 심장·순환기계기능 장애 환자 (5) 신장(콩팥)장애 환자 (6) 저단백혈증 환자 (7) 신장(콩팥)결석 병력이 있는 환자 (8) 임부

4) 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

- (1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우: 구역, 구토, 설사, 묽은 변, 구내염(입안염), 식욕부진, 복부(배부분)팽만감, 붉은 반점, 부전수축(심장박동정지), 중추신경계 기능 저하, 피부염, 땀 · 호흡 시 약취, 탈모, 조급증, 위장관장애, 소화장애, 상복부통증, 저혈압, 폐부종 (2) 파라독신을 1일 500mg ~ 2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy: 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있다. (3) 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B₁₂를 1일 10ug 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있다. (4) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당내성) 손상(glucose tolerance impairment: 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 고요산혈증(hyperurisemia, 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있다. (5) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈성부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다. (6) 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용(함께 복용)투여 시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것. (7) 우발적으로 과량복용 한 경우 (8) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

5) 기타 이 약의 복용 시 주의사항

- (1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지킬 것
- (2) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있다.
- (3) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피할 것

6) 저장상의 주의사항

- (1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것. (2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것. (3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【사용기간】 제조일로부터 36개월

【포장단위】 60정/병, 120정/상자(60정/병×2)

【소비자상담실】 02-521-2618

【제조판매원】 (유)한풍제약 / 전북특별자치도 완주군 봉동읍 완주산단6로 301, 봉동로 705

※ 본 의약품은 "우수의약품 제조 및 품질관리기준(KGMP)"에 따라 제조 및 품질검사를 한 의약품입니다. 만약 구입시 사용(유효)기한이 경과하였거나, 변질 · 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.

※ 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 의약품안전나라(<https://nedrug.mfds.go.kr>)를 참조하십시오.

※ 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽어야 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.

※ 본 제품 사용 후 부작용(이상반응)이 발생한 경우 한국약품안전관리원(1644-6223)에 문의하여 부작용 피해구제 신청을 할 수 있습니다.

개정년월일 : 2025년 10월 21일