

시클로베린 정

[원료약품 및 그 분량] 1정 중

유효성분 : 디시클로민염산염(KP) ----- 5mg

파파베린염산염(USP) ----- 15mg

첨가제(동물유래성분): 유당수화물(소, 우유)

기타첨가제: 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 전분글리콜산나트륨

[성 상] 흰색의 원형 정제

[효능·효과]

위통, 복통(배아픔), 산통, 위산과다, 속쓰림

[용법·용량]

성인(만 15세 이상) : 1회 2정 1일 2 ~ 3회, 만 8세 이상 ~ 만 15세 미만 : 1회 1정 1일 2 ~ 3회 식후 또는 식간에 복용한다.

다만, 1일 2회 이상 복용시에는 4시간 이상의 간격을 두고 복용한다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

1) 만 7세 이하의 어린이

2) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스

흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.

스코폴리아 엑스 함유 제제 및 다른 위장진통 · 진경제

3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

1) 약으로 알레르기 증상(발진, 충혈되어 붉어짐, 가려움 등)을 일으킨 일이 있는 사람

2) 심장장애 환자, 녹내장(눈의 통증, 눈의 침침함 등) 또는 당뇨병에 환자, 허약자 또는 고령자

3) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성

4) 다른 약물을 복용하고 있는 사람

4. 다음과 같은 사람(경우) 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사,치과의사,약사와 상의할 것.상담시 이 첨부문서를 소지할 것.

1) 이 약을 복용함으로써 알레르기 증상(발진, 가려움 등)이 나타날 경우

2) 이 약을 복용함으로써 구갈, 변비의 증상이 나타날 수 있다. 또 두통, 안면홍조, 눈부심, 당뇨병에 등이 나타날 경우

3) 여러차례 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지킬 것.

2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도 감독하에 투여할 것

3) 이 약을 복용함으로써 시야몽롱, 눈부심 등이 나타날 수 있으므로 자동차운전 등 위험이 수반되는 기계조작을 하지 않도록 주의할 것

6. 저장상의 주의사항

1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.

2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에(밀폐하여) 보관할 것

3) 오용(잘못사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것

[저장방법] 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

[사용기간] 제조일로부터 36 개월

[포장단위] 10 정/피티피

[제조사] (주)시어스제약 / 경기도 화성시 향남읍 발안공단로 32

[판매자] 보령컨슈머헬스케어(주) / 서울 종로구 창경궁로 136

* 올바른 복용법을 모르거나 의문사항이 있는 경우는 의사·약사와 상담하십시오.

* 본 의약품은 "우수약품제조관리기준(KGMP)" 에 따라 엄격하게 품질관리를 실시한 제품입니다.

만약 구입 시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패, 오염 또는 손상된 제품은 구입한 장소에서 교환하여 드립니다.

* 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽어야 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하시기 바랍니다.

* 의약품을 어린이 손에 닿지 않는 장소에 보관합니다.

* 사용(유효)기한이 지난 의약품은 사용하지 않도록 합니다.

* 이 설명서 작성(개정)일 이후 변경된 내용 및 기타 자세한 의약품 정보는 의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>)에서 확인할 수 있습니다.

* 기타 자세한 사항이나 문서의 작성일자 이후 변경된 내용은 소비자상담실(070-4227-2316)로 문의하시기 바랍니다.

* 부작용 피해구제 신청 : 한국의약품안전관리원(1644-6223/14-3330)