

조제용|일반의약품

판다이제정



500정

 **건일바이오팜(주)**

원료약품 및 그 분량 1정 중 •유효성분 : 판크레아틴(KP)…175mg(전분당화력 1654 단위 이상, 지방소화력 677 단위 이상, 단백소화력 22365 단위 이상)(동물 유래성분 : 건강한 돼지의 췌장), 셀룰라제(KP)…50mg(섬유소당화력 60 단위 이상), 우르소데옥시콜산(KP)…10mg, 시메티콘(KP)…25mg, •첨가제(타르색소) : 청색1호, 황색203호, •첨가제(동물유래성분) : 유당수화물(건강한 소의 우유), •기타 첨가제 : 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 이산화규소, 전분글리콜산나트륨, 크로스카멜로오스나트륨, 탭실드녹색 (39G1527), 폴리에틸렌글리콜 6000, 히드록시프로필셀룰로오스, 히프로멜로오스 **성상** 연녹색의 타원형 장용성 필름코팅 정 **효능·효과** 소화불량, 식욕감퇴(식욕부진), 과식, 체함, 소화촉진, 소화불량으로 인한 위부팽만감 **용법·용량** 만 15세 이상 : 1회 2정, 1일 3회 식후에 복용한다. **사용상의주의사항** 1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것. 1) 만 7세 이하의 어린이 2) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해소결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactosemalabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다. 2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 1) 본인 또는 가족이 알레르기 체질인 사람 2) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성 3) 다른 약물을 복용하고 있는 사람 3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것. 2주 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우 4. 기타 이 약의 복용 시 주의사항 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것. 5. **저장상의 주의사항** 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것. 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에(밀폐하여) 보관할 것. 3) 오용(잘못사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

저장방법 밀폐용기, 실온보관(1~30℃) **포장단위** 피티피 - 10정/상자(10정/피티피*1), 피티피 - 20정/상자(10정/피티피*2), 피티피 - 100정/상자(10정/피티피*10), 피티피 - 200정/상자(10정/피티피*10 상자*2), 병 - 500정/병, 병 - 1000정/병 **제조의뢰자** 건일바이오팜주식회사 충청남도 천안시 서북구 직산읍 거리막길 33 제일동 **제조사 (주)노바엠헬스케어** 경상북도 경산시 하양읍 지식산업4로 16-53

•부작용 피해구제 신청 : 한국의약품안전관리원(1644-6223, 14-3330) •이 약을 사용하시기 전에 반드시 본 라벨을 읽어주시기 바랍니다. •반드시 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. •올바른 사용법을 모르거나 의문사항이 있는 경우 반드시 의사·약사와 상담 후 사용하십시오. •본 제품의 모든 문의사항(품질관련)은 (02)714-0091로 연락하시기 바랍니다. •만약 구입시 사용(유효)기한이 지났거나 변질·변패·오염되었거나 손상된 의약품은 약국개설자 및 의약품 판매업자에게만 교환하여 드립니다. •본사는 제조물 책임법 시행에 따라 고객상담 전용창구(전화 080-719-2000)를 운영하고 있습니다. •최신의 정보 확인방법 : 이 라벨의 작성년월일 이후로 변경된 내용은 홈페이지(www.kuhnilbiopharm.com)에서 확인할 수 있습니다. •의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품정보는 의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>)을 참조하시기 바랍니다.

작성년월일 : 2025.09.16

제조번호
사용기한
207838

35x18mm



(01) 08800730017215