

BGMP

KGMP

일반의약품

분류번호 799

인체해독제

뉴흑(黑)
캡슐

【약용탄】

[원료약품 및 그 분량] 1캡슐(287mg) 중

주성분 : 약용탄(K.P).....200mg

결합제 : 옥수수전분 / 교미제 : 올리브유 / 착향제 : 유칼리유

[성상]

흑색 과립이 충전된 상하부 무색 투명한 경질 캡슐제

용기 : PE

[효능·효과]

급성 설사의 보조적 치료요법

[용법·용량]

1회 3~4캡슐을 물과 함께 복용하며 1일 최대 12캡슐까지 복용할 수 있다.

소아에서 유효성 및 안전성에 대해 확인되지 않았다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용(사용)하지 말 것

- 1) 위장관폐쇄가 있거나, 장폐쇄로 의심되는 증상이 있는 환자
- 2) 급성 복통이 있거나 궤양성 대장염이 있는 환자
- 3) 이 약의 구성성분에 과민성이 있는 환자
- 4) 열성 설사 환자
- 5) 소아

2. 이 약을 복용(사용)하는 동안 다음의 약을 복용(사용)하지 말 것

- 1) 이 약의 주성분인 약용탄은 일반적으로 다른 약물의 효과를 감소시킬 수 있다.
- 2) 이 약은 호르몬성 경구 피임제의 효과를 감소시킬 수 있다.
이 약을 복용할 경우 추가적인 피임방법을 사용한다.

3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용(사용)하기 전에 의사와 상의할 것

- 1) 이 약의 주성분인 약용탄은 일반적으로 다른 약물의 효과를 감소시킬 수 있으므로, 고혈압약이나 류마티스약 등 다른 약을 일상적으로 복용하는 환자는 이 약을 복용하기 전에 의사와 상의하도록 한다.
- 2) 이 약은 의사의 진단·처방없이 당뇨병 환자에게는 사용하지 않는다.
- 3) 임신 혹은 수유시에 이 약을 투여하는 것과 관련하여서는 안전성이 확립된 바 없다.
- 4) 소아에게 알려진 위험은 없다.
- 5) 노인의 경우 체중감소 등에 주의하며, 일반적으로 종종 생리학적 기능이 저하되는 경우가 있다.

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용(사용)을 즉각 중지하고 의사와 상의할 것. 상담시 가능한한 이 첨부문서를 소지할 것.

이 약을 복용한 지 2~3일이 지나도 증상이 개선되지 않거나 재발하는 경우 원인을 확인하기 위해 이 약의 복용을 중지하고 의사와 상의하도록 한다.

5. 기타 이 약의 복용(사용)시 주의할 사항

- 1) 이 약은 변을 검게 착색시킬 수 있다.
- 2) 이 약의 투여로 인해 변비가 발생할 수 있다.
- 3) 이 약을 장기간 연속하여 복용할 경우 비타민류 및 광물질 등의 흡착에 의해 영양장해가 일어날 수 있다.

6. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 2) 직사광선을 피하고 가능한한 습기가 적고 서늘한 곳에 보관할 것.
- 3) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용에 따른 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

[사용 기간] 제조일로부터 36개월

[포장 단위] 300 캡슐/병, 240 캡슐/상자((4캡슐/포60)), 120 캡슐/상자((4캡슐/포30))

[저장 방법] 기밀용기, 실온 (1~30°C)보관

※본 제품은 우수 의약품제조업의 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 변질, 변패, 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 본사나 구입 약국을 통하여 교환하여 드립니다.



(주) 돌나라 한농제약

Doalnara Hannong Pharmaceutical Co., Ltd

경북 상주시 외서면 낙원동길 147

소비자 상담실 : 054) 536-4474~5

www.hannongph.com

2025.10 (NCN-1호)