

· 반드시 첨부문서를 읽은 후 사용(복용)하시고 첨부문서는 약과 함께 보관하십시오.
· 올바른 사용(복용)법을 모르거나 의문사항이 있는 경우, 의사·약사와 상담하시기 바랍니다.

일일반의약품
KGMP적격업체

근육경련 및 말초순환 개선제

마그네타
연질캡슐

마그네슘 | 셀레늄 | 토코페롤 함유

MAGNETAR
soft capsules

【원료약품 및 그 분량】 1캡슐 중

유효성분 : 산화마그네슘(KP) 350.00 mg
(마그네슘으로서 211.09mg)
토코페롤아세테이트(KP) 300.00 mg
(비타민E로서 300IU)
셀레늄함유건조효모(KP) 92.59 mg
(셀레늄으로서 50µg)

첨가제(타르색소): 적색40호, 청색1호, 황색5호

첨가제(동물유래성분): 숙신산젤라틴(소/돼지, 가축)

기타 첨가제: 농글리세린, 레시틴, 산화티탄, 아자경화유, 콩기름, 폴리소르베이트80, 황납

【성상】 회백색의 유상내용물을 함유한 암갈색의 장방형 연질캡슐

【효능·효과】

- 다음 경우의 비타민 E 의 보급
· 노년기
· 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같습니다.
· 말초혈행장애 및 갱년기시 다음 증상의 완화 : 어깨·목결림, 수족저림·수족냉증(손발이 차가움)

2. 마그네슘결핍으로 인한 근육경련

3. 셀레늄의 보급

【용법·용량】

만 12세 이상 및 성인 1회 2회, 1회 1캡슐 복용

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

- 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
- 만 12개월 미만의 젖먹이
- 심한 증상의 신부전 환자
- 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
- 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.

인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제

3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.

- 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
- 소화성궤양, 만성궤양성대장염, 국한성(특정 부분에 나타나는) 대장염 등의 위장질환 환자
- 심장·순환기계기능 장애 환자
- 신장장애 환자
- 저단백혈증 환자
- 임부
- 이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여할 것.
- 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 췌장염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

- 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우
 - 위부불쾌감, 설사, 변비, 발진, 발적(충혈되어 붉어짐)
 - 붉은 반점, 설사, 부전수축(심장박동정지), 중추신경계 기능저하

- ③ 피부염, 땀·호흡시 악취, 탈모, 조급증, 구토
- 2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있다.
- 3) 에스트로겐을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전성 소인이 있는 환자가 비타민 E를 복용할 경우 혈전(혈관막힘)증의 위험이 증가될 수 있다.
- 4) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 유헤심부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다.
- 5) 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용(함께 복용(사용))투여시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것.
- 6) 우발적으로 과량복용 한 경우
- 7) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
- 2) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피할 것.
- 3) 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자가 이 약을 복용할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장한다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절한다. 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 한다.

6. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 (밀폐하여) 보관할 것.
- 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃) 보관

【포장단위】 60캡슐/상자(10캡슐/PTP X 6)

【제조회자】 동화약품(주) / 충청북도 충주시 충주산단1로 167

【제조자】 코스맥스파마(주) / 충청북도 제천시 바이오밸리3로 30 일부

【문의전화】 본사: 02-2021-9300, 소비자상담실: 080-023-1897(수신자요금부담)

※ 본 의약품은 KGMP 품질관리를 필한 제품입니다. 구입시 사용기한 또는 유효기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우 공정 거래위원회 고시 소비자 분쟁해결기준에 의거, 구입처를 통하여 교환 또는 환불 받을 수 있습니다. 본 의약품에 대한 자세한 허가사항은 동화약품(주) 홈페이지(www.dong-wha.co.kr)를 참조해주시기 바랍니다.

※부작용 보고 및 피해구제 신청: 한국의약품안전관리원(1644-6223) / 의약품 피해구제 상담: 14-3330

※이 첨부문서 작성일자(2025년 11월 07일) 이후 변경된 내용은 www.dong-wha.co.kr 에서 확인하실 수 있습니다.

01M2511



동화약품
SINCE 1897