

PRODUCT NAME	자미솔정
TYPE	설명서 (양면)
PAPER	-
SIZE	120 x 210 mm
COLOR	먹

표기 폰트 사이즈 : 8pt / 장평 90% / 자간 -5
(Rev:251015)

※ 이 약을 복용하시기 전에 사용설명서를 자세히 읽어 주시고, 의약품과 함께 보관하여 주십시오.
※ 의약품을 처방된 증상·환자 이외에는 사용하지 말고, 어린이 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

비습관성 수면유도제

자미솔정

독시라민속신산염

일반의약품

원료약품 및 분량

[유효성분] 1정(131 밀리그램) 중
독시라민속신산염(USP) 25mg

[첨가제]

첨가제(동물유래성분): 유당수화물(소, 우유)
기타첨가제: 경질무수규산, 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 전분글리콜산나트륨, 탭설드흰색(29W925)

성상 : 흰색 내지 거의 흰색의 원형 필름코팅정제

효능·효과 : 불면증의 보조치료 및 진정

용법·용량

성인 : 독시라민속신산염으로서 1일 1회 25mg을 반드시 수면 30분전에 경구투여한다.
연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

사용상의 주의사항

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것

- 1) 폐기종, 만성 기관지염 천식 등의 호흡장애 환자
- 2) 녹내장 환자
- 3) 전립선(전립샘) 비대 환자
- 4) 수유부
- 5) 15세 이하의 소아
- 6) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당) 분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
- 7) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
- 8) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것

이미프라민계 항우울약, 항파킨슨제, 디소피라미드와 병용(함께 복용)시 소변축적, 변비 등의 이상 반응이 증가 할 수 있으므로 주의한다.

3. 이 약을 복용하는 동안 다음의 행위를 하지 말 것

- 1) 의사 또는 약사와 상의 없이 다른 약물과 병용(함께 복용)하거나 2주 이상 투여하지 않는다.
- 2) 과도한 진정이 나타날 수 있으므로 고소작업이나 자동차 운전 등 위험이 수반되는 기계조작을 하지 않도록 주의한다.
- 3) 음주 후 또는 음주 시에 이 약을 투여하지 않는다.

4. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 약사와 상의할 것

- 1) 임부 및 임신을 하고 있을 가능성이 있는 사람
- 2) 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 췌장염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자

5. 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항

- 1) 때때로 항콜린작용이 나타날 수 있다.
- 2) 이 약 투여 시 졸음이 올 수 있으므로 취침 시에 투여한다.
- 3) 낮에 졸음이 나타날 경우에는 용량을 감소한다.
- 4) 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장한다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절한다. 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제 의 투여량을 감소해야 한다.

6. 저장상의 주의사항

- 1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 2) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관한다.

저장방법 : 차광기밀용기, 실온(1~30℃)보관

포장단위 : 10정/피티피

사용기간 : 제조일로부터 36개월

※ 본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한(유효기한)이 경과되었거나, 변질·변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.
※ 의약품 용어 설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(nedrug.mfds.go.kr)을 참조하세요.
※ 내용 외 부작용이 나타날 경우 의사나 약사 또는 식품의약품안전처로 연락하시고, 부작용 보고 및 피해구제신청은 한국의약품안전관리원(1644-6223) 및 피해구제 제도 전용 상담번호(14-3330)에서 할 수 있습니다.
※ 첨부문서 작성일자 이후 변경된 내용은 www.chodang.com 또는 전화 02-2206-3800에서 확인할 수 있습니다.

소비자 상담전화 : 080-302-3000(수신자 부담)

제조판매자 : 초당약품공업(주) 경기도 안산시 단원구 별망로 381