

심중 복합 통증 솔루션

페인썙크트리플정

아세트아미노펜 · 아스피린 · 카페인 복합 진통제



두통

치통

인후통

관절통

【원료약품 및 그 분량】 1정(1,030mg) 중

■ 유효성분:

아세트아미노펜(KP) 325mg, 아스피린(KP) 500mg, 카페인무수물(KP) 50mg

■ 첨가제: 미결정셀룰로오스, 스테아르산나트륨, 오파드라이틴색(20A680000),

전분글리콜산나트륨, 히드록시프로필셀룰로오스

【성상】 흰색의 타원형 필름코팅정

【효능·효과】

1) 두통, 치통, 발치(이를 뽑음) 후 통증(통증), 인후(목구멍)통, 귀의 통증, 관절통, 신경통, 요(허리)통, 근육통, 건통(아깨결림), 타박통, 골절통, 염좌통(뱀 통증), 월경통(생리통), 외상(상처)통의 진통

2) 오한(춥고 떨리는 증상), 발열 시의 해열

【용법·용량】

만 15세 이상 및 성인: 1일 1~3회, 1회 1정 공복(빈 속) 시를 피하여 복용한다. 복용간격은 1일 2회 복용 시 6시간 이상, 1일 3회 복용 시 4시간 이상으로 한다.

【사용상의 주의사항】

1. 경고

- 1) 매일 세잔 이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열진통제를 복용해야 할 경우 반드시 의사 또는 약사와 상의해야 한다. 이러한 사람이 이 약을 복용하면 간손상 및 위장출혈이 발생할 수 있다.
- 2) 아세트아미노펜을 복용한 뒤에서 다음 두통에 응급 전신성 발진성동맥염 증후군(급성 전신성 발진성 고열병증후군(AEP), 스티븐스-존슨 증후군(SJS), 표피 괴사증후군(TEN)과 같은 중대한 피부 반응이 보고되었고 이러한 피부 반응은 치명적일 수 있다. 따라서 이러한 중대한 피부 반응의 징후에 대하여 환자들에게 충분히 알리고 이 약 투여 후 피부발진이나 다른 과민반응의 징후가 나타나면 즉시 복용을 중단하도록 하여야 한다.
- 3) 이 약은 아세트아미노펜을 함유하고 있다. 아세트아미노펜으로 일일 최대 용량(4,000mg)을 초과할 경우 간손상을 일으킬 수 있으므로 이 약을 일일 최대 용량(4,000mg)을 초과하여 복용하여서는 안 되며, 아세트아미노펜을 포함하는 다른 제제와 함께 복용하여서는 안 된다.

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

- 1) 이 약 및 이 약의 구성성분에 대한 과민반응 및 그 병력이 있는 사람
- 2) 이 약 및 이 약의 구성성분, 다른 해열진통제, 감기약 복용 시 전신을 일으킨 적이 있는 사람
- 3) 만 15세 미만의 어린이

3. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.

다른 해열진통제, 감기약, 진정제

4. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의 할 것.

- 1) 수두 또는 인플루엔자에 감염되어 있거나 또는 의심되는 영아(젖먹이, 갓난 아기) 및 만 15세 미만의 어린이(유아)나 구토를 수반하는 행동의 변화가 있다면, 드물지만 심각한 치명인 레이지증후군의 초기 증상일 수 있으므로 의사와 상의할 것.
- 2) 빈, 양치 또는 혀 등 두드러기, 점층성피부염, 기관지천식, 알레르기 성비염(코염), 편두통, 음식물알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람
- 3) 지금까지 약에 의해 알레르기 증상에: 발열, 발진, 관절통, 천식, 가려움증 등을 일으킨 적이 있는 사람
- 4) 간질환, 신장(콩팥)질환, 심장질환, 갑상선질환, 당뇨병, 고혈압 등이 있는 사람, 몸이 약한 사람 또는 고령이 있는 사람
- 5) 고령자(노인)
- 6) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부(임신 30주 이후 생리

실신나트륨, 살리실아미드, 아스피린, 아스피린알루미늄, 살리실산칼린, 이부프로펜 성분 함유 제제의 투여가 권고되지 않는다.

- 7) 의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람(당뇨약, 통풍약, 관절염약, 항응고제, 스테로이드제 등 다른 약물을 투여 받고 있는 사람)
- 8) 속쓰림, 위부(상복부)불쾌감, 위통과 같은 위장문제가 지속 혹은 재발되거나 궤양, 출혈문제를 가지고 있는 사람
- 9) 구토와 설사로 많은 수분을 손실하거나 수분을 흡수하지 않는 사람 또는 이뇨제를 복용하는 사람
5. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉시 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의 할 것. 상당 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.
 - 1) 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타날 경우: 발진·발적(종혈되어 붉어짐), 가려움, 구역·구토, 식욕부진, 변비, 위통, 소화불조, 위부(상복부)불쾌감, 어지러움, 난청(귀먹음), 부종(부기), 이명(귀울림), 고음(이소) 대사성 산증(HAGMA)
 - 2) 이 약의 복용에 의해 다음에 아래의 증상(심한 증상) 증상이 나타날 경우: ① 속(나비멀스): 복용 후 바로 두드러기, 부종(부기), 가슴 답답함 등과 함께 안색이 창백하고, 손발이 차고, 식은땀, 숨이 곤란할 등이 나타날 수 있다. ② 피부반응이 있을 경우: 스티븐스-존슨 증후군, 중증표피괴괴상증후군(레일 증후군): 고열을 동반하고, 발진·발적(종혈되어 붉어짐), 화상과 같이 물집이 생기는 등의 심한 증상(이소)이 나타날 수 있다. ③ 천식: ④ 간기능장애: 전신의 다른 황달(피부 또는 눈의 흰자위가 황색을 띠게 됨) 등이 나타날 수 있다.
 - 3) 5~6회 복용하여도 증상이 좋아지지 않을 경우
6. 소아에 대한 투여

만 2세 미만에게 투여하지 않는다. 다만, 꼭 필요한 경우 의사의 진료를 받는다.
7. 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항
 - 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
 - 2) 장기간 계속 복용하지 말 것.
 - 3) 복용 시에는 음식물 잘 씹을 것.
 - 4) 바로 복용해 약을 삼킬 경우 환우증 및 알코올을 투여한 환자는 다량의 아세트아미노펜을 대사시키는 능력이 감소되어 아세트아미노펜의 혈장 반감기를 증가시킬 수 있다.
 - 5) 아세트아미노펜과 플루로록사실린의 병용(함께 복용(사용))투여에서 피로로 루타인 산증으로 인한 고음이온차 대사성 산증(High anion gap metabolic acidosis, HAGMA)이 보고되었다. 가장 위험도가 높은 환자는 패혈증, 중증(심한 증상)의 신기능 장애, 영양실조 등 기저질환이 있는 환자이며, 이 환자들은 한 가지 또는 두 가지 약물을 모두 중단한 후에 호전되었다. 이 약과 플루로록사실린을 동시에 복용할 경우 주의를 기울여야 하고 HAGMA가 의심되면 이 약 및/또는 플루로록사실린 투여를 중단한다.
8. 저장상의 주의사항
 - 1) 어린이의 손에 닿지 않는 장소에 보관할 것.
 - 2) 직사광선을 피하고 물 수 있는 한 공기 건조 서늘한 곳에 보관할 것.
 - 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

【저장방법】 기밀용기, 실온보관(1~30℃)

【포장단위】 10정/상자(10정/PTP×1)

【제품문의처】 (유)한정제약 소비자상담실(02-521-2618)

【제조판매원】 (유)한정제약/전북특별자치도 완주군 봉동읍 완주산단6로 301, 봉동로 705

26-019

※ 본 약품은 "우수의약품 제조 및 품질관리기준(GMP)"에 따라 제조 및 품질검사를 한 의약품입니다. 만약 구입 시 사용(유효기간)이 경과하여도, 변질·변태 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

※ 약품용, 용어설명 및 기타 자세한 약품 정보는 의약품안전나라(<https://nedrug.mfds.go.kr>)를 참조하십시오.

※ 약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽어와서, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.

※ 본 첨부서 작성일(2026년 01월 09일) 이후에 변경된 내용은 소비자 상담실변호(02-521-2618)에서 확인하실 수 있습니다.

※ 본 제품 사용 후 부작용(이상반응)이 발생한 경우 한국약물안전관리원(1644-6223)에 문의하여 부작용 피해구제 신청을 할 수 있습니다.

※ 제품 개봉시 또는 취급 시에 포장재(용기, 케이스)에 상처를 입을 수 있으니 주의하십시오.