

비사큐민장용연질캡슐

이 약을 복용하기 전에 사용설명서를 주의 깊게 읽으시고, 약과 함께 보관하십시오.

[원료약품 및 분량] 이 약 1 캡슐(405 mg) 중

· 유효성분 : 비사코딜(KP) 6.00 mg
우르소데옥시콜산(JP) 10.00 mg
도큐세이트나트륨(USP) 21.00 mg

· 첨가제(동물유래성분) : 젤라틴(돼지, 가축)

· 첨가제(타르색소) : 청색 1호, 황색 5호, 황색 203호

· 기타 첨가제 : 농글리세린, 비결정성소르비톨액, 산화티탄, 아자경화유, 조합항료(천연베리허브향오일(CMXO)), 콩기름, 펙틴, 폴리소르베이트80, 황납

[성상] 미황색의 유상 내용물을 함유한 녹색의 타원형 연질캡슐

[효능·효과]

· 변비
· 변비에 따른 다음 증상의 완화: 식욕부진(식욕감퇴), 복부팽만, 장내이상발효, 치질

[용법·용량]

15세 이상 및 성인: 1회 1~2 캡슐씩 1일 1회 취침 시(공복 시) 복용한다.

다만, 초회(처음 복용)는 최소량을 복용하고 변의 모양과 상태를 보면서 조금씩 증량(양을 늘림) 또는 감량(줄임)한다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

- 1) 급성 복부질환(충수염, 장출혈, 궤양성 결장염 등) 환자
- 2) 장폐색(장자막힘) 환자
- 3) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
- 4) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약(식품)을 복용하지 말 것.

제산제 또는 우유 섭취 후 1시간 이내.

3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

- 1) 심한 복통(배 아픔) 또는 구역, 구토 환자
- 2) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성
- 3) 다른 약물을 복용하고 있는 사람
- 4) 나트륨 제한식이를 하고 있는 사람
- 5) 직장의 출혈 혹은 장부전의 병력이 있는 사람
- 6) 고지단백혈증, 당뇨병성고지혈증 및 췌장염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자
- 7) 이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF) 및 황색203호(퀴놀린옐로우 WS, Quinoline Yellow WS)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

- 1) 이 약을 복용함으로써 발진·충혈되어 붉어짐, 가려움, 심한 복통(배아픔), 설사, 구토 등이 나타날 경우
- 2) 이 약을 복용함으로써 복부불쾌감, 경련이 일어날 경우
- 3) 1주 정도 투여하여도 변비의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
- 2) 반드시 필요한 경우 이외에는 만 10세 이하의 어린이는 복용을 피하는 것이 바람직하다.
- 3) 장기간 계속 사용시 약물에 대한 내성이 증가하고 변비가 악화될 수 있으므로 1주일 이상 계속 사용해서는 안 된다. 만약 매일 변비약이 필요한 상태라면 변비의 원인을 조사할 것.
- 4) 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장 지질치를 점검할 것을 권장한다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절한다. 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 한다.

6. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관할 것.
- 3) 오용(잘못사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

[저장방법]

기밀용기, 실온(1~30℃)보관

[사용기간]

제조일로부터 24개월

[포장단위]

20캡슐(10캡슐/PTP X 2개)

[제조사] 코스맥스파미(주) 충청북도 제천시 바이오밸리3로 30 일부

[제조·유통·판매자] (주)제이비케이랩 전라남도 화순군 동면 동농공길 17

※ 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 의약품안전나라(<https://nedrug.mfds.go.kr>)를 참조하십시오.
※ 본 사용설명서 작성일자 이후 변경된 내용은 의약품안전나라(<https://nedrug.mfds.go.kr>) 또는 소비자 상담전화 1522-1194에서 확인하실 수 있습니다.
※ 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 교환 또는 보상 받을 수 있습니다.
※ 구입 시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패, 오염되거나 손상된 의약품은 구입처를 통하여 교환 또는 환불하여 드립니다.
※ 사용기한이 지난 의약품을 사용하지 마십시오.
※ 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
※ 부작용보고 및 피해구제 신청: 한국의약품안전관리원 (1644-6223, 14-3330)

I01-507400

첨부문서 개정 연월일 : 2025.12.19

CellMed[®]
PHARMACEUTICAL