

맥비비 플러스

활성형 비타민 B군 함유

비타민 B·C·D·E + 코큐텐, 아연, 셀레늄,
UDCA, 마그네슘, 감마-오리자놀 함유

[원료약품 및 분량] 1정 중

· 유효성분: 벤포티아민(KP) (티아민염산염으로서 72.31 mg)	100mg
리보플라빈부티레이트(KP)	12mg
니코틴산아미드(KP)	100mg
판토텐산칼슘(KP)	100mg
피리독살포스페이트수화물(KP)	10mg
히드록스코발라민아세트산염(KP) (히드록스코발라민으로서 10 µg)	0.01045mg
비오틴(USP)	0.1mg
폴산(KP)	0.1mg
콜린타르타르산염(별규)	10mg
아노시톨(KP)	30mg
아스코르브산(KP)	50mg
토코페롤아세테이트 2배산(KP) (비타민D로서 20 IU)	40mg
농축콜레칼시페롤(분말형)(EP) (비타민D로서 1000 IU)	10mg
셀레늄함유건조효모(KP) (셀레늄으로서 13.5 µg)	25mg
산화마그네슘(KP) (마그네슘으로서 18 mg)	30mg
산화아연(KP) (아연으로서 16 mg)	20mg
유비데카레논(KP)	5mg
감마-오리자놀(KP)	10mg
우르소데옥시콜산(KP)	10mg

· 첨가제(동물유래) : 유당수화물(기원동물 : 소, 사용부위 : 우유)

· 기타첨가제 : 미결정셀룰로오스, 히드록시프로필셀룰로오스, 저차한도히드록시프로필셀룰로오스, 전분글리콜산나트륨, 콜로이드성 이산화규소, 스테아르산마그네슘, 탭실드렌셀(19W623), 탭실드칼셀(99B722)

[성상] 적갈색의 장방형 필름코팅정

[효능 · 효과]

1. 다음 경우의 비타민 D, E, B1, B2, B6, C의 보급

- 육체피로
- 임신 · 수유기
- 병중 · 병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하시
- 발육기
- 노년기

2. 이 약에 함유된 비타민 등의 효능 · 효과는 다음과 같습니다.

- 뼈, 이의 발육불량
- 구루병의 예방
- 각기
- 눈의피로
- 다음 증상의 완화 : 신경통, 근육통, 관절염(요(허리) 통, 어깨결림 등), 구각염(입꼬리염), 구순염(입술 염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염

3. 아연의 보급

[용법 · 용량]

만 8세 이상 및 성인 : 1일 1회, 1회 1정 식후 복용합니다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.

- 고칼슘혈증(hypercalcemia) : 혈액중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태)환자, 유육종증(sarcoidosis : 원인을 알 수 없는 전신 염증질환), 신장(콩팥)질환 환자
- 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
- 만 12개월 미만의 젖먹이
- 신장(콩팥)결석 환자
- 심한 증상의 신부전 환자
- 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 됩니다.

또는 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 마십시오.

- 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제
- 레보도파
- 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과 의사, 약사와 상의하십시오.
- 만 1세 미만의 젖먹이
- 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 햇빛을 많이 보고 정상적인 식사를 하는 어린이
- 고옥살산뇨증 환자(hyperoxaluria : 요중에 과량의 수산염 이 배설되는 상태)
- 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
- ① 비타민 D는 모유로 분비되어 산생아에게 고칼슘혈증 을 일으킬 수 있습니다.
- ② 소화성궤양, 만성궤양성대장염, 국한성대장염 등의 위장질환 환자
- 심장 · 순환기계기능 장애 환자
- 신장(콩팥)장애 환자
- 저단백혈증 환자
- 통풍환자 또는 신장(콩팥)결석이 있는 환자
- ① 신장(콩팥)결석 병력이 있는 환자
- ② 임부

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과 의사, 약사와 상의하십시오, 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오.

- 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우 : 구역, 구토, 설사, 위부불쾌감, 변비, 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 붉은 변, 식욕부진, 복부팽만감, 붉은 반점, 부전수축(심장박동정지), 중추신경계 기능저하, 피부염, 땀 · 호흡시 악취, 탈모, 조급증, 위장관장애, 소화장애, 상복부통증, 저혈압, 폐부종
- 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있습니다.
- 에스트로겐을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 월경(월경 막힘)성 소인이 있는 환자가 비타민 E를 복용할 경우 혈전(혈관 막힘)증의 위험이 증가될 수 있습니다.
- 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있습니다.
- 피리독신을 1일 500 mg ~ 2 g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있습니다.
- 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B12를 1일 10 µg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있습니다.
- 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당내성) 손상(glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 고요산혈증(hyperursemia, 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있습니다.
- 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈성부전 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있습니다.
- 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용투여시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의하십시오.
- 우발적으로 과량복용 한 경우
- 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

- 정해진 용법 · 용량을 잘 지키십시오.
- 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도·감독하에 투여 하십시오.
- 각종 요점사이에 혈당의 검출을 방해할 수 있습니다.
- 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있습니다.
- 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피하십시오.

6. 저장상의 주의사항

- 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 (밀폐하여) 보관하십시오.
- 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30 ℃)보관

[포장단위] 60 정/병, 120 정/상자(60정/병 x 2ea)

※ 본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 구입 시 사용기한이 경과하였거나 변질 · 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다. “소비자 피해보상규정”에 의거 소비자의 정당한 피해는 보상하여 드립니다.
 ※ 의약품 부작용 피해구제신청은 한국약물관리안전관리원(1644-6223)에 할 수 있습니다.
 ※ 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽어야 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하시기 바랍니다.
 ※ 사용(유효)기한이 지난 의약품은 사용하지 않도록 합니다.
 ※ 작성일자 이후 변경된 내용은 의약품안전나라(nedrug.mids.go.kr) 또는 031)314-0329(소비자상담실)에서 확인할 수 있습니다.

[제조외의 및 판매처] (주)씨엘지제약 / 경기도 시흥시 공단1대로27번길 27

[제조자] 경방신약(주) / 인천광역시 남동구 남동대로 394