

실리스칸정 350밀리그램

(밀크시슬열매건조엑스)

[원료약품 및 그 분량] 1정 중

- 유효성분
밀크시슬열매건조엑스(생규).....350밀리그램 (실리마린으로서 192.5mg)
- 첨가제(동물유래성분): 유당수화물(소,우유)
- 기타첨가제: D-만니톨, 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 콜로이드성이산화규소, 크로스카멜로오스나트륨, 탭설드빨간색(99R1126),히드록시프로필셀룰로오스

[성상]

적갈색의 장방형 필름코팅정

[효능·효과]

다음질환의 보조치료: 독성 간질환, 만성간염, 간경변

[용법·용량]

성인: 1회 1정 복용한다.

[사용상주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

- 심한 담도(쓸개길) 폐쇄 환자
- 이 약의 과민증 환자
- 12세 이하의 소아
- 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수 장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

임부, 수유부

3. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

상당시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

- 드물게 위통 또는 설사
 - 매우 드물게 피부발진, 호흡 곤란의 과민 반응
4. 이 약의 복용시 주의할 사항
- 정해진 용법·용량을 지킬 것
 - 황달의 경우에는 의사 또는 약사와 상의할 것
 - 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우나 장기복용시에는 의사 또는 약사와 상의할 것

5. 저장상의 주의사항

- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것
- 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여(뚜껑을 꼭 닫아) 보관할 것
- 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 의한 사고발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것

[저장방법] 기밀용기, 실온보관(1~30℃)**[포장단위]** 120정/상자(60정/병X2), 300정/병**[사용기간]** 제조일로부터 24개월**[소비자상담]** 080-550-8308~9(수신자 부담전화)(www.daewoong.co.kr)**[제조자]** 엔비케이제약(주) 충남 천안시 동남구 풍세면 풍세로 539**[판매자]** (주)대웅제약 서울시 강남구 봉은사로 114길 12(삼성동)

※ 본 의약품은 KGMP(의약품 제조 및 품질관리기준)에 의하여 엄격한 관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용(유효)기한이 경과되었거나 변질, 변패, 오염되거나 손상된 제품이 발견될 경우 공정거래위원회고시 소비자 분쟁해결기준에 의거, 구입처를 통하여 교환 또는 환불 받을 수 있습니다.

※ 의약품을 복용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽으시고, 첨부문서는 의약품과 함께 보관하여야 합니다.

※ 본 의약품에 대한 자세한 허가사항은 식품의약품안전처 의약품 통합정보시스템 (<https://nedrug.mfds.go.kr>)에서 확인할 수 있습니다.

※ 첨부문서에 기재되지 않은 부작용이 나타날 경우 의사나 약사 또는 한국의약품안전관리원 (1644-6223, 14-3330)에 알려주시기 바랍니다.

첨부문서 작성년월일 : 2025.10.20

0A325-00

[제조자]**엔비케이제약(주)**
NEO BIO KOREA PHARM. CO., LTD.**[판매자]****대웅제약**