

이부프로펜 함유, 액상으로 빠른 효과

# 종합 감기에 이부퀵콜드 연질 캡슐

※ 의약품은 사용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽고, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.

## [원료약품 및 그 분량] 1정중

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| *유효성분                      |         |
| 이부프로펜(KP).....             | 75mg    |
| 덱스트로메토판브롬화수소산염수화물(KP)..... | 8 mg    |
| 슈도에페드린염산염(USP).....        | 15 mg   |
| 구아이페네신(KP).....            | 41.6mg  |
| 브롬헥신염산염(BP).....           | 2 mg    |
| 클로르페니라민말레산염(KP).....       | 1.25 mg |

## \*기타첨가제

농글리세린, 부분탈수유동소르비톨, 부틸하이드록시톨루엔, 수산화칼륨, 적색40호, 정제수, 젤라틴, 청색1호, 포비돈 K30, 폴리소르베이트80, 폴리리덴글리콜400, 프로필렌글리콜

[성상] 미황색의 투명한 액이 든 적색의 투명한 타원형 연질캡슐

[용법・용량] 만 15세 이상 및 성인 : 1일 3회, 1회 2캡슐, 식후 30분에 복용  
만 8세 이상 ~ 만 15세 미만 : 1일 3회, 1회 1캡슐, 식후 30분에 복용

[효능・효과] 감기의 증상(코물, 코막힘, 재채기, 기침, 가래, 오한, 발열, 두통, 관절통, 근육통)의 완화.

## [사용상의 주의사항]

### 1) 경고

(1) 슈도에페드린 함유 제제 복용 시 급성 전신성 발진성 농포증(AGEP)과 같은 중증 피부 이상반응이 나타날 수 있다. 발열, 홍반, 다수의 작은 농포와 같은 증상이 관찰될 경우 이 약의 복용을 중단하고 의사 또는 약사와 상의해야 한다.

### 2) 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

- (1) 이 약 및 이 약의 구성성분에 대한 과민반응 및 그 병력이 있는 사람
- (2) 이 약 및 이 약의 구성성분, 다른 해열진통제, 감기약 복용 시 천식을 일으킨 적이 있는 사람
- (3) 만3개월 미만의 영아
- (4) MAO억제제(항우울제, 항정신병제, 감정조절제, 항파킨슨제 등)를 복용하고 있거나 복용을 중단한 후 2주 이내의 사람
- (5) 중증 또는 조절되지 않는 고혈압 환자

### 3) 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.

진해거담제, 다른 감기약, 해열진통제, 진정제, 항히스타민제를 함유하는 내복약(비염용 경구제, 말미약, 알레르기용약)

### 4) 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

- (1) 수두 또는 인플루엔자에 감염되어 있거나 또는 의심되는 영아 및 만 15세 미만의 어린이(구역이나 구토를 수반하는 행동의 변화가 있다면, 드물지만 심각한 질병인 레이중후군의 초기 증상일 수 있으므로 의사와 상의할 것.)
- (2) 슈도에페드린 성분과 관련하여 허혈성 대장염의 증상(급격한 복통, 직장 출혈 등)이 발현될 경우
- (3) 본인, 양친 또는 형제 등이 두드러기, 접촉성피부염, 기관지천식, 알레르기성비염, 편두통, 음식물알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람
- (4) 지금까지 약에 의해 알레르기 증상(예: 발열, 발진, 관절통, 천식, 가려움증 등)을 일으킨 적이 있는 사람
- (5) 간장질환, 신장질환, 심장질환, 갑상선질환, 당뇨병, 고혈압, 녹내장(예: 눈의 통증, 눈이 침침함 등), 배뇨곤란 등이 있는 사람, 고령자, 몸이 약한 사람 또는 고열이 있는 사람
- (6) 속쓰림, 위부불쾌감, 위통과 같은 위장문제가 지속 혹은 재발되거나 궤양, 출혈문제를 가지고 있는 사람
- (7) 구토와 설사로 많은 수분을 손실하거나 수분을 흡수하지 않는 사람 또는 이노제를 복용하는 사람
- (8) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부 (임신 30주 이후 살리살산나트륨, 살리살아미드, 아스피린, 아스피린알루미늄, 살리살산 폴린, 이부프로펜 성분 함유 제제의 투여가 권고되지 않는다)

(9) 의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람(당뇨약, 통풍약, 관절염약, 항응고제, 스테로이드제 등 다른 약물을 투여 받고 있는 사람)

(10) 다음과 같은 기침이 있는 사람

흡연, 천식, 만성 기관지염, 폐기종, 과도한 가래가 동반되는 기침, 1주 이상 지속 또는 재발되는 기침, 만성 기침, 발열 발진이나 지속적인 두통이 동반되는 기침

### 5) 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

- (1) 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우  
발진·발적, 가려움, 구역·구토, 식욕부진, 변비, 위통, 소화관출혈, 위부불쾌감, 부종, 배뇨곤란, 목마름(지속적이거나 심한), 어지러움, 불안, 떨림, 불면
- (2) 이 약의 복용에 의해 드물게 아래의 중증 증상이 나타난 경우  
① 속(아나필락시스) : 복통후 바로 두드러기, 부종, 가슴답답함 등과 함께 안색이 창백하고, 손발이 차고, 식은땀, 숨쉬기 곤란함 등이 나타날 수 있다.  
② 피부점막만증후군(스티븐스-존슨증후군), 중독성표피괴사증후군(리엘증후군) : 고열을 동반하고, 발진·발적, 화상과 같이 물집이 생기는 등의 심한 증상이 전신피부, 입이나 눈점막에 나타날 수 있다.
- ③ 천식
- ④ 가역적 후회 병증 증후군 및 가역적 뇌혈관 수축 증후군 : 갑작스러운 심한 두통, 빈개 두통, 구역, 구토, 혼돈, 발작, 시각 장애 등이 발현될 수 있다.
- (3) 5~6회 복용하여도 증상이 좋아지지 않을 경우
- (4) 빈도 불명의 코니스 증후군이 나타날 수 있다.

### 6) 소아에 대한 투여

만2세 미만에게 투여하지 않는다. 다만, 꼭 필요한 경우 의사의 진료를 받는다.

### 7) 기타 이 약의 복용 시 주의사항

- (1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
- (2) 장기간 계속 복용하지 말 것.
- (3) 어린이에게 복용시킬 경우에는 보호자의 지도 감독하에 복용시킬 것.
- (4) 복용시에는 음주하지 말 것.
- (5) 복용하는 동안 졸음이 오는 경우가 있으므로 자동차 운전 또는 기계류의 운전 조작을 피할 것.
- (6) 동물실험에서 브롬헥신염산염을 장기간 다량 연속 투여할 경우 혈청 중에 아미노산전이효소와 가래양이 일시적으로 상승한다는 보고가 있다.
- (7) 이 약을 복용하면 일시적으로 가래 양이 증가하는 경우가 있다.
- (8) 이 약 투여 환자에서 코니스 증후군 사례가 보고되었다. 코니스 증후군은 관상동맥 수축과 관련이 있는 알레르기 또는 과민반응 후 발생하는 심혈관계 증상으로 심근경색을 초래할 수 있다.

### 8) 저장상의 주의사항

- (1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- (2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 (밀폐하여) 보관할 것.
- (3) 오용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

[저장방법] 기밀용기, 실온보관(1~30 ℃)

[사용기간] 제조일로부터 24개월

[포장단위] 10캡슐(10캡슐/PTP), 20캡슐(10캡슐/PTP)×2

※본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질·변패·오염되거나 손상된 제품은 약국 개설자 또는 의약품 판매업자에 한하여 교환하여 드리며, 공정거래위원회에서 고시한 소비자분쟁해결기준에 의거, 정당한 피해에 대해 보상해 드립니다.  
※이 내용은 소비자의 안전한 선택을 위해 허가사항을 요약한 것으로 복용 전 반드시 첨부문서 또는 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(<http://ps://nedrug.mfds.go.kr>)에서 확인할 수 있습니다.  
※의약품 부작용 신고 및 피해구제 신청: 한국의약품안전관리원(1644-6223, 14-3330)

개정년월일:2025년12월04일

### [제조자]

**DONGBANG FTL**  
동방메프디엘㈜ | 경기도 화성시 향남읍 제약공단 4길 78

### [판매자]

**온누리Health**  
(주)온누리에이치앤씨 | 서울시 양천구 목동서로 159-1, 13층