



(시트룰린말산염)
M01

일반의약품 조 제 용



[원료약품 및 그 분량] 1정 중

- 유효성분 : 시트룰린말산염(별규) 500mg
- 기타첨가제 : 메타규산알루미늄산마그네슘, 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 침강탄산칼슘, 카르나우바납, 크로스포비돈, 톨크, 톱실드노란색(29Y1543), 톱실드흰색(11W001)

[성상] 노란색의 타원형 필름코팅정

[효능·효과] 기능 무력증의 보조치료

[용법·용량] 성인 : 시트룰린말산염으로서 1회 2정, 1일 3회 복용한다.
소아(6세이상) : 시트룰린말산염으로서 1회 2정, 1일 2회 복용한다.
단, 4주 이상 투여하지 않는다.

[사용상의 주의사항]

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
6세 미만의 유아
- 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 이 첨부문서를 소지할 것.
 - 임부(동물실험에서 기형발생은 보고되지 않았으며 임상에서도 기형발생 또는 태자독성이 보고된 바 없으나 임신 중 투여에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으므로 임신 중에는 투여하지 않는 것이 바람직하다.)
 - 수유부(유즙 분비에 대한 자료가 없으므로 이 약은 수유부에게 투여하지 않는 것이 바람직하다.)
 - 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의할 것
- 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항
 - 정해진 용법·용량을 지킬 것.
 - 소아에 투여할 경우에는 보호자의 지도 감독 하에 복용시킬 것
 - 드물게 투여초기에 약한 위장관 장애가 나타날 수 있다.
- 저장상의 주의사항
 - 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
 - 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용에 의한 사고발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

[포장단위] 84정/병

[제조·의뢰자] 하나제약(주) 경기도 화성시 향남읍 제약단지 13-39

[제조사] (주)한국팜비오 충청북도 충주시 대소원면 첨단산업9로 36

- ※ 의약품 용어 설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 하나제약(주) 홈페이지(www.hanaph.co.kr)를 참조하세요.
- ※ 만약 구입 시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품을 구입하였을 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
- ※ 소비자 상담전화 : 080-577-8004(수신자 요금부담서비스)
- ※ 부작용 피해구제 신청은 한국약품안전관리원(1644-6223, 14-3330)으로 문의바랍니다.

작성 연월일 : 2025. 11. 25. <M01>



하나제약주식회사
하길공장 : 경기도 화성시 향남읍 제약단지 13-39

