

기능 무력증 보조 치료제
라이트시트룰정
(시트룰린말산염)

OPIS126(00)

기능 무력증 보조 치료제

라이트시트룰정 (시트룰린말산염)

일반의약품 조제용

따로 분류되지 않는 대사성 의약품

※ 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽어야 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.

[원료약품 및 분량] 이 약 1정 중

· 유효성분 : 시트룰린말산염(별규) 500mg
· 기타 첨가제 : 메타규산알루미늄산마그네슘, 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 침강탄산칼슘, 카르나우바남, 크로스포비논, 탭크, 탭실드노란색(29Y1543), 탭실드흰색(11W001)

[성상] 노란색의 타원형 필름코팅정

[효능·효과] 기능 무력증의 보조치료

[용법·용량]

성인 : 시트룰린말산염으로서 1회 2정, 1일 3회 복용한다.
소아(6세이상) : 시트룰린말산염으로서 1회 2정, 1일 2회 복용한다.
단, 4주 이상 투여하지 않는다.

[사용상의 주의사항]

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
6세 미만의 유아
- 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상당 시 가능한 이 첨부문서를 소지할 것.
1) 임부(동물실험에서 기형발생은 보고되지 않았으며 임상에서도 기형발생 또는 태자독성이 보고된 바 없으나 임신 중 투여에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으므로 임신 중에는 투여하지 않는 것이 바람직하다.)
2) 수유부(유즙 분비에 대한 자료가 없으므로 이 약은 수유부에게 투여하지 않는 것이 바람직하다.)
3) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의할 것.
- 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항
1) 정해진 용법·용량을 지킬 것.
2) 소아에 투여할 경우에는 보호자의 지도 감독 하에 복용시킬 것.
3) 드물게 투여초기에 약한 위장관 장애가 나타날 수 있다.
- 저장상의 주의사항
1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
2) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용에 의한 사고발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

[저장방법] 기밀용기, 실온보관(1~30℃) [사용(유효)기간] 제조일로부터 36개월 [포장단위] 42정/병, 84정/병

※ 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
※ 이 약을 사용하기 전에 반드시 본 설명서를 읽어주시기 바랍니다.
※ 본 설명서를 잘 보관하여 필요한 경우 참조하시기 바랍니다.
※ 이 제품 설명서 작성년월일 이후 변경된 내용은 소비자상담실(02-801-8570)로 문의하시거나 또는 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>)에서 확인할 수 있습니다.
※ 부작용 피해구제 신청을 한국의약품안전관리원(1644-6223, 14-3330)에서 할 수 있습니다.
※ 육안으로 이물질이 발견될 시 사용하지 마십시오.

설명서 작성년월일 : 2025년 11월 27일
OPIS126(00)

[제조의뢰자]


Bio Frontier
LitePharmTech
(주)라이트팜텍

경기도 평택시 청북읍 고령산단로 89

[제조사]


(주)한국팜비오
PharmBio Korea Inc.

충청북도 충주시 대소원면 첨단산업로 36