

벤토마셀정

활성 비타민·비타민B₁₂ 감마오리자놀을 함유한
근육경련 및 혈액순환 개선제



6806890019311

[제품명] 벤토마셀정

[원료약품 및 그 분량] 1정 중

- 유효성분 : 벤포티아민(KP) 50mg(티아민염산염(으)로서 36.2mg)
셀레늄함유건조효모(KP) 25mg(셀레늄(으)로서 13.5ug)
산화마그네슘(KP) 500mg(마그네슘(으)로서 301.5mg)
γ-오리자놀(KP) 5mg
메코발라민(JP) 1000ug
산화아연(KP) 18.7mg(아연(으)로서 15mg)
피리독신염산염(KP) 25mg
토코페롤아세테이트 2배산(KP) 100mg(비타민E(으)로서 50IU)
- 기타첨가제 : 경질무수구산, 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 크로스포비돈, 툴, 톱실드흰색(19W623), 톱실드갈색(59B346), 히드록시프로필셀룰로오스

[성 상] 갈색의 장방형 필름코팅정

[효능·효과]

- 다음 경우의 비타민 B1, B6, E 의 보급
 - 육체피로
 - 임신·수유기
 - 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하 시
 - 노년기
- 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같다.
 - 다음 증상의 완화 : 신경통, 근육통, 관절통(요(허리)통, 어깨결림 등)
 - 각기
 - 눈의피로
- 마그네슘결핍으로 인한 근육경련
- 아연의 보급

[용법·용량] 성인 : 1일 1회, 1회 1정 복용한다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

- 1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
- 2) 만 12개월 미만의 젖먹이
- 3) 심한 증상의 신부전 환자
- 4) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
- 5) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.

- 1) 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제
- 2) 레보도파

3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

- 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자

- 2) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
- 3) 소화성궤양, 만성궤양성대장염, 국한성 대장염 등의 위장질환 환자
- 4) 심장·순환 기계기능 장애 환자
- 5) 신장장애 환자
- 6) 저단백혈증 환자
- 7) 임부
- 8) 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 혈장염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

- 1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우 : 구역, 구토, 뱀·호흡시 악취, 묽은 변, 발적, 발진, 변비, 상복부 통증, 설사, 소화장애, 위부불쾌감, 위장관장애, 저혈압, 조급증, 탈모, 폐부종, 피부염
- 2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있다.
- 3) 에스트로겐을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전성 소인이 있는 환자가 비타민 E를 복용할 경우 혈전증의 위험이 증가될 수 있다.
- 4) 피리독신을 1일 500 mg ~ 2 g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있다.
- 5) 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B12를 1일 10 μg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있다.
- 6) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈성부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다.
- 7) 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용투여시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것.
- 8) 우발적으로 과량복용 한 경우
- 9) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
- 2) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피할 것.
- 3) 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈청지질치를 점검할 것을 권장한다.
 - 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절한다.
 - 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 한다.

6. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 (밀폐하여) 보관할 것.
- 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

[저장방법] 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

[사용기간] 제조일로부터 36개월

[포장단위] 120정/병(60정/병x2)

- ※ 올바른 복용법을 모르거나 의문사항이 있는 경우는 의사·약사와 상담하십시오.
- ※ 본 의약품은 "우수의약품제조관리기준(KGMP)"에 따라 엄격하게 품질관리를 실시한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패, 오염 또는 손상된 제품은 구입한 장소에서 교환하여 드립니다.
- ※ 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽어야 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하시기 바랍니다.
- ※ 의약품을 어린이 손에 닿지 않는 장소에 보관합니다.
- ※ 기타 자세한 사항이나 문서의 작성일자 이후 변경된 내용은 소비자상담실(070-4227-2316)로 문의하시기 바랍니다.
- ※ 이 설명서 작성(개정)일 이후 변경된 내용 및 기타 자세한 의약품 정보는 의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>)에서 확인할 수 있습니다.
- ※ 부작용 피해구제 신청 : 한국 의약품안전관리원(1644-6223/14-3330)

설명서 작성일자 : 2026.04.06(00)

[제조자] (주)시어스제약 / 경기도 화성시 만세구 향남읍 발안공단로32 **G (주)시어스제약**

[판매자] 일양약품(주) / 경기도 용인시 기흥구 하갈로 110 **☎ 일양약품**