



고함량 기능성 활성비타민

맥티영진 플러스 정

ACTI-YUNGJIN Plus,tablet

1일 1정

【원료약품의 분량】 1정 중

· 유효성분 :	
벤토티아민(티아미엔염산염)(으로서 72.31 밀리그램(KP)).....	100mg
신화아그네슘(아그네슘)(으로서 18 밀리그램(KP)).....	30mg
토코페롤아세테이트 2-에센(비타민E)(으로서 20 아이,유(KP)).....	40mg
신화아연(아연)(으로서 16 밀리그램(KP)).....	20mg
클레칼시페롤(비타민D)(으로서 1,000 아이,유(EF)).....	10mg
리보플라빈(비타민B2)(으로서 12mg).....	12mg
셀레늄함유인산소듐(셀레늄)(으로서 13.5마이크로그램(KP)).....	25mg
피리독살포스페이트수화물(KP).....	5mg
우르소데옥시콜산(KP).....	10mg
아스코르브산(KP).....	100mg
몰산(KP).....	0.5mg
p-비오틴(USP).....	0.5mg
메코발라민(KP).....	1,000µg
이노시톨(KP).....	30mg
니코틴아마이드(KP).....	100mg
판토티산칼슘(KP).....	100mg
감마-오리자놀(KP).....	5mg
인도메타레논(KP).....	5mg
· 기타첨가제 : 스테아르산마그네슘, 히드록시프로필셀룰로오스, 경질무수구산, 미결정셀룰로오스, 텡셀로스칼셀(298103), 크로스비온	

【상상】 갈색의 정방형 플름코팅정

【효능 · 효과】

1. 다음 종류의 비타민 D, E, B1, B2, B6, C의 보급

- 육체 피로
- 임신 · 수유기
- 병중 · 병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력 저하 시
- 발육기
- 노년기

2. 이 약에 함유된 비타민 등의 효능 · 효과는 다음과 같다.

- 뼈, 이의 발육불량
- 구루병의 예방
- 다음 증상의 완화 : 신경통, 근육통, 관절염(요(허리)통, 어깨결림 등), 구강염(입괴립염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염
- 각기
- 눈의 피로
- 3. 아연의 보급

【용법 · 용량】

1만 12세 이상 및 성인 : 1일 1회, 1회 1정 복용한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
 - 1) 고칼슘혈증(hypercalcaemia : 혈액중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태) 환자, 유육종증(sarcoidosis : 원인을 알 수 없는 전신 염증질환), 신장(콩팥)질환 환자
 - 2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분과 과민반응이 있는 환자
 - 3) 만 12개월 미만의 적막이
 - 4) 신장(콩팥)결석 환자
 - 5) 심한 증상의 신부전 환자
 - 6) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
 - 7) 종 또는 병동에 과민증이 있는 환자
 - 8. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.
 - 1) 환신제, 칼슘제, 경구제, 복용하는 용 대타라시콜린제 제제, 제산제
 - 2) 디오프도
 - 3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것.
 - 1) 외과의 치료 받고 있는 환자
 - 2) 고요산산증 환자(hyperoxaluria : 요중에 과량의 수산염이 배설되는 상태)
 - 3) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
 - 4) 비타민 D는 모유로 분비되어 신생아에게 고칼슘혈증을 일으킬 수 있다.
 - 5) 소화성궤양, 만성궤양성대장염, 구강상대장염 등의 위장질환 환자
 - 6) 심장 · 순환 기계기능 장애 환자
 - 7) 신장(콩팥) 장애 환자
 - 8) 신장(콩팥)결석 병력이 있는 환자
 - 9) 신장(콩팥)결석 병력이 있는 환자
 - 10) 임부
 - 11) 고지단백혈증, 당뇨병성고지혈증 및 해킹 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자.

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것. 상한 시 가능한 한 이 처방문서를 소지할 것.

- 1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우 : 구역, 구토, 설사, 위부불쾌감, 변비, 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 붉은 변, 식욕부진, 복부(배부부) 팽만감, 붉은 반점, 부전수축(심장박동 증가), 중추신경계 기능장애, 피부염, 담 · 호흡 시 악취, 발모, 조급증, 위장관장애, 소화장애, 상복부(배부부)통증, 저혈압, 폐부종(부기)
- 2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예상보다 빨리자나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있다.
- 3) 에스트로겐을 포함한 경구제는, 복용하는 용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전(혈관 막힘)성 소인이 있는 환자가 비타민D를 복용할 경우 혈전(혈관 막힘)의 위험이 증가될 수 있다.
- 4) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성(습기)이 생길 수 있다.
- 5) 피리독신을 1일 500mg ~ 2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각 신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있다.
- 6) 몰산이 부족한 환자(예 비타민 B12를 1일 10µg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응)이 나타날 수 있다.
- 7) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당내성) 손상(glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대사는 하는 능력 장애), 고요산혈증(hyperursemia, 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있다.
- 8) 대담투여로 인한 구역, 구토 등의 위장장애, 고나트륨혈증, 울혈성부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다.
- 9) 항암제(소르비테, 트라마데렌과 병용(함께 복용)(사용)투여 시 고칼슘혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것.
- 10) 우발적으로 과량복용 한 경우
 - 11) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우
5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항
 - 1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지킬 것.
 - 2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도 · 감독하에 투여할 것
 - 3) 각종 요검사 시에 혈당의 검출을 방해할 수 있다.
 - 4) 요를 황색으로 변화하여 하여 임상 검사지에 영향을 줄 수 있다.
 - 5) 녹차, 홍차 등 탄산을 함유하는 차는 복용 중, 복용 전, 후에는 피할 것.
6. 일반적 주의
 - 1) 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자(예 이 약을 투여할 때 혈장 지질치를 점검할 것을 권장함). 이 점검을 통해 지방의 체내 배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절한다. 환자가 다른 장중용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제에 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 한다.
7. 저장상의 주의사항
 - 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
 - 2) 직사광선을 피하고 빛을 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 (밀폐하여) 보관할 것.
 - 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보전을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

【저장방법 및 사용기간】 밀폐용기, 실온보관(1~30℃), 제조일로부터 36 개월

【포장단위】 병 60정/병, 120정/상자(60정/병*2)

【제조자】 메디스(제약)주 전북특별자치도 완주군 봉동읍 완주신단6로 170

【제조(외)사】 한국셀비제약주 충청북도 음성군 금강읍 금일로 271-8

【판매자】 영진약품(주) 경기도 화성시 남양읍 우하로 66

- ※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되거나 유통과정 중 변질 또는 오손된 제품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
- ※ 반드시 설명서를 읽은 후 사용(복용)하시고, 설명서는 약과 함께 보관하십시오.
- ※ 이 처방 문서를 작성일자 이후 변경된 내용은 080-990-8200에서 확인할 수 있습니다.
- ※ 첨부문서에 기재되지 않은 부작용이 나타날 경우 의사나 약사 또는 한국의약품안전관리원의약품조사(사례보고)에 알려주시기바랍니다.
- ※ 의약품 사용 후 부작용 발생 시 한국의약품안전관리원에 피해구제를 신청할 수 있습니다. (부작용 피해구제 신청 : 한국의약품안전관리원(전화 : 1644-6223))
- ※ 의약품 용어 설명 및 기타 자세한 의약품정보는 의약품안전관리관과 의약품통합정보시스템(<http://nedrug.mfds.go.kr>)을 참조하십시오.

최종개정일자 : 2025.11.12