

이부프로펜 함유, 액상으로 빠른 효과

종합 감기에 파워레티콜

연질
캡슐

제품명	파워레티콜연질캡슐
구분/문류번호	의약품 / 114
성상	미황색 내지 연한 적색의 투명한 내용물을 함유한 적색 투명의 타원형 연질캡슐
원료약품 및 분량	
이 약 1캡슐 중	
유효성분 :	이부프로펜(KP) 75mg, 클로르페니라민말레산염(KP) 1.25mg, dL-메틸에페드린염산염(KP) 12.5mg, 슈도에페드린염산염(U5P) 15mg, 덱스트로메토르반브로마수소산염수화물(KP) 8mg, 구아이페네신(KP) 41.5mg
첨가제(동물유래) :	젤라틴(소, 가축내피)
첨가제(기타) :	락색소, 부분탈수유동소르비톨, 부틸메타히드록시톨루엔, 수산화칼륨, 에틸바닐린, 정제수, 포비돈, 폴리메틸렌글리콜400, 프로필렌글리콜
효능효과	감기의 증상상(여러증상)(코막힘, 재채기, 인후(목구멍)통, 기침, 가래, 오한(출고 열리는 증상), 발열, 두통, 관절통, 근육통)의 완화
용법용량	- 만 15세 이상 및 성인 : 1일 3회, 1회 2캡슐 식후 30분에 복용 - 만 7세 초과-만 15세 미만 : 1일 3회, 1회 1캡슐 식후 30분에 복용
사용상의 주의사항	
1. 경고	
슈도에페드린 함유 제제 복용 시 급성 전신성 발진성 농포증(AGEP)과 같은 중증 피부 이상반응이 나타날 수 있다. 발열, 홍반, 다수의 작은 농포와 같은 증상이 관찰될 경우 이 약의 복용을 중단하고 의사 또는 약사와 상담해야 한다.	
2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.	
1) 이 약 및 이 약의 구성성분에 대한 과민반응 및 그 병력이 있는 사람	
2) 이 약 및 이 약의 구성성분, 다른 해열진통제, 감기약 복용 시 전식을 일으킨 적이 있는 사람	
3) 만3개월 미만의 영아	
4) MAO억제제(항우울제, 항정신병제, 감정조절제, 항마니스제 등)를 복용하고 있거나 복용을 중단한 후 2주 이내의 사람	
5) 중증 또는 조절되지 않는 고혈압 환자	
6) 중증 급성 또는 만성 신장질환/신부전 환자	
3. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.	
진해(기침을 그치게 함)거담제(가래약), 다른 감기약, 해열진통제, 진정제, 항히스타민제를 함유하는 내복약(비염)코약)을 경구제, 열매약, 알레르기용약)	
4. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의 할 것.	
1) 수두 또는 인플루엔자에 감염되어 있거나 또는 의심되는 열이 및 만 15세 미만의 어린이(구역이나 구토를 수반하는 행동의 변화가 있다면, 드물지만 심각한 질병인 레이중후군의 초기 증상일수 있으므로 의사와 상의할 것)	
2) 슈도에페드린 성분과 관련하여 허혈성 대장염의 증상(급격한 복통, 직장 출혈 등)이 발현될 경우	
3) 복인, 양친 또는 형제 등이 두드러기, 접촉성피부염, 기관지천식, 알레르기성비염, 편두통, 음식물알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람	

4) 지금까지 약에 의해 알레르기 증상(예 : 발열, 발진, 관절통, 전식, 가려움증 등)을 일으킨 적이 있는 사람
5) 간장질환, 신장질환, 심장질환, 갑상선질환, 당뇨병, 고혈압, 녹내장(예 : 눈의 통증, 눈이 침침함 등), 배뇨곤란 등이 있는 사람, 고령자, 몸이 약한 사람 또는 고열이 있는 사람
6) 속쓰림, 위부불쾌감, 위통과 같은 위장문제가 지속 혹은 재발되거나 궤양, 출혈문제를 가지고 있는 사람
7) 구토와 설사로 많은 수분을 손실하거나 수분을 흡수하지 않는 사람 또는 이노제를 복용하는 사람
8) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부 (임신 30주 이후 실리실나트륨, 실리실아미드, 아스피린, 아스피린알루미늄, 실리실산물린, 이부프로펜 성분 함유 제제의 투여가 권고되지 않는다)
9) 의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람(당뇨약, 통풍약, 관절염약, 항응고제, 스테로이드제 등 다른 약물을 투여 받고 있는 사람)
10) 다음과 같은 기침이 있는 사람
흡연, 전식, 만성 기관지염, 폐기종, 과도한 기래가 동반되는 기침, 1주 이상 지속 또는 재발되는 기침, 만성 기침, 발열 · 발진이나 지속적인 두통이 동반되는 기침
5. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 중단 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.
1) 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우 발진 · 발적, 가려움, 구역 · 구토, 식욕부진, 변비, 위통, 소화불조, 위부불쾌감, 부종, 배뇨곤란, 목마름(지속적이거나 심한), 어지러움, 불안, 떨림, 불면
2) 이 약의 복용에 의해 다음에 아래의 중증(심한 증상) 증상이 나타난 경우 ① 속(아나필락시스) : 복통후 바로 두드러기, 부종, 기침담담한 등과 함께 안색이 창백하고, 손발이 차고, 식은땀, 숨쉬기 곤란함 등이 나타날 수 있다. ② 피부점막만중후군(스티븐스-존슨중후군), 중독성표피괴사용해(리엘중후군) : 고열을 동반하고, 발진 · 발적(충혈되어 붉어짐), 화상과 같이 물집이 생기는 등의 심한 증상이 전신피부, 입이나 눈점막에 나타날 수 있다. ③ 천식 ④ 가역적 후뇌 병증 중후군 및 가역적 뇌혈관 수축 중후군: 갑작스러운 심한 두통, 반게 두통, 구역, 구토, 혼돈, 발작, 시각 장애 등이 발현될 수 있다. ⑤ 심장 : 코니스 중후군(빈도불명)
3) 5-6회 복용하여도 증상이 좋아지지 않을 경우
6. 소아에 대한 투여
만2세 미만에게 투여하지 않는다. 다만, 꼭 필요한 경우 의사의 치료를 받는다.
7. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항
1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지킬 것. 2) 장기간 계속 복용하지 말 것. 3) 어린이에게 복용시킬 경우에는 보호자의 지도 감독하에 복용시킬 것. 4) 복용시에는 음주하지 말 것. 5) 복용하는 동안 졸음이 오는 경우가 있으므로 자동차 운전 또는 기계류의 운전 조작을 피할 것. 6) 이 약 투여 환자에서서 코니스 중후군 사례가 보고되었다. 코니스 중후군은 관상동맥 수축과 관련이 있는 알레르기 또는 과민반응 후 발생하는 심혈관계 증상으로 심근경색을 초래할 수 있다.
8. 저장상의 주의사항
1) 어린이의 손에 닿지 않는 장소에 보관할 것. 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에(밀폐하여) 보관할 것. 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.
저장방법
기밀용기, 실온(1~30℃) 보관
사용기한 변도 케이스 표시일까지
포장정보 20캡슐/PTP
제조사 ㈜시흥 : 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명로 61
판매자 ㈜온누리메디칼(전씨) : 서울특별시 강남구 삼성대로 159-1, 13층
기타 표시사항
* 본 의약품은 KGMP(의약품 제조 및 품질관리기준) 적격업체에서 생산하여 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 구입 시 유효기한 또는 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다. * 약은 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관합니다. * 본 의약품과 관련된 용어설명, 허가 변경사항 등 기타 자세한 정보는 의약품통정보시스템(http://nedrug.mfds.go.kr)의 의약품 등 정보를 참조하시기 바랍니다. * 의약품 부작용 피해구제신청 : 한국약품안전관리원(1644-6223 또는 14-3330) * 소비자상담실 : 080-555-2580