

토파시즈[®]정 10mg

토파시티닙시트르산염(토파시티닙 10mg)

■ 원료약품의 분량: 1정 중

- 유효성분: 토파시티닙시트르산염(법규) 16.155mg(토파시티닙으로서 10mg)
- 첨가제(타르소스): 청색 2호(인디고카린인) 알루미늄레이크
- 첨가제(동물유래): 유당수화물(소, 우유)
- 기타 첨가제: 미결정셀룰로오스, 스테아르산하그네스, 오파드라이(QX파란색(321A20502)), 크로스카르멜로오스나트륨

■ 성상: 파란색의 원형 필름코팅정제

■ 효능·효과

다음의 환자에서는 기존 치료제에 적절히 반응하지 않거나 내약성이 없는 경우에 한하여 이 약을 사용하여야 합니다.

- 다음 -
- 가. 65세 이상 환자
- 나. 심혈관계 고위험군 환자
- 다. 악성 종양 위험이 있는 환자

1. 케양성 대장염
코르티코스테로이드, 아자티오프린, 6-메르캅투린(6-MP)을 포함한 통상적인 치료제 또는 생물학적 제제에 적절한 반응하지 않거나, 반응이 소실되거나 또는 내약성이 없는 성인(만 18세 이상)의 중등도~중증 활동성 케양성 대장염의 치료
이 약을 생물학적 제제나 아자티오프린 및 사이클로스포린과 같은 강력한 면역억제제와 함께 사용해서는 안됩니다.

■ 용법·용량:

1. 투여 시 주의사항
 - 1) 절대림프구수(ALC; absolute lymphocyte count) 500 cells/mm³미만, 절대중구수(ANC; absolute neutrophil count) 1,000 cells/mm³미만, 또는 헤모글로빈 수치가 9 g/dL 미만인 환자에서는 이 약의 투여를 시작하지 않습니다.
 - 2) 이 약의 투여 전, 투여 중 및 투여 후 결핵을 포함한 감염에 대해 면밀히 모니터링해야 하며, 중대한 감염이 발생한 환자는 감염이 조절될 때까지 이 약의 투여를 중단해야 합니다.
 - 3) 림프구 감소, 호중구 감소 및 빈혈의 조절을 위해 일시적으로 이 약의 투여를 중단하는 것이 필요할 수 있습니다.
 - 4) 이 약은 음식과 섭취와 상관없이 경구 투여할 수 있습니다.
2. 케양성 대장염의 권장용량
CYP2C19 및/또는 CYP3A4 억제제를 투여중인 환자, 중등도 및 중증 신장애 환자, 중등도 간장애 환자, 림프구 감소, 호중구 감소 및 빈혈환자에 대한 성인 권장용량은 표1과 같습니다.
[표 1] 케양성 대장염 환자에 대한 이 약의 권장용량

성인	1회 10mg 1일 2회로 최소 8주동안 투여 후, 치료반응에 따라 5mg 또는 10 mg을 1일 2회 투여한다. [12. 전문가를 위한 정보* 참조] 유지용량으로 최소 유효용량을 사용한다. 이 약 1회 10 mg을 1일 2회로 16주동안 투여한 후에도 적절한 치료적 유익성을 보이지 않으면 투여를 중단한다.
다음과 같은 약물을 투여중인 환자: • 강력한 CYP3A4 억제제(예, 케토코나졸), 또는 • 중등도의 CYP3A4 억제제 및 강력한 CYP2C19 억제제(예, 클루코나졸) 다음의 환자에서: • 중등증 또는 중증의 신장애 환자 • 중등증의 간장애 환자* [5. 일반적 주의 참조] ALC 500 cells/mm ³ 미만 (반복검사로 확인)	이 약 1회 10 mg을 1일 2회로 투여중인 경우, 1회 5 mg 1일 2회로 감량한다. 이 약 1회 5 mg 1일 2회로 투여중인 경우, 1일 1회 5 mg으로 감량한다. 이 약 1회 10 mg 1일 2회로 투여중인 경우, 1회 5 mg 1일 2회로 감량한다. 이 약 1회 5 mg 1일 2회로 투여중인 경우, 1일 1회 5 mg으로 감량한다.
ANC 500-1,000 cells/mm ³	이 약 1회 10 mg을 1일 2회 투여한 경우, 1회 5 mg 1일 2회로 감량한다. ANC가 1,000 cells/mm ³ 초과가 되면, 임상적 반응에 따라 이 약 1회 10 mg 1일 2회로 다시 증량한다. 이 약 1회 5 mg을 1일 2회로 투여한 경우, 투여를 잠정 중단한다. ANC가 1,000 cells/mm ³ 초과가 되면, 이 약 1회 5 mg 1일 2회로 다시 투여한다.
ANC 500 cells/mm ³ 미만 헤모글로빈 수치가 2 g/dL 초과와 감소 또는 8.0 g/dL 미만	투여 중단 헤모글로빈 수치가 정상이 될 때까지 투여 잠정 중단

정맥혈전색전증(VTE), 주요 심혈관계 이상반응(MACE) 및 악성종양의 위험 인자가 있는 환자의 경우 이용 가능한 치료제 유무에 상관없이 유지요법으로 10mg은 권장하지 않습니다.

■ 사용상의 주의사항

1. 경고
 - 1) 중대한 감염
이 약을 투여하는 환자들은 입원 또는 사망으로 이어질 수 있는 중대한 감염이 나타날 위험이 높습니다. 이러한 감염이 나타난 대부분의 환자들은 메트로트렉시이트 혹은 코르티코스테로이드 같은 면역억제제를 병용 투여하고 있었습니다.
중대한 감염이 나타난 경우, 감염이 조절될 때까지 이 약의 투여를 중단해야 합니다.
보고된 감염은 다음을 포함합니다:
• 폐질환 혹은 폐 이외의 질환이 있는 활성결핵. 환자들은 이 약을 투여하기 전 및 투여 중에 잠복결핵검사를 받아야 합니다. 잠복결핵의 치료는 이 약 투여 전에 선행되어야 합니다.
• 호모중증 및 간질성 형질세포페렴을 포함한 침습적 진균 감염. 침습적 진균감염 환자는 국소보다는 전신으로 확산되는 질환으로 나타납니다.
• 기외 감염성 병원체에 기인한 세균성, 바이러스성(헤르페스 바이러스 포함) 및 기타 감염
만성 또는 재발성 감염환자는 이 약의 투여를 시작하기 전 치료의 위험성 및 유익성에 대해 주의 깊게 고려해야 합니다.
이 약 투여 중 또는 투여 이후 환자들은 감염 징후 및 증상의 발현을 주의 깊게 관찰해야 하며, 치료 시작 전 잠복 결핵의 음성반응을 보인 환자에서 결핵 발현 가능성이 대하어도 주의 깊은 관찰이 필요합니다.
65세 이상의 환자에서 기존 치료제에 적절한 반응하지 않거나 내약성이 없는 경우에 한하여 이 약을 사용하여야 합니다.
 - 2) 사망률
최소 한가지 이상의 심혈관계 위험요인이 있는 만 50세 이상의 루마티스 관절염 환자 대상으로 토파시티닙 5 mg 1일 2회 또는 10 mg 1일 2회를 TNF 억제제와 비교하는 1건의 대규모 무작위 배정 시판 후 안전성 연구에서 갑작스러운 심혈관 사망 등 모든 원인으로 인한 사망률이 토파시티닙 5mg 1일 2회 또는 10mg 1일 2회 투여 환자에서 높은 것으로 관찰되었습니다. 토파시티닙 10mg 1일 2회는 사망률에 상당한 차이를 보이지는 않았으나, 토파시티닙 5mg 1일 2회 투여 환자에서 높은 것으로 관찰되었습니다.
루마티스 관절염 환자에서 림프종 및 폐양의 발생률이 TNF 억제제에 비해 토파시티닙 5mg 1일 2회 또는 10mg 1일 2회 투여 환자에서 높았습니다. 현재 또는 과거 흡연자의 경우 추가적인 위험성이 증가합니다.
65세 이상 환자, 현재 또는 과거 장기간 흡연자, 다른 악성종양 위험요인(예: 성공적으로 치료된 비흑색종 피부암을 제외하고 악성종양이 현재 있거나 병력이 있는 경우)이 있는 환자들의 경우 기존 치료제에 적절히 반응하지 않거나 내약성이 없는 경우에 한하여 이 약을 사용하여야 합니다. 이 약과 면역억제제를 병용투여받은 신장기능이 약한 환자에서 엡스테인-바 바이러스(Epstein Barr Virus)와 관련이 있는 이식 후 림프종과 종식성 질환이 증가하는 것으로 관찰되었습니다.
 - 3) 악성 종양
염증성 질환을 치료하기 위해 토파시티닙과 다른 JAK 억제제를 투여한 환자들에서 림프종, 고형 종양 등 악성 종양이 관찰되었습니다. 루마티스 관절염 환자에서 악성종양(비흑색종 피부암 제외)의 발생률이 TNF 억제제에 비해 토파시티닙 5mg 1일 2회 또는 10mg 1일 2회 투여 환자에서 높았습니다.
루마티스 관절염 환자에서 림프종 및 폐양의 발생률이 TNF 억제제에 비해 토파시티닙 5mg 1일 2회 또는 10mg 1일 2회 투여 환자에서 높았습니다. 현재 또는 과거 흡연자의 경우 추가적인 위험성이 증가합니다.
65세 이상 환자, 현재 또는 과거 장기간 흡연자, 다른 악성종양 위험요인(예: 성공적으로 치료된 비흑색종 피부암을 제외하고 악성종양이 현재 있거나 병력이 있는 경우)이 있는 환자들의 경우 기존 치료제에 적절히 반응하지 않거나 내약성이 없는 경우에 한하여 이 약을 사용하여야 합니다. 이 약과 면역억제제를 병용투여받은 신장기능이 약한 환자에서 엡스테인-바 바이러스(Epstein Barr Virus)와 관련이 있는 이식 후 림프종과 종식성 질환이 증가하는 것으로 관찰되었습니다.
 - 4) 주요 심혈관계 이상반응(MACE)
최소 한가지 이상의 심혈관계 위험요인이 있는 만 50세 이상의 루마티스 관절염 환자에서 주요 심혈관계 이상반응(심혈관계 사망, 심근경색 및 뇌졸중으로 정의됨)의 발생률이 TNF 억제제에 비해 토파시티닙 5mg 1일 2회 또는 10mg 1일 2회 투여 환자에서 높았습니다.
65세 이상의 환자, 현재 또는 과거 장기간 흡연자, 다른 심혈관 위험 요인이 있는 환자(예: 죽상경화성 심혈관질환 병력)는 기존 치료제에 적절히 반응하지 않거나 내약성이 없는 경우에 한하여 이 약을 사용하여야 합니다.
 - 5) 혈전증
염증성 질환을 치료하기 위해 토파시티닙과 JAK 억제제를 투여한 환자에서 폐색전증, 심부정맥 혈전증, 동맥 혈전증 등 혈전증이 발생했습니다. 최소 한가지 이상의 심혈관계 위험요인이 있는 만 50세 이상의 루마티스 관절염 환자에서 이러한 이상반응의 발생률이 TNF 억제제에 비해 토파시티닙 5mg 1일 2회 또는 10mg 1일 2회 투여 환자에서 높았습니다. 이러한 이상반응은 대부분 중증이었으며, 일부는 사망을 초래했습니다. 이러한 위험이 있는 환자에서 이 약의 사용을 피해야 합니다. 환자가 혈전증 증상이 있는 경우 이 약의 사용을 중단하고 신속하게 환자의 상태를 평가해야 합니다.
이 연구의 세 개 투여군 모두에서 심부정맥혈전증 사례가 관찰되었습니다.
환자들에 대해 투여시작 전과 투여 중 주기적으로 정맥혈전색전증 위험요인을 평가합니다. 65세 이상 환자와 정맥혈전색전증 위험요인(예: 혈전증 병력)이 확인된 환자는 이 약을 주의하여 사용합니다. 정맥혈전색전증의 징후 및 증상이 있는 환자는 긴급히 평가합니다. 용법·용량 또는 효능 효과에 관계없이, 정맥혈전색전증이 의심되면 이 약을 중단합니다.

2. 다음 환자에는 투여하지 말 것

- 1) 이 약 또는 이 약의 구성성분에 과민증이 있는 환자
 - 2) 중대한 감염(예, 폐렴) 또는 국소 감염을 포함한 활성 감염이 있는 환자
 - 3) 활동성 결핵이 있는 환자
 - 4) 중증 간장애 환자
 - 5) 절대중구수(ANC; absolute neutrophil count) 500 cells/mm³미만인 환자
 - 6) 절대림프구수(ALC; absolute lymphocyte count) 500 cells/mm³미만인 환자
 - 7) 헤모글로빈 수치 8 g/dL 미만인 환자
 - 8) 일부 또는 임신 가능성이 있는 여성
 - 9) 이 약을 유당을 함유하고 있으므로 갈락토스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 됩니다.
- ### 3. 다음 환자에는 신중히 투여할 것
- 1) 감염이 의심되는 환자
 - 2) 결핵 병력이 있는 환자
 - 3) 면역력이 약화된 환자
 - 4) 고령자
 - 5) 당뇨병 환자
 - 6) 위장관 기생환자(위장관 천공가능성이 있습니다.)
 - 7) 호중구수 또는 림프구수 감소 환자, 헤모글로빈 수치 감소 환자
 - 8) 경증 또는 중등도의 간장애 환자
 - 9) 신장애 환자
 - 10) 간질성폐렴 병력이 있는 환자

4. 이상반응

임상시험이 다양한 환경에서 수행되었기 때문에, 임상 시험에서 관찰된 이상 반응 비율은 다른 약물의 임상시험에서 나타난 이상반응 비율과 직접적으로 비교할 수 없으며, 실제 임상 환경에서 나타나는 이상반응 비율을 예측할 수 없습니다.

- 1) 이상반응
이상반응은 기관계(System Organ Class; SOC)에 따라 표2와 표3에 제시되어 있습니다. 각 기관계 안에서, 이상반응은 중증도가 감소하는 순으로 나열되어 있습니다.
[표 2] 기관계 및 CIOMS 빈도 분류에 따른 이상반응(루마티스 관절염, 건선, 건선성 관절염 및 케양성 대장염 통합자료)*

기관계	흔하게 (≥1/100~<1/10)	흔하지 않게 (≥1/1,000~<1/100)	드물게 (≥1/10,000~<1/1,000)
감염	폐렴, 인플루엔자, 대상포진, 신우신염, 요로감염, 부비동염, 기관지염, 코인두염, 인두염	결핵, 게실염, 신우신염, 연조직염, 단순포진, 바이러스성 위장염, 바이러스 감염	폐렴증, 중추신경계 결핵*, 크립토크스스막염*, 요로성 폐렴증, 파종성 결핵, 고사 균악염*, 세균혈증*, 포도구균혈증*, 폐포자균 폐렴*, 폐구균 폐렴*, 세균성 폐렴, 노막염, 비정형 미코박테를 감염*, 미코박테리아비움복합체 감염*, 거대세포바이러스 감염, 세균성 관절염*
양성, 악성 및 상세불명의 신생물 (난종 및 폴립 포함)	빈혈	백혈구감소증, 호중구감소증, 림프구감소증, 악성림프관염*	
면역계		알로피기반염*	
대사 및 영양	고지혈증	이상지질혈증, 탈수	
정신계		불면증	
신경계	두통	감각이상	

혈관계 호흡기, 홍부 및 종격 위장관	고혈압 기침	정맥혈전색전증*, 홍종괴관, 부비동 출혈	
간·담도 피부 및 피하조직	복통, 구토, 설사, 구역, 위염, 소화불량	간지발증 홍반 가려움	
근골격계 및 결합조직	발진 어드름*, 관절통	근골격통증, 관절종창, 힘줄염	
전신 및 투여부위	발열, 말초 부종, 피로		
검사	감마 글루타미드 전달효소 증가, 혈중 클레스테롤 증가, 체중 증가, 혈중 크레아틴 인산살효소 증가	간효소 증가, 아미노전이효소 증가, 간기능 검사 이상, 혈중 크레아티닌 증가, 저밀도지질단백질 증가	
손상, 중독 및 수술 후 합병증		인대 염좌, 근육긴장	

- *빈도는 제3상 무작위배정 임상시험 통합 자료(시험 A3921133 제외)에 근거하였습니다.
*이상반응은 공개라벨 장기 연장 시험에서만 보고되었습니다. 따라서, 이 이상반응의 빈도는 제3상 무작위배정 임상시험으로 추정되었습니다.
*세균성 관절염은 세균성 관절염과 감염관절염의 선호용어(PT)로 두 빈도의 합으로 빈도가 결정되었습니다.
*비흑색종 피부암은 2013년에 이상반응으로 확인되었습니다. *비흑색종 피부암은 선호용어가 아닙니다. 빈도는 선호용어인 기저세포암 및 피부관형세포암 빈도의 합으로 결정되었습니다.
*자발적 보고 자료(혈관부종 및 두드러기 등의 사례가 관찰됨), 일부 사례는 임상시험에서도 관찰되었습니다.
*정맥혈전색전증은 폐색전증과 심부정맥혈전증 및 말막 정맥 혈전증을 포함합니다.
*시판 후 확인된 이상반응.

[표 3]* 기관계 및 CIOMS 빈도 분류에 따른 이상반응 (루마티스 관절염 프로그램 -A3921133)*

기관계	흔하게 (≥1/100~<1/10)	흔하지 않게 (≥1/1,000~<1/100)	드물게 (≥1/10,000~<1/1,000)	매우 드물게 (<1/10,000)
감염	폐렴, 인플루엔자, 대상포진, 신우신염, 요로감염, 부비동염, 기관지염, 코인두염, 인두염, 결핵	게실염, 신우신염, 연조직염, 단순포진, 바이러스성 위장염, 바이러스 감염, 폐렴증, 세균성 관절염*	요로성 폐렴증, 파종성 결핵, 폐포자균 폐렴, 세균성 폐렴	세균혈증, 폐구균 폐렴, 거대세포바이러스 감염
양성, 악성 및 상세불명의 신생물 (난종 및 폴립 포함)	빈혈, 림프구감소증	백혈구감소증, 호중구감소증, 악성림프관염*		
면역계		알로피기반염		
대사 및 영양	고지혈증, 이상지질혈증	탈수		
정신계		불면증		
신경계	두통	감각이상		
혈관계 호흡기, 홍부 및 종격 위장관	고혈압 기침	정맥혈전색전증*, 홍종괴관, 부비동 출혈		
간·담도 피부 및 피하조직	설사, 구역	복통, 구토, 위염, 소화불량	간지발증 간지발증 홍반 가려움	
근골격계 및 결합조직	관절통	관절종창, 힘줄염	근골격통증	
전신 및 투여부위	말초 부종	발열, 피로		
검사	혈중 클레스테롤 증가, 체중 증가, 간효소 증가, 아미노전이효소 증가	감마-글루타미드 전달효소 증가, 간기능 검사 이상, 인산살효소 증가, 간기능 검사 이상, 혈중 크레아티닌 증가, 저밀도지질단백질 증가		
손상, 중독 및 수술 후 합병증		인대 염좌, 근육긴장		

- *심혈관계 위험요인이 있는 만 50세 이상 RA 환자를 대상으로 한 대규모 무작위배정 PASS 연구
*세균성 관절염의 빈도는 세균성 관절염과 감염성 관절염의 선호용어(PT)에 대한 합으로 결정되었습니다.
*비흑색종 피부암은 2013년에 이상반응으로 확인되었습니다. *비흑색종 피부암은 선호용어가 아닙니다. 빈도는 선호용어인 기저세포암 및 피부관형세포암 빈도의 합으로 결정되었습니다.
*정맥혈전색전증 (예: 폐색전증, 심부 정맥 혈전증 및 말막 정맥 혈전증).
*이 표는 100 환자·년당 발생률 근거입니다.
* 시판 후 확인된 이상반응.

- 2) 케양성 대장염에 대한 임상시험
이 약은 중등도~중증 활동성 케양성 대장염 환자들을 대상으로 4건의 무작위배정, 이중맹검, 위약대조 임상시험(UC-A, UC-B, UC-III, 용량탐색시험UC-V)과 공개라벨 장기 연장 시험(UC-IV)이 수행되었습니다([12. 전문가를 위한 정보* 참조]).
유도요법 시험 또는 유지요법 시험 중, 이 약 5 mg 또는 10 mg을 1일 2회 투여받은 환자의 5% 이상에서 보고되고, 위약군보다 1% 이상 더 많이 보고된 이상반응은 코인두염, 클레스테롤치 상승, 두통, 상기도 감염, 혈액 크레아티닌포스포키나아제 증가, 발진, 설사, 대상포진이었습니다.
*유도요법 임상시험 (UC-I, UC-II, UC-V)
3건의 유도요법 시험 중, 이 약 10 mg을 1일 2회 투여받은 환자의 2% 이상에서 보고되고, 위약군보다 1% 이상 더 많이 보고된 이상반응은 두통, 코인두염, 클레스테롤치 상승, 어드름, 혈액 크레아티닌포스포키나아제 증가 및 발열이었습니다.
*유지요법 임상시험 (UC-III)
이 약 2개 용량 중 어느 한 용량군에서 4% 이상에서 보고되고, 위약군보다 1% 이상 더 많이 보고된 흔한 이상반응을 표 4에 나타내었습니다.
[표 4] 케양성 대장염의 유지요법 임상시험(UC-III) 중 흔하게 나타난 이상반응

	이 약 5mg 1일 2회 N=198 (%)	이 약 10mg 1일 2회 N=196 (%)	위약 N=198 (%)
선호용어			
코인두염	10	14	6
클레스테롤치 상승**	5	9	1
두통	9	3	6
상기도 감염	7	6	4
혈액 크레아티닌 포스포키나아제 증가*	3	7	2
발진	3	6	4
설사	2	5	3
대상포진	1	5	1
위장염	3	4	3
빈혈	4	2	2
구역	1	4	3

- *이 약 2개 용량 중 어느 한 용량군에서 환자의 4% 이상에서 보고되고, 위약군보다 1%이상 더 많이 보고된
** 고콜레스테롤혈증, 고지질혈증, 혈중 클레스테롤 증가, 이상지질혈증, 혈중 트리글리세리드 증가, 저밀도 지질단백질 증가, 저밀도 지질단백 이상 또는 지질 증가를 포함

장기간의 연장시험에서, 악성종양(고형암, 림프종, 비흑색종 피부암 포함)이 이 약 10 mg 1일 2회 투여군에서 더 빈번하게 관찰되었습니다. 4건의 폐색전증 사례가 이 약 10 mg 1일 2회 투여군에서 보고되었으며, 이는 진행성 암환자의 사망 1건을 포함합니다. 이 약 10 mg 1일 2회 투여군에서, 5 mg 1일 2회 투여군과 비교하여 관찰된 용량 의존적 이상반응은 대상포진, 중대한 감염 및 비흑색종 피부암을 포함합니다.

- * 정맥혈전색전증
원료된 8주의 무작위배정, 위약대조 유도요법 임상시험에서, 토파시티닙 10 mg 1일 2회 및 위약군의 폐색전증 발생률(95% 신뢰구간)은 100 환자·년 당 0.009(0.00, 2.22) 및 1.98(0.05, 11.04)이었습니다. 심부정맥혈전증의 발생률(95% 신뢰구간)은 각각 100 환자·년 당 0.009(0.00, 2.22) 및 1.99(0.05, 11.07)이었습니다.
- 원료된 52주의 무작위배정, 유지요법 임상시험에서, 토파시티닙 5 mg 1일 2회 및 토파시티닙 10 mg 1일 2회 투여군의 폐색전증 발생률(95% 신뢰구간)은 각각 100 환자·년 당 0.009(0.00, 2.48) 및 0.009(0.00, 2.35) 이었고, 심부정맥혈전증의 발생률(95% 신뢰구간)은 각각 100 환자·년 당 0.009(0.00, 2.48) 및 0.009(0.00, 2.35)이었습니다.
- 원료된 무작위배정, 대조 임상시험 및 진행 중인 공개라벨 장기 연장시험에서의 노출을 포함하는 장기 안전성 분석에서, 토파시티닙 5 mg 1일 2회 및 토파시티닙 10 mg 1일 2회 투여군의 폐색전증 발생률(95% 신뢰구간)은 각각 100 환자·년 당 0.009(0.00, 0.54) 및 0.20(0.05, 0.52)이었다, 심부정맥혈전증의 발생률(95% 신뢰구간)은 각각 100 환자·년 당 0.009(0.00, 0.54) 및 0.05(0.00, 0.28)이었습니다.

(국내 시판 후 조사결과)
제삼자에 따른 케양성 대장염 환자에 대한 시판 후 조사 결과
국내에서 제삼자를 위하여 4년 동안 107명을 대상으로 실시한 시판 후 조사 결과, 이상사례의 발현율은 인과관계와 상관없이 40.19% (43/107명, 중 86%)로 보고되었습니다. 이 중 인과관계를 배제할 수 있는 중대한 약물이상반응 및 인과관계를 배제할 수 없는 이상하지 못한 약물이상반응은 발현 빈도에 따라 아래 표에 나열하였습니다.

기관계	중대한 약물이상반응 0.93%(1/107명, 1건)	예상하지 못한 약물이상반응 12.15%(13/107명 17건)
흔하게 (1~10%미만)	각종 위장관 장애	-
흔하지 않게 (0.1~1%미만)	각종 위장관 장애 생식계 및 영양 장애	-
	피부 및 피하 조직	-
	대사 및 영양장애	-
	양성, 악성 및 상세 불명의 신생물(난종 및 용종 포함)	-
	전신장애 및 투여 부위 병태	효과 없는 약물

5. 일반적 주의

- 1) 중대한 감염
이 약을 투여한 환자에서 세균, 항산균, 침습성 진균, 바이러스 또는 기타 기회감염원에 의해 중대한 그리고 종종 치명적인 감염이 보고되었습니다. 가장 흔한 중대한 감염은 폐렴, 요로감염, 연조직염, 대상포진, 기관지염, 폐렴소, 게실염, 위장염, 충수염 및 폐렴증이었습니다. 기회 감염증에서 결핵 및 기타 항산균성 감염, 크립토크스쿠스, 히스토플라스마증, 시토 칸디다증, 간질성형질세포성 폐렴, 다발성 대상포진, 거대세포 바이러스 감염, BK 바이러스 감염, 리스테리아증 등이 이 약 투여 중 보고되었습니다. 일부 환자들의 경우 국소 질환 보다는 전신 질환을 보였으며, 종종 메트로트렉시이트 혹은 코르티코스테로이드와 같은 면역 조절 약물을 병용하고 있었습니다. 케양성 대장염군에서, 이 약 5 mg 1일 2회 투여와 비교하여, 이 약 10 mg 1일 2회 투여는 더 높은 중대한 감염의 위험성과 연관되었습니다. 또한, 대상포진 기회감염(수막염, 안과학적 및 파종성 피부 감염 포함)이 이 약 10 mg을 1일 2회 투여한 환자들에서 관찰되었습니다. 임상시험에서 보고되지 않았던 다른 중대한 감염이 나타날 수 있습니다 (예, 킴치오이데스 진균증).

적어도 1개의 추가 실험관계 위험요인이 있는 만 50세 이상 RHA 환자에 대한 1 건의 대규모 무작위배정 PASS 연구에서 TNF 억제제에 비해 이 약 투여환자에서 중대한 감염의 용량 의존적 증가와 관련되었습니다. 이러한 중대한 감염 증 일부는 사멸을 초래했습니다. 기화감염 또한 이 연구에 보고되었습니다.

이 약은 근육 감염을 포함한 활성 감염이 있는 환자에게 투여해서는 안 됩니다. 다음과 같은 환자에서 이 약의 투여를 시작하기 전에는 치료의 위험성 및 유익성을 고려해야 합니다.

- 만성 또는 재발 감염 환자
- 결핵에 노출되었던 환자
- 중대한 감염 또는 기화 감염의 병력이 있는 환자
- 풍토 결핵 또는 풍토 진균균이 있는 지역에 거주했거나 여행한 적이 있는 환자
- 감염 성상이 있는 기생 성상의 환자

이 약의 치료기간 및 치료 이후에도 환자의 감염증후 및 감염증상 발현에 대해 주의 깊게 모니터링 해야 합니다. 만약 환자에게 중대한 감염, 기화 감염, 혹은 폐렴증이 나타날 경우 이 약의 투여를 중단해야 합니다. 적절한 치료 세제로도 감염이 나타날 환자의 경우 면역력이 약화된 환자에서 적절한 진단 검사를 즉각적이고 완전하게 실시해야 합니다. 적절한 항성 치료를 시작하고, 환자를 주의 깊게 모니터링 해야 합니다.

감염의 위험성은 림프구감소증 정도가 심할수록 높을 수 있고, 개개 환자에서 감염의 위험성을 평가시 림프구수가 고려되어야 합니다. 림프구감소증에 따른 투여중단 및 모니터링 기준은 용법 및 용량을 참고합니다.

- 결핵
 - 이 약을 투여하기 전에 환자에 대한 결핵 또는 활성 감염 여부를 검사하고 평가해야 하며, 투여 중에도 계속해서 평가하여야 합니다. 결핵 결핵이 있는 환자는 이 약 투여 전 표준 항결핵 치료법으로 치료해야 합니다.
 - 결핵 또는 활성 결핵에 대해 과거병력이 있고 적절한 치료 전자가 확립될 수 없는 환자와 결핵 결핵검사에서 음성인 나타났으나 활성 감염 위험자가 있는 환자의 경우에는 이 약 투여 전에 항결핵 요법을 고려해야 합니다. 각 환자에게 항결핵 요법을 시작하는 것이 적절한 환자에 대한 결정에 있어 결핵 치료전문과의 상담할 것을 권장합니다.
 - 치료 시작 전 결핵 결핵 검사에서 음성으로 나타났던 환자들을 포함하여 환자의 결핵의 징후와 증상 발현에 대해 주의 깊게 모니터링 해야 합니다.
- 바이러스 재발성화
 - 이 약에 대한 임상시험에서 헤르페스 바이러스 재발성화 사례를 포함한 바이러스 재발성화(예: 대상 포진)가 관찰되었습니다. 이 약을 투여받은 일본 및 한국 환자들에서 대상 포진의 발생률이 더 높게 나타났습니다.
 - 적어도 1개의 추가 실험관계 위험요인이 있는 만 50세 이상 RHA 환자에 대상으로 한 1건의 대규모 무작위배정 PASS 연구에서 TNF 억제제에 비해 이 약 투여 환자에서 대상 포진 사례의 증가가 관찰되었습니다.
 - 이 약을 투여받은 환자들에서 시행한 재발성화 시판 후 사례가 보고되었습니다. 만성 바이러스성 간염 재발에 대해 이 약이 어떤 영향을 미치는 지에 대해서는 알려진 바가 없습니다. B형 또는 C형 간염에 양성으로 확인된 환자는 임상시험에서 제외되었습니다. 이 약 투여를 시작하기 전에 임상 가이드라인에 따라 바이러스성 간염에 대한 선별검사가 수행되어야 합니다.
- 주요 실험관계 이상반응(심근경색 포함)
 - 적어도 1가지 추가 실험관계 위험요인이 있는 만 50세 이상 RHA 환자에 대한 1건의 대규모 무작위배정 PASS 연구에서 환자들은 이 약 5 mg 1회 2주, 이 약 10 mg 1일 2주 또는 TNF 억제제제를 투여 받았습다. 이 연구의 추가 투여군 모두에서 심근경색 사례를 포함한 주요 실험관계 이상반응(MACE)이 관찰되었습니다. TNF 억제제에 비해 이 약을 투여받은 환자에서 치명적이지 않은 심근경색도의 증가가 관찰되었습니다. 심근경색증 사례를 포함한 MACE는 65세 이하의 고령자, 현재 또는 과거 정기간 흡연자였던 환자 및 죽상경화성 심혈관 질환(ASCVD) 병력이 있는 환자에서 더 흔했습니다. 65세 이상의 고령자, 현재 또는 과거 정기간 흡연자였던 환자 및 다른 실험관 위험요인이 있는 환자(예: ASCVD 병력)의 경우, 다른 적절한 치료제가 없는 경우에만 이 약을 사용해야 합니다.
- 이상 반응 및 림프구 증식성 질환(비흑색종 피부암(NMSC) 제외)
 - 이 약에 대한 임상시험에서 악성 종양이 관찰된 것으로: 성공적으로 치료된 악성종양이 있거나 병력이 있는 환자의 경우(성공적으로 완치된 비흑색종 피부암 제외) 또는 악성 종양이 발현된 환자에서서 이 약 투여를 지속할지 여부를 고려할 때에는 이 약의 위험성 및 유익성을 고려해야 합니다. 이 약은 악성 종양에 대한 생체학적으로 예외를 미치지 않습니다.
 - 적어도 1개의 추가 실험관계 위험요인이 있는 만 50세 이상 RHA 환자를 대상으로 한 대규모 무작위배정 PASS 연구에서, TNF 억제제에 비해 이 약을 투여 받은 환자에서 악성종양의 증가가 관찰되었습니다. NMSC 제외한 악성종양은 65세 이상 환자와 현재 또는 과거의 정기간 흡연자였던 환자에서 더 흔했습니다. 65세 이상의 환자, 현재 또는 과거의 정기간 흡연자였던 환자 및 기타 악성종양 위험요인(예: 악성종양이 현재 있거나 악성종양의 병력이 있는 경우)이 있는 환자의 경우, 다른 적절한 치료제가 없는 경우에만 한하여 이 약을 사용해야 합니다.

- 이 약을 투여받은 환자 및 적어도 1개의 추가 실험관계 위험요인이 있는 만 50세 이상 RHA 환자를 대상으로 한 1건의 대규모 무작위배정 PASS 연구의 이 약 투여 환자와 비교하여 환자에서 관찰되었습니다. 특히, 높은 질환활성률 가진 루페이트스 관절염 환자에서 림프증 발생 위험이 일반인에 비해 몇 배까지 높게 나타났으며, 이 약의 Janus associated Kinase(JAK) 억제작용이 림프증 발생에 미치는 역할은 명확하지 않습니다.
- 이 약 투여 환자에 폐암이 관찰되었습니다. 적어도 1개의 추가 실험관계 위험요인이 있는 만 50세 이상 RHA 환자를 대상으로 한 1건의 대규모 무작위배정 PASS 연구의 이 약 투여환자에서 폐암이 관찰되었으며, TNF 억제제에 비해 이 약을 투여한 환자에서 폐암 발생 위험이 더 높게 나타났습니다.
- 적어도 1개의 추가 실험관계 위험요인이 있는 만 50세 이상 RHA 환자를 대상으로 한 대규모 무작위배정 PASS 연구에서, TNF 억제제에 비해 이 약을 투여 받은 환자에서 악성종양의 증가가 관찰되었습니다. NMSC 제외한 악성종양은 65세 이상 환자와 현재 또는 과거의 정기간 흡연자였던 환자에서 더 흔했습니다. 65세 이상의 환자, 현재 또는 과거의 정기간 흡연자였던 환자 및 기타 악성종양 위험요인(예: 악성종양이 현재 있거나 악성종양의 병력이 있는 경우)이 있는 환자의 경우, 다른 적절한 치료제가 없는 경우에만 한하여 이 약을 사용해야 합니다.
- 이 약을 투여받은 환자 및 적어도 1개의 추가 실험관계 위험요인이 있는 만 50세 이상 RHA 환자를 대상으로 한 1건의 대규모 무작위배정 PASS 연구의 이 약 투여 환자와 비교하여 환자에서 관찰되었습니다. 특히, 높은 질환활성률 가진 루페이트스 관절염 환자에서 림프증 발생 위험이 일반인에 비해 몇 배까지 높게 나타났으며, 이 약의 Janus associated Kinase(JAK) 억제작용이 림프증 발생에 미치는 역할은 명확하지 않습니다.

- 이 약 투여 환자에 폐암이 관찰되었습니다. 적어도 1개의 추가 실험관계 위험요인이 있는 만 50세 이상 RHA 환자를 대상으로 한 1건의 대규모 무작위배정 PASS 연구의 이 약 투여환자에서 폐암이 관찰되었으며, TNF 억제제에 비해 이 약을 투여한 환자에서 폐암 발생 위험이 더 높게 나타났습니다.
- 적어도 1개의 추가 실험관계 위험요인이 있는 만 50세 이상 RHA 환자를 대상으로 한 대규모 무작위배정 PASS 연구에서, TNF 억제제에 비해 이 약을 투여 받은 환자에서 악성종양의 증가가 관찰되었습니다. NMSC 제외한 악성종양은 65세 이상 환자와 현재 또는 과거의 정기간 흡연자였던 환자에서 더 흔했습니다. 65세 이상의 환자, 현재 또는 과거의 정기간 흡연자였던 환자 및 기타 악성종양 위험요인(예: 악성종양이 현재 있거나 악성종양의 병력이 있는 경우)이 있는 환자의 경우, 다른 적절한 치료제가 없는 경우에만 한하여 이 약을 사용해야 합니다.
- 이 약을 투여받은 환자 및 적어도 1개의 추가 실험관계 위험요인이 있는 만 50세 이상 RHA 환자를 대상으로 한 1건의 대규모 무작위배정 PASS 연구의 이 약 투여 환자와 비교하여 환자에서 관찰되었습니다. 특히, 높은 질환활성률 가진 루페이트스 관절염 환자에서 림프증 발생 위험이 일반인에 비해 몇 배까지 높게 나타났으며, 이 약의 Janus associated Kinase(JAK) 억제작용이 림프증 발생에 미치는 역할은 명확하지 않습니다.
- 이 약 투여 환자에 폐암이 관찰되었습니다. 적어도 1개의 추가 실험관계 위험요인이 있는 만 50세 이상 RHA 환자를 대상으로 한 1건의 대규모 무작위배정 PASS 연구의 이 약 투여환자에서 폐암이 관찰되었으며, TNF 억제제에 비해 이 약을 투여한 환자에서 폐암 발생 위험이 더 높게 나타났습니다.
- 적어도 1개의 추가 실험관계 위험요인이 있는 만 50세 이상 RHA 환자를 대상으로 한 대규모 무작위배정 PASS 연구에서, TNF 억제제에 비해 이 약을 투여 받은 환자에서 악성종양의 증가가 관찰되었습니다. NMSC 제외한 악성종양은 65세 이상 환자와 현재 또는 과거의 정기간 흡연자였던 환자에서 더 흔했습니다. 65세 이상의 환자, 현재 또는 과거의 정기간 흡연자였던 환자 및 기타 악성종양 위험요인(예: 악성종양이 현재 있거나 악성종양의 병력이 있는 경우)이 있는 환자의 경우, 다른 적절한 치료제가 없는 경우에만 한하여 이 약을 사용해야 합니다.
- 이 약을 투여받은 환자 및 적어도 1개의 추가 실험관계 위험요인이 있는 만 50세 이상 RHA 환자를 대상으로 한 1건의 대규모 무작위배정 PASS 연구의 이 약 투여 환자와 비교하여 환자에서 관찰되었습니다. 특히, 높은 질환활성률 가진 루페이트스 관절염 환자에서 림프증 발생 위험이 일반인에 비해 몇 배까지 높게 나타났으며, 이 약의 Janus associated Kinase(JAK) 억제작용이 림프증 발생에 미치는 역할은 명확하지 않습니다.
- 적어도 1개의 추가 실험관계 위험요인이 있는 만 50세 이상 RHA 환자를 대상으로 한 대규모 무작위배정 PASS 연구에서, TNF 억제제에 비해 이 약을 투여 받은 환자에서 악성종양의 증가가 관찰되었습니다. NMSC 제외한 악성종양은 65세 이상 환자와 현재 또는 과거의 정기간 흡연자였던 환자에서 더 흔했습니다. 65세 이상의 환자, 현재 또는 과거의 정기간 흡연자였던 환자 및 기타 악성종양 위험요인(예: 악성종양이 현재 있거나 악성종양의 병력이 있는 경우)이 있는 환자의 경우, 다른 적절한 치료제가 없는 경우에만 한하여 이 약을 사용해야 합니다.
- 이 약을 투여받은 환자 및 적어도 1개의 추가 실험관계 위험요인이 있는 만 50세 이상 RHA 환자를 대상으로 한 대규모 무작위배정 PASS 연구에서, TNF 억제제에 비해 이 약을 투여 받은 환자에서 악성종양의 증가가 관찰되었습니다. NMSC 제외한 악성종양은 65세 이상 환자와 현재 또는 과거의 정기간 흡연자였던 환자에서 더 흔했습니다. 65세 이상의 환자, 현재 또는 과거의 정기간 흡연자였던 환자 및 기타 악성종양 위험요인(예: 악성종양이 현재 있거나 악성종양의 병력이 있는 경우)이 있는 환자의 경우, 다른 적절한 치료제가 없는 경우에만 한하여 이 약을 사용해야 합니다.
- 이 약을 투여받은 환자 및 적어도 1개의 추가 실험관계 위험요인이 있는 만 50세 이상 RHA 환자를 대상으로 한 대규모 무작위배정 PASS 연구에서, TNF 억제제에 비해 이 약을 투여 받은 환자에서 악성종양의 증가가 관찰되었습니다. NMSC 제외한 악성종양은 65세 이상 환자와 현재 또는 과거의 정기간 흡연자였던 환자에서 더 흔했습니다. 65세 이상의 환자, 현재 또는 과거의 정기간 흡연자였던 환자 및 기타 악성종양 위험요인(예: 악성종양이 현재 있거나 악성종양의 병력이 있는 경우)이 있는 환자의 경우, 다른 적절한 치료제가 없는 경우에만 한하여 이 약을 사용해야 합니다.
- 이 약을 투여받은 환자 및 적어도 1개의 추가 실험관계 위험요인이 있는 만 50세 이상 RHA 환자를 대상으로 한 대규모 무작위배정 PASS 연구에서, TNF 억제제에 비해 이 약을 투여 받은 환자에서 악성종양의 증가가 관찰되었습니다. NMSC 제외한 악성종양은 65세 이상 환자와 현재 또는 과거의 정기간 흡연자였던 환자에서 더 흔했습니다. 65세 이상의 환자, 현재 또는 과거의 정기간 흡연자였던 환자 및 기타 악성종양 위험요인(예: 악성종양이 현재 있거나 악성종양의 병력이 있는 경우)이 있는 환자의 경우, 다른 적절한 치료제가 없는 경우에만 한하여 이 약을 사용해야 합니다.
- 이 약을 투여받은 환자 및 적어도 1개의 추가 실험관계 위험요인이 있는 만 50세 이상 RHA 환자를 대상으로 한 대규모 무작위배정 PASS 연구에서, TNF 억제제에 비해 이 약을 투여 받은 환자에서 악성종양의 증가가 관찰되었습니다. NMSC 제외한 악성종양은 65세 이상 환자와 현재 또는 과거의 정기간 흡연자였던 환자에서 더 흔했습니다. 65세 이상의 환자, 현재 또는 과거의 정기간 흡연자였던 환자 및 기타 악성종양 위험요인(예: 악성종양이 현재 있거나 악성종양의 병력이 있는 경우)이 있는 환자의 경우, 다른 적절한 치료제가 없는 경우에만 한하여 이 약을 사용해야 합니다.
- 이 약을 투여받은 환자 및 적어도 1개의 추가 실험관계 위험요인이 있는 만 50세 이상 RHA 환자를 대상으로 한 대규모 무작위배정 PASS 연구에서, TNF 억제제에 비해 이 약을 투여 받은 환자에서 악성종양의 증가가 관찰되었습니다. NMSC 제외한 악성종양은 65세 이상 환자와 현재 또는 과거의 정기간 흡연자였던 환자에서 더 흔했습니다. 65세 이상의 환자, 현재 또는 과거의 정기간 흡연자였던 환자 및 기타 악성종양 위험요인(예: 악성종양이 현재 있거나 악성종양의 병력이 있는 경우)이 있는 환자의 경우, 다른 적절한 치료제가 없는 경우에만 한하여 이 약을 사용해야 합니다.
- 이 약을 투여받은 환자 및 적어도 1개의 추가 실험관계 위험요인이 있는 만 50세 이상 RHA 환자를 대상으로 한 대규모 무작위배정 PASS 연구에서, TNF 억제제에 비해 이 약을 투여 받은 환자에서 악성종양의 증가가 관찰되었습니다. NMSC 제외한 악성종양은 65세 이상 환자와 현재 또는 과거의 정기간 흡연자였던 환자에서 더 흔했습니다. 65세 이상의 환자, 현재 또는 과거의 정기간 흡연자였던 환자 및 기타 악성종양 위험요인(예: 악성종양이 현재 있거나 악성종양의 병력이 있는 경우)이 있는 환자의 경우, 다른 적절한 치료제가 없는 경우에만 한하여 이 약을 사용해야 합니다.
- 이 약을 투여받은 환자 및 적어도 1개의 추가 실험관계 위험요인이 있는 만 50세 이상 RHA 환자를 대상으로 한 대규모 무작위배정 PASS 연구에서, TNF 억제제에 비해 이 약을 투여 받은 환자에서 악성종양의 증가가 관찰되었습니다. NMSC 제외한 악성종양은 65세 이상 환자와 현재 또는 과거의 정기간 흡연자였던 환자에서 더 흔했습니다. 65세 이상의 환자, 현재 또는 과거의 정기간 흡연자였던 환자 및 기타 악성종양 위험요인(예: 악성종양이 현재 있거나 악성종양의 병력이 있는 경우)이 있는 환자의 경우, 다른 적절한 치료제가 없는 경우에만 한하여 이 약을 사용해야 합니다.
- 이 약을 투여받은 환자 및 적어도 1개의 추가 실험관계 위험요인이 있는 만 50세 이상 RHA 환자를 대상으로 한 대규모 무작위배정 PASS 연구에서, TNF 억제제에 비해 이 약을 투여 받은 환자에서 악성종양의 증가가 관찰되었습니다. NMSC 제외한 악성종양은 65세 이상 환자와 현재 또는 과거의 정기간 흡연자였던 환자에서 더 흔했습니다. 65세 이상의 환자, 현재 또는 과거의 정기간 흡연자였던 환자 및 기타 악성종양 위험요인(예: 악성종양이 현재 있거나 악성종양의 병력이 있는 경우)이 있는 환자의 경우, 다른 적절한 치료제가 없는 경우에만 한하여 이 약을 사용해야 합니다.

- 비흑색종 피부암
 - 이 약을 투여받은 환자에서 비흑색종 피부암(NMSC)이 보고되었습니다.
 - 적어도 1개의 추가 실험관계 위험요인이 있는 만 50세 이상 RHA 환자를 대상으로 한 1건의 대규모 무작위배정 PASS 연구에서 NMSC가 보고되었습니다. 이 연구에서 TNF 억제제에 비해 이 약 투여 환자에서 피부 편평세포암종을 포함한 전체 NMSC의 증가가 관찰되었습니다. 고령자 및 NMSC의 기원력 환자에서 NMSC의 발병률이 더 높기 때문에, 이러한 환자에 투여할 때에는 주의합니다. 피부암 위험성이 높은 환자에서는 정기적인 피부진료가 권장됩니다.
 - 폐암성 대장암군에서, 이 약 10mg 1일 2회 투여는 비흑색종 피부암의 더 높은 위험성과 연관되었습니다.
- 결핵성 폐렴증
 - 만성 폐렴증의 병력이 있는 환자에서 감염이 쉽게 일어날 수 있으므로, 주의가 필요합니다(3. 신중투여할 참조).
 - 임상시험 및 시판후에 임상시험 폐렴환자부 사망사례 포함) 이 약 투여환자에서 보고되었으나, 이 사례에서 이 약의 JAK 억제작용이 어떤 역할을 하는지는 알려지지 않았습니다.

- 위장관 천공
 - 적어도 1개의 추가 실험관계 위험요인이 있는 만 50세 이상 RHA 환자를 대상으로 한 1건의 대규모 무작위배정 PASS 연구에 포함하여 임상 임상시험에서 위장관 천공사례가 보고되었습니다. 이러한 사례에서 이 약의 약물작기인전 JAN 억제작용의 역할은 불확실 하 있습니다. 사례로는 게실천공, 복막염, 복부농양 및 중수염이 보고 보고되었습니다. 루페이트스 관절염에 대한 임상시험에서(2상, 3상 및 3차 임상 시험), 이 약 투여 시 위장관 천공의 발생률은 100주자-년당 0.1770이었습니다. 위장관 천공이 나타나 루페이트스 관절염 환자는 비스테로이드성 항염증 약물(NSAIDs) 및/또는 코르티코스테로이드를 병용투여하고 있었습니다. 위장관 천공을 일으키는데 대하여 이러한 위험성과도 이 약의 관련성은 알려져 있지 않습니다.
 - 폐암성 대장암 임상시험에서, 이 약 투여군 및 위약군 간에 위장관 천공의 빈도 차이는 없었으며, 환자를 대다수는 배경약물로 코르티코스테로이드를 투여받고 있었습니다.
 - 이 약은 위장관 천공 위험이 높은 환자 (예, 게실염 병력이 있는 환자 또는 NSAIDs를 복용중인 환자)에게 주의하여 사용해야 합니다. 새로운 복부 증상을 나타낸 환자는 조기에 위장관 천공여부를 발견하기 위해 즉시 검사를 받아야 합니다.
- 골절
 - 임상 시험 및 시판 후 사용 중에 이 약을 투여받은 환자에서 골절이 관찰되었습니다.
 - RHA 환자를 대상으로 한 제3상 대조 임상시험의 통합분석에서, 0-3개월 동안 노출 시 골절 발생률은 이 약 5 mg 1일 2회 투여군, 이 약 10 mg 1일 2주 투여군, 아비루무암 투여군 및 위약군에서 각각 100환자-년당 2.11명, 2.56명, 0.70명 및 4.43명이었습니다.
 - 적어도 1개의 추가 실험관계 위험요인이 있는 만 50세 이상 RHA 환자를 대상으로 한 대규모 무작위배정 PASS 연구에서, 이 약 5mg 이 약 10mg 및 TNF 억제제 투여 시 골절 발생률은 각각 100 환자-년당 2.79 명, 2.87명 및 2.27 명이었습니다. TNF 억제제에 비해, 이 약 5 mg 투여군의 골절 위험(95% 신뢰구간)은 1.23(0.96, 1.58), 토파시티닙 10 mg 투여군의 위험(95% 신뢰구간)는 1.26(0.97, 1.62)이었습니다. 고령자, 여성 환자 및 코르티코스테로이드 사용 환자와 같이 알려진 골절 위험자가 있는 환자는 주의해야 합니다.
- 과민반응
 - 시판 후 경험에서 이 약 투여와 관련 있는 과민반응 이 보고되었습니다. 알레르기 반응으로 혈관부종과 두드러기가 나타났으며, 중대한 사례도 보고되었습니다. 중대한 사례의 대부분은 다양한 알레르기 병력이 있는 환자에서 나타났습니다. 중대한 알레르기 반응 또는 이비인후과성 반응이 나타나거나 이 약의 투여를 즉시 중단합니다.
- 예방 접종
 - 이 약의 투여를 시작하기 전에 최신의 예방 접종 가이드라인에 따라 예방 접종을 실시해야 합니다.
 - 이 약을 투여 받은 환자에서 생백신 감염의 2차 전염에 대한 자료가 없습니다. 이 약은 생백신과 동시에 투여해서는 안 됩니다. 다만 접종이 필요한 경우 환자의 면역능력을 고려하여 결정하여야 하며, 생백신 접종 중 이 약의 투여시작은 최신의 예방접종 가이드라인에 따르면 가능합니다. 또한 이 약을 복용 중인 환자는 최근에 생백신(예, 수두백신)을 접종받은 자와의 접촉을 피해야 합니다.
 - 1회 10 mg, 1일 2회로 토파시티닙 또는 위약 투여를 시작하는 환자를 위한 TNF 억제제 관절염 환자를 대상으로 수행된 9주의 임상시험에서 인플루엔자 및 폐렴구균 백신을 동시 투여하여 체액성 반응을 평가한 별개의 백신 연구에서 환자들은 약 22개월(중간지) 동안 토파시티닙을 1회 10 mg씩 1일 2회 투여받았습니다. 메토크세이트 투여 여부에 상관없이 토파시티닙을 투여받은 환자의 6% 이상에서 인플루엔자 및 폐렴구균 백신에 대한 적절한 체액성 반응이 나타났습니다. 토파시티닙 및 메토크세이트를 병용 투여한 환자군(66%)은 토파시티닙 단독요법군(89%)과 비교하여 폐렴구균 백신에 대해 더 낮은 반응률을 보였으며(6% 대 89%), 이는 추가 대조 임상시험의 결과와 일관됩니다.
 - 메토크세이트를 배경약물로 투여중인 루페이트스관절염 환자를 대상으로 한 대조 임상시험에서 12주 동안의 이 약 5 mg 1일 2회 또는 위약투여를 시작하기 2-3주 전에 악독화 바이러스 생백신(조스타바이러스; 대립포진생바이러스백신)을 예방접종하였습니다. 6주 후에, 이 약과 위약투여 환자에서 체액성 및 세포-매개성 면역반응이 나타났습니다. 이러한 반응은 만 50세 이상의 건강한 지원자에서도 유사하게 나타났습니다.

- 시상에서 수두감염의 병력이 없고 베스타라에어 합수두형에 없었던 1명의 환자가 예방접종 16주후, 이 약 투여 2월 후에 수두대상포진바이러스의 감염을 경험하였습니다. 이 약을 투여는 중단되었으며, 환자는 표준용량의 항바이러스제 투여로 회복되었습니다. 이 환자는 이 후 백색에 대한 자연성 체액성 및 세포-매개성 면역반응이 나타났습니다.
- 임상시험자에 대한 영향
 - 림프구
 - 이 약을 투여 후 1개월 시점에서 최초의 림프구 수 증가와 관련이 있었으며, 이후 12개월 치료기간 동안, 평균 림프구 수가 베이슬라인 이하 약 10% 정도로서 지속하 감소하였습니다. 500 cells/mm³ 미만인 ALC는 치명된 중대한 감염 사례 증가와 관련이 있었습니다. 림프구 수가 낮은 즉, ALC 500 cells/mm³ 미만으로 확인된 환자에서 이 약을 투여해서는 안 됩니다. 베이슬라인 및 이후 매 3개월마다 림프구 수를 관찰해야 하며 림프구수에 따른 권장 용량 조절은 용법 및 용량을 참고합니다.
 - 호중구
 - 이 약은 위약에 비해 호중구 감소증(2,000 cells/mm³미만)의 사례 증가와 관련이 있습니다. ANC가 지속적으로 500-1,000 cells/mm³인 환자는 ANC가 1,000 cells/mm³초과가 될 때까지 이 약 투여를 강할 또는 중단해야 합니다. 이 약 1회 10 mg을 1일 2회 투여한 경우, 1회 5 mg 1일 2주로 감량합니다. 기존에 이 약 1회 5 mg을 1일 2주로 투여한 경우, 투여를 적절히 중단합니다. 호중구 수가 낮은 즉, ANC가 500 cells/mm³ 미만인 환자에게 이 약을 투여해서는 안 됩니다. 베이슬라인과 치료 4-8주 그리고 이후 3개월마다 호중구 수를 관찰해야 합니다. ANCE에 따른 권장 용량 조절은 용법 및 용량을 참고합니다.
 - 헤모글로빈
 - 헤모글로빈 수치가 낮은 (즉, 9 g/dL 미만) 환자들의 경우 이 약의 투여를 시작하지 않습니다. 헤모글로빈 수치가 8 g/dL 미만이거나, 헤모글로빈 수치 치료 중 2g/dL를 초과하여 떨어진 환자는 이 약 투여를 중단해야 합니다. 베이슬라인과 치료 4-8주 그리고 이후 3개월마다 헤모글로빈 수치를 관찰해야 합니다. 헤모글로빈 수치에 따른 권장용량 조절은 용법 및 용량을 참고합니다.
 - 간 효소
 - 이 약은 위약에 비해 간 효소 상승 사례의 증가와 관련이 있습니다. 대부분 배경약물로 DMARDs (주로 메토크세이트)를 투여한 임상시험에서 나타났습니다. 잠재적인 약물-유래 간 손상 사례를 파악하기 위해 주기적인 간기능 검사와 간 효소 상승 원인에 대해 즉각적으로 조사할 것을 권장합니다. 만약 약물-유래 간 손상이 의심되는 경우, 이러한 간 손상 진단이 배제될 때까지 이 약의 투여를 중단해야 합니다.
 - 지질
 - 이 약은 총 콜레스테롤, 저밀도 지질단백(LDL) 콜레스테롤 및 고밀도 지질단백(HDL) 콜레스테롤을 포함하는 지질 검사수치의 증가와 관련이 있었습니다. 일반적으로 6주 이내에 최대 영향이 관찰되었고 이러한 지질상기 수치가 실험관 질병 이환를 및 사망률에 미치는 영향은 아직 확인되지 않았습니다.
 - 적어도 1개의 추가 실험관계 위험요인이 있는 만 50세 이상 RHA 환자를 대상으로 한 대규모 무작위배정 PASS 연구에서 총 콜레스테롤, LDL 콜레스테롤 및 HDL 콜레스테롤 증가가 보고되었습니다.
 - 지질상기 수치에 대한 평가는 이 약 투여 시작 후 약 4-8주 동안 수행되어야 합니다. 고지혈증 관리를 위한 임상 가이드라인에 따라 환자를 관리해야 합니다. 이 약 투여로 인한 총 콜레스테롤 및 저밀도 지질단백(LDL)의 증가는 스타틴 요법에 의해 이 약 투여 전 수치까지 감소시킬 수 있습니다.

- 건강에 환자
 - 이 약을 투여한 중증도 건강에 환자에서 토파시티닙 혈중농도가 간간히 약이 정상인 환자보다 더 높았습니다. 더 높은 혈중농도는 이상반응 위험을 증가시킬 수 있습니다. 따라서 중증도의 건강에 환자에서 이 약의 용량조절이 권장됩니다(용법-용량 참조). 중증의 건강에 환자에 이 약은 사용해서는 안 됩니다. 경증의 건강에 환자에서는 용량조절이 필요하지 않습니다. 임상시험에서 B형 또는 C형 간염바이러스가 양성인 환자 또는 중증의 건강에 환자에 대한 이 약의 안전성 및 유효성이 연구된 적은 없습니다.
- 신장에 환자
 - 이 약을 투여한 중증도 또는 중증의 신장애 환자에서 토파시티닙 혈중농도가 신기능이 정상인 환자보다 더 높았습니다. 따라서 중증도

또는 중증의 신장애 환자에서는 이 약의 용량조절이 권장됩니다(용법-용량 참조). 중증 신장애 환자에서 혈액투석을 한 경우에도 강한 영향을 유지하도록 합니다. 경증의 신장애 환자에서는 용량조절이 필요하지 않습니다.

- 다른 약제와의 병용
 - 이 약은 TNF 억제제, IL-1R 억제제, IL-6R 억제제, 항 CD20 단일클론항체 및 선택적 상호촉진 조절제와 같은 생물학적 DMARDs 및 아자티오프린, 사이클로스포린과 같은 강력한 면역억제제와 병용하는 루페이트스 관절염 환자에 대해서는 연구된 바 없으며, 면역억제제의 증가와 감염 위험 증가의 가능성 때문에 병용으로 사용해서는 안 됩니다.
 - 이 약은 루페이트스 관절염의 치료에 사용시, 루페이트스전문회 또는 루페이트스 관절염 치료에 전문 지식이 있는 의사에 의해 투여가 시작되고 모니터링 되어야 합니다.
 - 이 약으로 치료받은 환자에서서 망막 정맥 혈전증이 보고되었습니다(4. 이상반응 참조). 망막 정맥 혈전증을 암시하는 증상이 나타나면 경우 신속히 치료를 받도록 환자에게 조언해야 합니다.
 - 당뇨병 위험을 받은 환자에게서 저혈당증
 - 당뇨병 약물을 투여받은 환자에게 이 약의 투여 이후 저혈당증 사례가 보고되었습니다. 저혈당증 발생 시 항당뇨병약의 용량 조정이 필요할 수 있습니다.

6. 상호작용

- 강력한 CYP3A4 억제제: 이 약은 강력한 CYP3A4 억제제 (예, 케토코나졸)와 병용 투여하는 경우 이 약의 노출이 증가합니다. 케토코나졸과의 병용투여(토파시티닙의 단독 투여시 이 약의 AUC 및 C_{max}는 각각 103% 및 16% 증가하였습니다). 2) 중증도 및 CYP3A4 및 강력한 CYP2C19 억제제: 이 약은 중증도의 CYP3A4 억제작용 및 강력한 CYP2C19 억제작용을 모두를 나타내는 약물 (예, 플루로티다졸)과 병용 투여하는 경우 이 약의 노출이 증가합니다. 플루코나졸과의 병용 투여 시 이 약의 AUC 및 C_{max}는 각각 79% 및 27% 증가하였습니다.
- 강력한 CYP3A4 유도제: 이 약은 강력한 CYP3A4 유도제 (예, 리페린)와 병용 투여하는 경우 이 약의 노출이 감소합니다. 리페린과의 병용투여시, 이 약의 AUC 및 C_{max}는 각각 84% 및 74% 감소하였습니다. 이 약과 강력한 CYP3A4 유도제와의 병용투여는 권장되지 않습니다.
- 면역억제제: 이 약은 강력한 면역 억제제 (예, 아자티오프린, 타크로리무스, 사이클로스포린)와 병용 투여하는 경우 면역억제 작용이 증가할 위험이 있습니다. 약한 CYP3A4억제제인 타크로리무스와 병용 투여 시 이 약의 AUC는 21% 증가하고, C_{max}는 9% 감소하였습니다. 중증도의 CYP3A4억제제인 사이클로스포린과의 병용 투여 시 이 약의 AUC는 73% 증가하고, C_{max}는 17% 감소하였습니다. 루페이트스 관절염, 건선성 관절염 또는 궤양성 대장염 환자에서 강력한 면역 억제제와 다양한 용량의 이 약과의 병용에 대해 연구된 바 없습니다. 이 약은 생물학적 항루페이트스제제 또는 강력한 면역억제제와 병용투여해서는 안됩니다.
- 루페이트스 관절염 환자에게 이 약 1회 5 mg씩, 1일 2회 투여 시 도달하는 항정성상태 총 C_{max}의 161배 및 유리(free) C_{max}의 268배를 초과하는 농도로 실시한 in vitro 시험에서, 이 약은 사람의 주요 약물대사 물질인 CYPs (CYP1A2, CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP3A4)를 통해 대사되는 약물의 활성을 유의하게 억제하거나, 유도하지 않았습니다. 이러한 in vitro 결과와 같이 어떤 약물 상호작용시험에서도 이 약과 미다솔람(CYP3A4 기질)의 병용 투여 시 미다솔람의 약동학에 변화가 나타나지 않았습니다.
- in vitro 시험은, 루페이트스 관절염 환자에서 이 약 1회 5 mg, 1일 2회 투여시 도달하는 항정성상태의 총 C_{max} 및 유리(free) C_{max}를 각각 538배, 893배 초과하는 농도에서, 이 약이 사람의 주요 약물대사 물질인 UGTs(uridine 5'-diphospho-glucuronosyltransferases; UGT1A1, UGT1A4, UGT1A6, UGT1A9, UGT2B7)의 활성을 유의하게 억제하지 않는다는 것을 보여줍니다. In vitro 자료에 의하면, 이 약은 치료농도에서 P-glycoprotein, 유기음이온 수송 펌프메틴, 유기음이온 또는 양이온 수송체와 같은 수송체를 억제할 가능성은 낮았습니다.
- 건강한 여성 지원자에서 이 약과 병용투여시 경구 피임제(레보노르게스테렐 및 에티닐에스트라디올)의 약동학에 영향을 미치지 않았습니다.
- 메토크세이트와의 병용 투여(메토크세이트 15-25 mg을 1주 1회 투여)는 이 약의 약동학에 영향을 미치지 않았습니다. 이 약을 메토크세이트 15-25 mg 1주 1회 투여와 병용 시, 메토크세이트와의 AUC 및 C_{max}가 각각 10% 및 13% 감소하였습니다. 이러한 메토크세이트의 노출의 감소 정도에 따라 개별적인 메토크세이트 투여용량의 변경이 반드시 필요한 것은 아닙니다.
- 이 약의 병용 투여는 메토프로미딘의 약동학에 영향을 주지 않았으며, 이는 건강한 지원자에서 이 약이 유기 양이온 수송체(OCT2)를 저해하지 않는다는 것을 보여줍니다.
- 루페이트스 환자에서 이 약의 경구 정소용은 시간에 따라 변하지 않으며, 이는 루페이트스 관절염 환자에서 이 약의 CYP 효소 활성을 정상화(normalize)하지 않는다는 것을 의미합니다. 따라서, 루페이트스 관절염 환자에서 이 약을 CYP기질과 병용 투여 시 CYP 기질의 약사가 임상적으로 증가할 것으로 예상되지는 않습니다.

7.임부 및 수유부에 대한 여

- 임부
 - 임신한 여성을 대상으로 적절하게 잘 정해진 시험은 없습니다. 이 약은 임부 또는 임신가능성이 있는 여성에게 투여해서는 안 됩니다. 가임여성에게 이 약 투여 중 및 마지막 용량투여 후 최소 4주동안은 효과적인 피임법을 사용하도록 합니다.
 - 토파시티닙은 컷트와 토끼를 대상으로 한 실험에서 최대관장용량 10 mg 1일 2회의 각각 73배 및 6.3배 높게 태仔손실, 초기배발신율은 낮았습니다. 컷트와 배-태仔 발달시험에서 토파시티닙은 권장 용량 5 mg 1일 2회의 146배 노출 및 최대관장용량 10 mg 1일 2회의 73배 노출(컷트에서 경구 용량 100 mg/kg/day으로 AUC에 근거함)에서 초기배발신을 보였습니다. 초기배형성 는 각각 전신배종과 막성신선증결손과 같은 유 및 연부 조직 기형과 골격 기형 또는 변이 (경추증손실; 납다리뼈, 종아리뼈, 위뼈뼈, 위뼈뼈, 어깨뼈, 정강이뼈, 다뼈, 구부러짐; 흉골피막; 갈비뼈 손실; 납다리뼈 기형; 갈비뼈 분리증; 갈비뼈 융합증; 복장배부절 융합증 및 흉추 중추의 반측축로 나타났습니다. 또한, 조기 및 말기 재흡수 후 극성 후 손상; 손실이 증가하여 생존가능한 태아 수가 감소했습니다. 태어 평균 체중이 감소했습니다. 컷트에서 권장용량 5 mg 1일 2회의 약 58배 노출 및 최대관장용량 10 mg 1일 2회의 약 29배 노출(컷트에서 경구 용량 30 mg/kg/day으로 AUC)에 근거함)에서는 발달 독성이 관찰되지 않았습니다.
 - 토끼의 배-태仔 발달시험에서 토파시티닙은 권장용량 5 mg 1일 2회의 약 13배 노출 및 최대관장용량 10 mg 1일 2회의 약 6.3배 노출(컷트에서 경구 용량 30 mg/kg/day으로 AUC)에 근거함)에서 모태독성의 징후 없이 초기배형성이 나타났습니다. 초기배형성은 흉곽배피막증, 배꼽내장탈출, 막성신선증결손, 두개/골격 기형 (소두증, 소안구증), 정중선 및 고리 결손 등으로 나타났습니다. 또한 말기 재흡수 후 관련된 손상 후 손실의 증가가 관찰되었습니다. 토끼에서 권장용량 5 mg 1일 2회의 약 3배 노출 및 최대관장용량 10 mg 1일 2회의 약 1.5배 노출(컷트에서 경구 용량 10 mg/kg/day으로 AUC에 근거함)에서는 발달 독성이 관찰되지 않았습니다.
 - 3주ანი 및 출생 후의 컷트 시험에서, 권장용량 5 mg 1일 2회의 약 73배 노출 및 최대관장용량 10 mg 1일 2회의 약 36배 노출농도 (컷트에서 경구 용량 50 mg/kg/day으로 AUC에 근거함)에서 생존한 새끼의 크기, 출생 후 생존 및 새끼 체중이 감소하였습니다. 컷트에서 권장용량 5 mg 1일 2회의 약 17배 노출 및 최대관장용량 10 mg 1일 2회의 약 8.3배 노출농도(컷트에서 경구 용량 10 mg/kg/day으로 AUC에 근거함)에서는 생존 및 학습 평가, 성적 성숙 또는 1세대 컷트가 컷트기를 하고 자식 생물이 가능한 2세대 태아를 생산하는 능력에는 영향이 없었습니다.

- 수유부
 - 공개된 자료에 따르면, 토파시티닙은 모유로 이행됩니다. 공개된한 및 시판후 자료에서 토파시티닙이 모유 수유 중인 영아에게 미치는 영향에 대한 충분한 인과관계가 없는 소수의 임상사례도 기록됩니다. 모유 생산량 미치는 영향에 대해서는 자료가 없습니다.
 - 많은 약물이 모유로 배설되고, 모유를 먹는 영아에게 토파시티닙의 영향 중대한 임상적 의미가 있을 때문에, 수유부에 대한 약물의 중요성을 고려하여, 수유 중단 또는 약물 투여 중단을 결정해야 합니다.

8.소아에 대한 투여

소아 환자에서 이 약의 안전성 및 유효성은 확립되지 않았습니다.

9.고령자에 대한 투여

루페이트스 관절염 임상시험-V에 참여하인 2,71명의 환자 중 65세 이상 고령자는 총 608명이고, 이 중 85명은 75세 이상이었습니다. 중대한 감염은 이 약을 투여한 피험자 중 65세 이상에서 65세 미만인 환자보다 빈번하게 나타났습니다. 일반적으로 고령자에서 감염 사례가 높기 때문에 이 약 투여 시 주의가 요구됩니다.
폐암성 대장암 임상시험-V에서 이 약 투여받은 1156명의 환자 중, 총 77명(7%)이 65세 이상 이었습니다. 이 환자수는 높은 환자 군에서의 반응과 다중치 비교하기애 충분치 않았습니다.

10.과량투여시의 지

- 이 약의 과량 투여에 대한 경험은 없습니다. 건강한 피험자를 대상으로 100 mg 단회 투여를 포함한 약동학적 자료에서 투여 용량의 95% 이상인 2441건 이내에 소독되었습니다.
- 과량투여에 대한 투여법은 없습니다. 대중적이고 보조적인 처치가 요구됩니다. 과량 투여한 경우, 환자에게 이상 반응과 관련한 증상 및 징후가 나타나지 관찰할 것을 권장하여 이상 반응을 경험한 환자는 적절한 치료를 받아야 합니다.

11.보안 및 취급상의 주의사항

- 아래의 주의 사항이 있는 곳에 보관합니다.
- 다른 용기에 바꾸어 넣은 것은 사용이외에 되거나 품질유지 면에서 바람직하지 않으므로 이를 주의합니다.

12.의약품동등성시험 정보

지: 시험약 지크론정5일그림(토파시티닙트르산염)(주)제뉴파마)과 대조약 젤잔정5일그림(토파시티닙트르산염)(한국화이자제약)을 2×2 교차시험으로 각 13회 건강한 성인에게 공복 시 단회 경구투여하여 39명의 혈중 토파시티닙을 측정한 결과, 비교평가항목치(AUC, C_{max})를 로그변환하여 통계처리하였을 때, 기하평균비율의 90% 신뢰구간이 80.00~125.00% 이내로서 생물학적으로 동등함을 입증하였습니다.

구분	비교평가항목		참고평가항목		
	AUC _{0-12hr} (ng·hr/mL)	C _{max} (ng/mL)	T _{max} (hr)	t _{1/2} (hr)	
대조약	젤라조정5밀리그램 (토파시타닐비스트로산염) (한국화이자제약(주))	142.5±27.5	68.34±18.16	0.50 (0.33~1.50)	2.38±0.23
시험약	지크무정5밀리그램 (토파시타닐비스트로산염) (주제뉴파마)	137.6±27.2	64.22±20.22	0.50 (0.33~2.00)	2.43±0.26
기하평균비율의 90% 신뢰구간 (기준: 80.00~125.00%)		93.81~ 99.31%	85.73~ 100.42%		
(AUC, C _{max} , t _{1/2} ; 평균값 ± 표준편차, T _{max} ; 중앙값(범위), n=39)					
AUC: 투약시간부터 최종혈중농도 전량시각까지의 혈중농도-시간곡선하면적					