

[illegible]

제 67 이보트르산과 정충류에 대한 한국산(원)동물체의 위험 평가에 관한 연구 결과요약서	
식물근육 내의 HIV 단백질분해효소 저해제(티라나비르와 리티나비르 병용), C형 간염 단백질분해효소 저해제(텔라프라비르), 펩티도보질, 푸시드산	이 약을 투여하지 않는다.
HIV 단백질분해효소 저해제(리나비르와 리티나비르 병용)	이 약과 병용 투여 시 주의하여야 하며 최저용량으로 투여해야 한다.
클라트리모마신, 이트라코나졸, HIV 단백질분해효소 저해제(사퀴나비르와 리티나비르 병용), 디루나비르와 리티나비르 병용, 포스마테나비르, 포스마테나비르와 리티나비르 병용, C형 간염 항바이러스 약물(레소피라비르, 그라조프라비르)	이 약 투여량은 1일 10/20mg을 초과하지 않는다.
HIV 단백질분해효소 저해제(네프타비리), C형 간염 단백질분해효소 저해제(보사피라비르)	이 약 투여량은 1일 10/40mg을 초과하지 않는다.

[illegible][illegible][illegible]

이 약은 소아에 대한 안전성 및 유효성이 확립되어 있지 않으므로 투여가 권장되지 않는다.

9. **고령자**에 대한 특이

고령(만 65세 이상)은 근육병증에 걸리기 쉬운 요인 중 하나이므로 이 약을 고령자에게 투여 시 주의를 기울여야 한다. 고령자에서 이 약의 용량 조절은 필요하지 않다.

10. 가장 애환자에 대한 투여

활동에서 가질화 또는 가아미노저달효소 수치가 워이브명의로 지속적으로 높은 환자에는 이 약을 투여하지 않는다. 2. 다음 환자에는 투여하지 말 것. 5. 일반적 주의

분별능이 정확히(Childs-Pugh B)환자의 경우 현저하게(C_{max} 가 약 16배, AUC가 약 11배) 증가하였다.

11. 신장에 화자에 대한 투여

신장에 대한 병력은 물론 근해와 발명의 위험치자가 될 수 있다. 이런 환자들은 골과 효에 대한 엄격한 모니터링이 중요하다. 5. 알칼리 주사의 장조: 0.9%에티르비: 종종 신장에 환자에게(=8, 크레아티닌 클리어런스 $\leq 30\text{ml/min}$, 1.73m²)에 에티르비 10mg 1회 1회 투여 후 건강한 피험자(n=9)와 비교하여 중 에티르비 10mg의 평균 AUC가 약 1.5배 증가하였다. 이러한 결과는 임상적으로 유의하지 않으며, 신장에 환자에 대한 용량조정은 필요 없다.

12. 관광 투여시의 처

이 과정에서 시판되는 특정 지붕은 없다. 이 경우 과다투여 증상은 중증에 따라 치료와 적절한 지지보완을 시도한다. 또한 기기는 검사 및 혈액 CPK 수치 모니터링해야 한다. O.아토르바스타틴^{*}, 아로클라비딘^{*}은 광범위한 혈소판 기능 장애를 하기 때문에 혈소판치는 아토르바스타틴의 청초술을 유의하게 증가시키지 않는다. O.에티미브 1) 에티미브를 과량투여한 것의 보고가 있었다. 대부분은 이상반응을 동반하지 않았으며 보고된 이상 반응은 다음과 같다. 과다투여시에는 알부민 수치를 낮추고 지질요법을 중단한다. 2) 암상시현에서 1일 50mg의 에티미브를 15명경 간강하 환자에서 14일까지 투여하였는데 또는 1일 40mg의 에티미브를 18명의 한발성 이상시현혈종 환자에게 56일간 투여하였을 때 내약성은 일반적으로 우수하다.

13. 모란 및 위법징의 주의사항

1) 어린이의 몸이 풍기 않는 곳에 보관한다. 2) 나는 풍기에 바꾸어 풍는 것은 사고원인이 되거나 품질 유지 면에서 바람직하지 않으므로 이를 주의한다.

[illegible]

LDL-C 변화율(%)	이 약(에제티미브/아토르바스타틴 10/5mg) 투여군 [N=56]	아토르바스타틴 5mg 투여군 [N=55]	에제티미브 10mg 투여군 [N=56]
변화율 LS-Mean(SE)	-	-27.85(3.01)	-13.31(2.96)
군 간 변화율 차이 LS-Mean Difference(SE) [95% 신뢰구간]	-	-14.54(3.24) [-20.97, -8.10]	-
p-value	-	<0.0001	-
변화율 LS-Mean(SE)	-44.47(2.76)	-	-14.05(2.80)
군 간 변화율 차이 LS-Mean Difference(SE) [95% 신뢰구간]	-30.42(3.20) [-36.76, -24.08]	-	-
p-value	<0.0001	-	-
변화율 LS-Mean(SE)	-45.09(2.31)	-28.87(2.39)	-
군 간 변화율 차이 LS-Mean Difference(SE) [95% 신뢰구간]	-16.22(2.71) [-21.59, -10.85]	-	-
p-value	<0.0001	-	-

[illegible]

위험도 분류	LDL 목표 (mg/dL)	치료적 생활양식 변화 ^a 를 시작하는 LDL 수준 (mg/dL)	약물치료를 고려하는 LDL 수준 (mg/dL)
CHD 및 CHD 위험에 상당하는 위험 ^b (10년간 위험도 > 20%) ^c	<100	≥100	≥130 (100-129: 선택적 약물) ^b
2+ 위험 인자 ^a (10년간 위험도 ≤ 20%) ^c	<130	≥130	10년간 위험도 10-20% ^d ≥130 ^e 10년간 위험도<10%: ≥160 ^e
0-1 위험 인자 ^a	<160	≥160	≥190 (160-189: 선택적 LDL-저하약물)

[illegible]

【표지】 30전/부

제조의뢰자: (주)셀트리온제약 / 충청북도 청주시 청원구 오창읍 2산단로 82 제조자: (주)종근당 / 충청남도 천안시 서북구 성거읍 망향로 797-48

* 본 약품은 엄격한 품질검사를 통한 제품입니다. 만약, 구입 시 사용기한 또는 유효기한이 경과되었거나 변질, 변태, 오염, 손상된 제품일 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다. (소비자상담실 : 080-850-3611/2-구산지부담)

※ 이 악을 사용하거 전에 반드시 첨부문서를 주의 깊게 읽어보시고 첨부문서는 항상 악과 함께 보관하시기를 바랍니다.

※ 마인크래프트의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오

※ 다른 유저에게 배포하는 것은 사인크래프트 디스코드 포럼에서 처벌을 받아 배제될지니 양도권과 이력 주지하십시오

※ 의약품 부작용 발생 시 한국의약품안전관리원에 피해구제를 신청할 수 있습니다. (의약품 부작용 신고 및 피해구제 상담: 1644-6223)

작성일자 2025.11.28
기록번호 7000200_4

문의전화 7000398-1