

캐롤비코프

플러스 연질캡슐

기침 · 가래 · 인후통

효과빠른 기침감기약
비타민B₂ 함유

일반의약품


안전용기 취급상의 주의

캐롤비코프 플러스 연질캡슐은 어린이가 함부로 여는 것을 방지하여 약의 오·남용을 사전에 예방하기 위해 안전용기를 사용하였습니다.



10캡슐 PTP 포장을 1캡슐씩 자르세요.

복용방법



접착되지 않은 모서리를 잡고 종이를 벗겨내세요.



캡슐을 눌러 꺼내어 복용하세요.

원료약품 및 분량(1캡슐(920mg) 중)

· 유효성분 :

아세트아미노펜(USP)	200.00mg
클로르페니라민말레산염(KP)	1.25mg
덱스트로메토르판브로화소산염수화물(KP)	8.00mg
guaifenesin(KP)	41.60mg
리보플라빈(KP)	2.00mg

· 첨가제(동물유래성분) : 젤라틴(소, 가축)

· 기타 첨가제 : 경질무수규산, 산화티탄,
소르비톨스페셜글리세린블렌드, 정제수,
치차청색소, 포비돈, 폴리에틸렌글리콜400,
폴리에틸렌글리콜4000, 프로필렌글리콜

성상

황색 내지 녹색의 내용물을 함유한
파란색의 타원형 연질캡슐

효능 · 효과

감기의 증상(여러증상)(콧물, 코막힘, 재채기,
인후(목구멍)통, 기침, 가래, 오한(춥고 떨리는
증상), 발열, 두통, 관절통, 근육통)의 완화

용법 · 용량

만 15세 이상 및 성인 :

1일 3회, 1회 2캡슐 식후 30분에 복용

만 8세 이상~ 만 15세 미만:

1일 3회, 1회 1캡슐 식후 30분에 복용

사용상의 주의사항

복용하시기 전에 아래의 주의사항을 잘 읽어보신
후 복용하시기 바랍니다.

1. 경고

1) 매일 세잔 이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열진통제를 복용해야 할 경우 반드시 의사 또는 약사와 상의해야 합니다. 이러한 사람이 이 약을 복용하면 간 손상이 유발될 수 있습니다.

2) 아세트아미노펜을 복용한 환자에서 매우 드물게 급성 전신성 발진성 농포증(급성 전신성 발진성 고름물집증)(AGEP), 스티븐스-존슨 증후군(SJS), 독성 표피 괴사 용해(TEN)와 같은 중대한 피부 반응이 보고되었고, 이러한 중대한 피부반응은 치명적일 수 있습니다.

따라서 이러한 중대한 피부반응의 징후에 대하여 환자에게 충분히 알리고, 이 약 투여 후 피부발진이나 다른 과민반응의 징후가 나타나면 즉시 복용을 중단하도록 하여야 합니다.

3) 이 약은 아세트아미노펜을 함유하고 있습니다. 아세트아미노펜으로 일일 최대 용량(4,000mg)을 초과할 경우 간손상을 일으킬 수 있으므로 이 약을 일일 최대 용량(4,000mg)을 초과하여 복용하여서는 아니되며, 아세트아미노펜을 포함하는 다른 제품과 함께 복용하여서는 안 됩니다.

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.

1) 이 약 및 이 약의 구성성분에 대한 과민반응 및 그 병력이 있는 사람

2) 이 약 및 이 약의 구성성분, 다른 해열진통제, 감기약 복용 시 천식을 일으킨 적이 있는 사람

3) 만3개월 미만의 영아(갓난아기)

4) MAO억제제(항우울제, 항정신병제, 감정조절제, 항파킨슨제 등)를 복용하고 있거나 복용을 중단한 후 2주 이내의 사람

3. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 마십시오.
진해(기침을 그치게 함)거담제(가래약), 다른 감기약, 해열진통제, 진정제, 항히스타민제를 함유하는 내복약(비염(코염)용) 경구제, 멀미약, 알레르기용약)

4. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.

- 1) 수두 또는 인플루엔자에 감염되어 있거나 또는 의심되는 영아(갓난아기) 및 만 15세 미만의 어린이(구역이나 구토를 유발하는 행동의 변화가 있다면, 드물지만 심각한 질병인 레이증후군의 초기 증상일 수 있으므로 의사와 상의하십시오.)
- 2) 본인, 양친 또는 형제 등이 두드러기, 접촉성피부염, 기관지천식, 알레르기성비염(코염), 편두통, 음식물알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람
- 3) 지금까지 약에 의해 알레르기 증상(예 : 발열, 발진, 관절통, 천식, 가려움증 등)을 일으킨 적이 있는 사람
- 4) 간장질환, 신장(콩팥)질환, 심장질환, 갑상선질환, 당뇨병, 고혈압, 위십이지장염, 녹내장(예 : 눈의 통증, 눈이 침침함 등), 배뇨(소변을 누)곤란 등이 있는 사람, 몸이 약한 사람 또는 고열이 있는 사람
- 5) 속쓰림, 위부불쾌감, 위통과 같은 위장문제가 지속 혹은 재발되거나 궤양, 출혈문제를 가지고 있는 사람
- 6) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부(임신 30주 이후 살리실산나트륨, 살리실아미드, 아스피린, 아스피린알루미늄, 살리실산콜린, 이부프로펜 성분 함유 제제의 투여가 권고되지 않는다.)
- 7) 의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람(당뇨약, 통풍약, 관절염약, 항응고제, 스테로이드제 등 다른 약물을 투여 받고 있는 사람)
- 8) 다음과 같은 기침이 있는 사람 : 흡연, 천식, 만성 기관지염, 폐기종, 과도한 가래가 동반되는 기침, 1주 이상 지속되는 재발되는 기침, 만성기침, 발열·발진이나 지속적인 두통이 동반되는 기침

5. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오.

- 1) 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우 : 발진·발적(충혈되어 붉어짐), 가려움, 구역·구토, 식욕부진, 변비, 부종(부기), 배뇨(소변을 누)곤란, 목마름(지속적이거나 심함), 어지러움, 고열(아열) 대사성 산증(HAGMA)
- 2) 이 약의 복용에 의해 드물게 아래의 중증(심한증상) 증상이 나타난 경우
 - ① 속(아나필락시스)(과민성쇼크) : 복용 후 바로 두드러기, 부종(부기), 가슴답답함 등과 함께 안색이 창백하고, 손발이 차고, 식은땀, 숨쉬기 곤란함 등이 나타날 수 있습니다.

- ② 피부점막만종후군(스티븐스-존슨증후군), 중증표피괴피 사용(리엘증후군) : 고열을 동반하고, 발진·발적(충혈되어 붉어짐), 화상과 같이 물집이 생기는 등의 심한 증상이 전신피부, 입이나 눈 점막에 나타날 수 있습니다.

- ③ 천식
- ④ 간기능장애 : 전신의 나른함, 황달(피부 또는 눈의 흰자위가 황색을 띄게 됨)등이 나타날 수 있습니다.
- ⑤ 간질성폐렴 : 기침을 동반하고, 숨이 차고, 호흡곤란, 발열 등이 나타납니다.

- 3) 5~6회 복용하여도 증상이 좋아지지 않을 경우

6. 소아에 대한 투여

- 만 2세 미만에게 투여하지 않습니다. 다만, 꼭 필요한 경우 의사의 진료를 받습니다.

7. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지켜십시오.
- 2) 장기간 계속 복용하지 마십시오.
- 3) 어린이에게 복용시킬 경우에는 보호자의 지도 감독하에 복용시키십시오.
- 4) 복용시에는 음주하지 마십시오.
- 5) 복용하는 동안 졸음이 오는 경우가 있으므로 자동차 운전 또는 기계류의 운전 조작을 피하십시오.
- 6) 바르비탈계 약물, 삼환계 항우울제 및 알코올을 투여한 환자는 다량의 아세트아미노펜을 대사시키는 능력이 감소되어 아세트아미노펜의 혈장 반감기를 증가시킬 수 있습니다.
- 7) 아세트아미노펜과 플루클록사실린의 병용투여에서 피로글루타민 산증으로 인한 고염이온차 대사성 산증(High anion gap metabolic acidosis, HAGMA)이 보고되었습니다. 가장 위험도가 높은 환자는 패혈증, 중증(심한 증상)의 신기능 장애, 영양실조 등 기저질환이 있는 환자이며, 이 환자들은 한 가지 또는 두 가지 약물을 모두 중단한 후에 호전되었습니다. 이 약과 플루클록사실린을 동시에 복용할 경우 주의를 기울여야 하고 HAGMA가 의심되면 이 약 및/또는 플루클록사실린 투여를 중단합니다.

8. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 장소에 보관하십시오.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 (밀폐하여) 보관하십시오.
- 3) 온도(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

저장방법 : 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

포장단위 : 10캡슐/상자(10캡슐/PTP×1)

※ 온도가 높은 곳에 보관시 변형될 수 있으므로 되도록 서늘한 곳에 보관하십시오.

※ 제품 구입 시 사용기한 또는 유효기한이 지나거나 변질·변패·오염되거나 손상된 의약품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결 기준에 의거, 약국개설자, 안전상비의약품 판매자 및 의약품 판매업자를 통해 교환 또는 환불받을 수 있습니다.

※ 이 설명서는 2026년 1월 13일자로 작성되었으며 이후로 변경된 내용은 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템

(<http://hsl.gp> / nedrug.mfds.go.kr)의 '의약품 검색'에서 확인할 수 있습니다.

※ **의약품 부작용 신고 · 피해구제 상담 : 한국의약품안전관리원(1644-6223, 14-3330)**

판매자 : **ILDONG 일동제약(주)**

제조사 : **RpBio (주)알피 바이오**

서울특별시 서초구 바우로27길 2

경기도 화성시 향남읍 제약공단4길 35-7

고객상담실 : (전화) 080-022-1010 (수신자부담)