

복합 소화불량엔

팜자임 정

PAMZYME^{TAB.}

일반의약품
조제용
분류번호:233

※ 의약품 사용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽어야 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.

[원료약품 및 분량] 1정 중

·유효성분 : 판크레아틴(EP) 100mg(전분당화력250단위/일, 단백소화력1,500단위/일, 지방소화력100단위/일 이상)
 시메티론(USP) 60mg
 우르소데옥시콜산(JP) 20mg
 ·기타 첨가제 : D-만니톨, 크로스카르멜로오스나트륨, 히드록시프로필셀룰로오스, 콜로이드성아산화규소, 탭탈드녹색(39G1628),
 미결정셀룰로오스(101), 탭탈드흰색11W287, 미결정셀룰로오스

[성상] 초록색의 타원형 장용코팅정

[효능·효과] 소화불량, 식욕감퇴(식욕부진), 과식, 체할, 소화촉진, 소화불량으로 인한 위부팽만감

[용법·용량] 만 15세 이상의 성인 : 1회 1정, 1일 3회 식후에 복용한다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

만 7세 이하의 어린이

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

- 1) 본인 또는 가족이 알레르기 체질인 사람
- 2) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성
- 3) 다른 약물을 복용하고 있는 사람

3. 다음과 같은 사람(경우) 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담시 이 첨부문서를 소지할 것.

2주 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우

4. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.

5. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에(밀폐하여) 보관할 것.
- 3) 오용(잘못사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

[저장방법] 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관 [사용기간] 제조일로부터 36개월 [포장단위] 100정/병

※ 올바른 복용법을 모르거나 의문사항이 있는 경우는 의사·약사와 상담하십시오.

※ 본 의약품은“우수의약품제조관리기준(KGMP)”에 따라 엄격하게 제조 및 품질관리를 실시한 제품입니다. 만약 구입 시
 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패, 오염 또는 손상된 제품은 구입한 장소에서 교환하여 드립니다.

※ 문서작성(개정)일 이후 변경된 내용 및 기타 자세한 의약품 정보는 홈페이지(www.pharmbio.co.kr)의 제품정보 또는
 의약품안전나라(<https://nedrug.mfds.go.kr>)를 통해 확인하실 수 있습니다.

※ 표시사항에 기재되지 않은 이상반응이 나타날 경우 의사나 약사 또는 한국의약품안전관리원(<https://www.drugsafe.or.kr>) → 의약품이상사례보고에 알려주십시오.

※ 부작용 피해구제 신청 : 한국의약품안전관리원 (14-3330)

※ 소비자 상담실 : 02-587-2551(구입문의 : 경영지원부 ARS 2번 / 복약문의 : MA팀 ARS 3번)

※ 설명서 작성연월일은 제품의 사용기한과는 무관하며 사용기한 및 제조번호는 제품의 외부 표장을 확인해 주십시오.

설명서작성연월일: 2025년 12월 05일

PMT-11

제조판매자

 (주)한국팜비오

충북 충주시 대소원면 첨단산업9로 36



보건복지부 인증
 혁신형 제약기업
 KOREA INNOVATIVE PHARMACEUTICAL COMPANY