

종합비타민제 비 타 펄 스 정

【원료약품 및 분량】 1정 중

- 유효성분 : 니코틴산아미드(KP) 100 mg
- 피리독신염산염(KP) 5 mg
- 판토텐산칼슘(KP) 20 mg
- 푸마르산철(USP) 82.1 mg(철(으)로서 27 mg)
- 토코페롤아세테이트 2배산(KP) 60 mg
(비타민E(으)로서 30 IU)
- d-비오틴(USP) 45 µg
- 시아노코발라민(KP) 12 µg
- 아스코르브산(KP) 600 mg
- 리보플라빈(KP) 15 mg
- 폴산(KP) 400 µg
- 티아민질산염(KP) 15 mg
- 첨가제(동물유래성분) : 유당(젖당)수화물(소, 우유)
- 기타 첨가제 : 폴로이드성이산화규소, 히드록시프로필셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 미결정셀룰로오스, 전분글리콜산나트륨, 크로스포비돈, 카르나우바납, 탭실드흰색(19W623), 탭실드갈색(59B346)

【성 상】 갈색의 타원형 필름코팅정

【효능·효과】

1. 다음경우의 비타민 E, B1, B2, B6, C의 보급

- 육체피로, 임신·수유기, 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하시, 노년기
- 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같다.
 - 비타민B2(리보플라빈)
 - 다음 증상의 완화 : 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염
 - 비타민C(아스코르브산)
 - 햇빛·피부병 등에 의한 색소침착(기미, 주근깨)의 완화
 - 잇몸출혈·비출혈(코피) 예방

2. 철 결핍성 빈혈의 예방 및 치료

【용법·용량】 만 8세 이상 및 성인 : 1회 1정, 1일 1회 복용한다.

【사용상의 주의사항】

1. 경고

철 함유제제는 만 6세 이하의 어린이가 사고로 과량 복용하였을 경우 중독성 사망을 일으킬 수 있으므로 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

- 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
- 만 12개월 미만의 젖먹이
- 혈색소증(철대사 이상으로 철이 간장, 췌장(이자)에 침착하는 질환), 헤모시데린침착증, 비철결핍성 빈혈
- 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

3. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.

- 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제
- 레보도파

4. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것.

- 만 1세 미만의 젖먹이
- 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 고옥살산뇨증 환자(hyperoxaluria : 요중에 과량의 수산염이 배설되는 상태)
- 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
- 소화성궤양, 만성궤양성대장염, 국한성대장염 등의 위장질환 환자

- 심장·순환기계기능 장애 환자
- 신장장애 환자
- 저단백혈증 환자
- 통풍환자 또는 신장결석이 있는 환자

5. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것. 상당 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

- 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우
 - 위부불쾌감, 설사, 변비, 발진, 발적, 구역, 구토, 묽은 변, 두드러기, 가려움, 광선과민반응, 복부·위통증, 경련, 열, 혼수
- 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있다.
- 에스트로겐을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전성 소인이 있는 환자가 비타민 E를 복용할 경우 혈전증의 위험이 증가될 수 있다.
- 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있다.
- 피리독신을 1일 500 mg ~ 2 g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있다.
- 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B12를 1일 10 µg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있다.
- 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당내성) 손상(glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 고요산혈증(hyperuricemia, 혈액 중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있다.
- 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈성부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다.
- 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용투여시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것.
- 우발적으로 과량복용 한 경우
- 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

6. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

- 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.

- 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도·감독하에 투여할 것.
- 각종 요검사시에 혈당의 검출을 방해할 수 있다.
- 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사에 영향을 줄 수 있다.
- 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피할 것.

7. 저장상의 주의사항

- 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관할 것.
- 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

【포장단위】 120정/병

【저장방법】 밀폐용기, 실온(1 ~ 30℃) 보관

【제조회사】 ㈜바스칸바이오제약 /

경기도 안성시 원곡면 원당로 354

【제조사】 ㈜시어스제약 / 경기도 화성시 향남읍 발안공단로 32

- ※ 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽어야 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하시기 바랍니다.
- ※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 구입 시 사용기한이 지났거나 변질·변패·오염되거나 손상된 의약품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
- ※ 사용(유효)기한이 지난 의약품을 사용하지 않도록 합니다.
- ※ 의약품 부작용 신고 및 피해구제 신청 : 한국 의약품안전관리원(1644-6223, 14-3330)
- ※ 소비자상담전화 : 031-692-2900
- ※ 기타 자세한 의약품 정보는 의약품통합정보시스템(nedrug.mfds.go.kr)에서 확인할 수 있습니다.

작성일 : 2026. 01. 13. (Rev.0)