흐르고 막힌 코를 빠르게 풀어주는

비프리 스트롱 연질 캡슐

일반의약품

이 약은 사용하기 전에 반드시 사용설명서를 주의깊게 읽어보시고,
사용설명서는 항상 약과 함께 보관하시기 바랍니다.

[원료약품 및 그 분량] 1캡슐(780mg) 중
유효성분 :
벨라돈나총알칼로이드(JP)(알카로이드로서 0.2mg)·····0.20mg
클로르페니라민말레산염(KP)·····4.00mg
DL-메틸에페드린염산염(KP)·····10.00mg
첨가제(동물유래성분) : 젤라틴(돼지, 가죽)
기타 첨가제 : 부틸히드록시톨루엔, 포비돈, 시트르산, 프로필렌글리콜, 폴리에틸렌글리콜400, 정제수, 소르비톨스페셜글리세린블렌드

[성상] 무색 또는 미황색의 투명한 내용물을 함유한 투명한 타원형 연질캡슐

[용법용량] 만 15세 이상 및 성인 : 1일 3회, 1회 1캡슐 매 식후에 복용한다. 복용간격은 4시간 이상으로 한다.

[효능효과] 코감기(급성비염), 알레르기성 비염 또는 부비동염에 의한 다음 증상의 완화 : 코막힘, 콧물, 재채기, 눈물, 인후통, 머리 무거움

[포장단위] 12 캡슐/상자(12캡슐/PTP×1)

[저장방법] 기밀용기 , 실온(1~30°C)보관

[사용기간] 제조일로부터 24 개월

[소비자상담실] 031-662-1395

[판매원] ㈜셀로맥스사이언스(경기도 용인시 기흥구 구성로 357 용인테크노밸리 D동 710호)

[제조원] ㈜알피바이오(경기도 화성시 만세구 향남읍 제약공단4길 35-7)

※ 자세한 의약품 정보는 의약품통합정보시스템(https://nedrug.mfds.go.kr)에서 확인하실 수 있습니다.
※ 부작용 보고 및 피해구제 신청 : 한국의약품안전관리원(1644-6223, 14-3330)
※ 유효기간 또는 사용기한이 지난 의약품을 사용하지 않도록 주의해 주십시오.
※ 유효기간 또는 사용기한이 지났거나 변질, 변패, 오염되거나 손상된 의약품은 구입처를 통해 교환하여 드립니다.
※ 의약품을 어린이의 손에 닿지 않게 보관하십시오.

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
1) 만 3개월 미만의 영아(젖먹이)
2) 이 약 및 이 약의 구성성분에 대한 과민반응 및 그 병력이 있는 사람
3) MAO억제제(항우울제, 항정신병제, 감정조절제, 항파킨슨제 등)를 복용하고 있거나 복용을 중단한 후 2주 이내의 사람

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.
다른 비염(코염)용 경구제, 항히스타민제를 함유하는 내복약(감기약, 진해(기침을 그치게 함)거담제(가래약), 멀미약, 알레르기용약 등)

3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의 할 것.
1) 본인, 양친 또는 형제 등이 두드러기, 접촉성 피부염, 편두통, 음식물알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람
2) 지금까지 약에 의해 알레르기 증상(예 : 발열, 발진, 관절통, 천식, 가려움증 등)을 일으킨 적이 있는 사람
3) 고혈압, 심장질환, 녹내장(예 : 눈의 통증, 눈이 침침함 등), 배뇨(소변을 눔)곤란, 갑상선질환, 당뇨병 등이 있는 사람, 몸이 약한 사람 또는 고열이 있는 사람
4) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부
5) 고령자(노인)
6) 의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람
7) 다음과 같은 기침이 있는 사람
흡연, 천식, 만성 기관지염, 폐기종, 과도한 가래가 동반되는 기침, 1주 이상 지속 또는 재발되는 기침, 만성 기침, 발열·발진이나 지속적인 두통이 동반되는 기침

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.
1) 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우
출혈성뇌졸중, 구역·구토, 목마름(지속적이거나 심한), 변비, 식욕부진, 발진·발적(충혈되어 붉어짐), 가려움, 배뇨(소변을 눔)곤란, 두통, 안면(얼굴)홍조, 비정상적인 눈부심
2) 이 약의 복용에 의해 드물게 아래의 중증(심한 증상) 증상이 나타난 경우
① 쇽(아나필락시) : 복용후 바로 두드러기, 부종(부기), 가슴답답함 등과 함께 안색이 창백하고, 손발이 차고, 식은땀, 숨쉬기 곤란함 등이 나타날 수 있다.
3) 5~6회 복용하여도 증상이 좋아지지 않을 경우

5. 소아에 대한 투여
만 2세 미만에게 투여하지 않는다. 다만, 꼭 필요한 경우 의사의 진료를 받는다.

6. 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항
1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
2) 장기간 계속 복용하지 말 것.
3) 복용하는 동안 졸음이 오는 경우가 있으므로 자동차 운전 또는 기계류의 운전 조작을 피할 것.
4) 복용시에는 음주하지 말 것.

7. 저장상의 주의사항
1) 어린이의 손에 닿지 않는 장소에 보관할 것.
2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에(밀폐하여) 보관할 것.
3) 오용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

설명서 작성일자 : 2026.03.18
※ 위 일자는 설명서 작성일자로 사용기한과 관련이 없습니다.