



일반의약품

효과빠른 액상형 종합감기약

이부캐치[®]콜드

연질캡슐

【원료약품의 분량】 1캡슐(880mg) 중

■ 유효성분 : 이부프로펜(IP)	75.00mg
구아이페네신(KP)	27.78mg
슈도에페드린염산염(USP)	15.00mg
덱스트로메토르판부름화수소산염수화물(KP)	5.34mg
클로르페니라민말레산염(KP)	1.25mg
DL-메틸에페드린염산염(KP)	12.50mg
부름핵신염산염(BP)	2.00mg

■ 첨가제(동물유래성분) : 젤라틴(소, 돼지-가죽)

■ 기타첨가제: 부틸하이드록시톨루엔, 소르비톨소르비탄액, 수산화칼륨, 안나토색소, 정제수, 포비돈, 폴리에틸렌 글리콜400, 프로필렌글리콜

【성상】 미황색의 투명한 액이 든 황색의 투명한 타원형 연질캡슐

【효능·효과】 감기의 증상(여러증상)인 코막힘, 코막힘, 재채기, 인후(목구멍)통, 기침, 가래, 오한(춥고 떨리는 증상), 발열, 두통, 관절통, 근육통의 완화

【용법·용량】 만 15세 이상 및 성인: 1일 3회, 1회 2캡슐 식후 30분에 복용
만 8세 이상~만 15세 미만: 1일 3회, 1회 1캡슐 식후 30분에 복용

【사용상의 주의사항】

1. 경고

1) 슈도에페드린 함유 제제 복용 시 급성 전신성 발진성 홍포증(AGEP)과 같은 중증 피부 이상반응이 나타날 수 있습니다. 발열, 홍반, 다수의 작은 홍포와 같은 증상이 관찰될 경우 이 약의 복용을 중단하고 의사 또는 약사와 상의해야 합니다.

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.

- 이 약 및 이 약의 구성성분에 대한 과민반응 및 그 병력이 있는 사람
- 이 약 및 이 약의 구성성분, 다른 해열진통제, 감기약 복용 시 천식을 일으킨 적이 있는 사람
- 만3개월 미만의 영아
- MAO억제제(항우울제, 항정신병제, 감정조절제, 항파킨슨제 등)를 복용하고 있거나 복용을 중단한 후 2주 이내의 사람
- 중증 또는 조절되지 않는 고혈압 환자
- 중증 급성 또는 만성 신장질환/신부전 환자

3. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 마십시오.

진해(기침을 그치게 함)거담제(가래약), 다른 감기약, 해열진통제, 진정제, 항히스타민제를 함유하는 내복액(비염, 코염)용 경구제, 멀미약, 알레르기용약)

4. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.

- 수두 또는 인플루엔자에 감염되어 있거나 또는 의심되는 영아 및 만 15세 미만의 어린이(구역이나 구토를 수반하는 행동의 변화가 있다면, 드물지만 심각한 질병인 레이중후군의 초기 증상일 수 있으므로 의사와 상의하십시오)
- 슈도에페드린 성분과 관련하여 허혈성 대장염의 증상(급격한 복통, 직장 출혈 등)이 발현될 경우
- 본인, 양친 또는 형제 등이 두드러기, 접촉성피부염, 기관지천식, 알레르기성비염, 편두통, 음식물알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람
- 지금까지 약에 의해 알레르기 증상(예 : 발열, 발진, 관절통, 천식, 가려움증 등)을 일으킨 적이 있는 사람
- 간장질환, 신장질환, 심장질환, 감상선질환, 당뇨병, 고혈압, 녹내장(예 : 눈의 통증, 눈이 침침함 등), 배뇨곤란 등이 있는 사람, 고령자, 몸이 약한 사람 또는 고령이 있는 사람
- 속쓰림, 위부불쾌감, 위통과 같은 위장문제가 지속 혹은 재발되거나 궤양, 출혈문제를 가지고 있는 사람
- 구토와 설사로 많은 수분을 손실하거나 수분을 흡수하지 않는 사람 또는 이뇨제를 복용하는 사람
- 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부 (임신 30주 이후 살리살산나트륨, 살리살아미드, 아스피린, 아스피린알루미늄, 살리살산칼슘, 이부프로펜 성분 함유 제제의 투여가 권고되지 않는다)
- 의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람(당뇨약, 통풍약, 관절염약, 항응고제, 스테로이드제 등 다른 약물을 투여 받고 있는 사람)
- 다음과 같은 기침이 있는 사람
흡연, 천식, 만성 기관지염, 폐기종, 과도한 가래가 동반되는 기침, 1주 이상 지속 또는 재발되는 기침, 만성 기침, 발열, 발진이나 지속적인 두통이 동반되는 기침

5. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오.

- 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우

- 발진·발적, 가려움, 구역·구토, 식욕부진, 변비, 위통, 소화관출혈, 위부불쾌감, 부종, 배뇨곤란, 목마름(지속적 이거나 심한), 어지러움, 물안, 떨림, 물면
- 이 약의 복용에 의해 드물게 아래의 중증(심한 증상) 증상이 나타난 경우
 - 속(아나필락시스) : 복용후 바로 두드러기, 부종, 가슴답답함 등과 함께 안색이 창백하고, 손발이 차고, 식은땀, 숨쉬기 곤란함 등이 나타날 수 있습니다.
 - 피부점막안중후군(스티븐스-존슨중후군), 중독성피피과사용해(리델중후군) : 고열을 동반하고, 발진·발적(중열되어 붉어짐), 화상과 같이 물질이 생기는 등의 심한 증상이 전신피부, 입이나 눈점 막에 나타날 수 있습니다.
 - 천식
 - 가역적 후회 병증 중후군 및 가역적 뇌혈관 수축 중후군: 갑작스러운 심한 두통, 뺨개 두통, 구역, 구토, 혼돈, 발작, 시각 장애 등이 발현될 수 있습니다.
 - 심장 : 코니스 중후군(빈도불명)
- 5~6회 복용하여도 증상이 좋아지지 않을 경우

6. 소아에 대한 투여

만2세 미만에게 투여하지 않습니다. 다만, 꼭 필요한 경우 의사의 진료를 받아야 합니다.

7. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

- 정해진 용법·용량을 잘 지켜야합니다.
- 장기간 계속 복용하지 마십시오.
- 어린이에게 복용시킬 경우에는 보호자의 지도 감독하에 해야 합니다.
- 복용시에는 음주하지 마십시오.
- 복용하는 동안 졸음이 오는 경우가 있으므로 자동차 운전 또는 기계류의 운전 조작을 하지 말아야 합니다.
- 동물실험에서 부름핵신염산염을 장기간 다량 연속 투여할 경우 혈청 중에 아마노산전이효소와 가래양이 일시적으로 상승한다는 보고가 있습니다.
- 이 약을 복용하면 일시적으로 가래 양이 증가하는 경우가 있습니다.
- 이 약 투여 환자에서 코니스 중후군 사례가 보고되었습니다. 코니스 중후군은 관상동맥 수축과 관련이 있는 알레르기 또는 과민반응 후 발생하는 심혈관계 증상으로 심근경색을 초래할 수 있습니다.

8. 저장상의 주의사항

- 어린이의 손에 닿지 않는 장소에 보관하십시오.
- 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에(밀폐하여) 보관하십시오.
- 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃) 보관

【사용기한】 외부용기에 표기

【포장단위】 12캡슐/상자(12캡슐/PTP X 1)

【제품문의】 (02)2211-6700, www.sinilpharm.com

※ 부작용 보고 및 피해구제 신청 : 한국의약품안전관리원(1644-6223, 14-3330)

※ 구입 시 사용기한이 경과되었거나 유통과정중 변질, 변패 또는 오염되거나 손상된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드려며, 공정거래위원회 고시 '소비자 분쟁 해결 기준'에 의거 소비자의 정당한 피해는 보상하여 드립니다.

※ 자세한 의약품 정보는 식품의약품안전처 의약품안전나라 의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>)을 통하여 확인할 수 있습니다.

※ 사용기한이 경과한 제품은 복용하지 마십시오.

※ 의약품을 사용하기 전에 사용자께서는 설명서를 주의깊게 읽으시고, 설명서를 의약품과 함께 보관하십시오.

※ 주의

- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 정해진 용법·용량을 준수하여 사용할 것
- 충분한 양의 물과 함께 복용할 것.
- 잘못 사용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.
- 포장을 개봉하여 복용 시 가끔 연질캡슐에 포장물이 따라오는 경우가 있으니 복용 시 연질캡슐에 포장물이 있는지 꼭 확인하고 복용할 것.
- 제품 개봉 시 또는 취급 시에 포장재(PTP, 케이스)에 상처를 입을 수 있으니 주의하십시오.

코스닥상장
【제조회사】 신일제약(주)

본사 : 서울특별시 동대문구 사가정로 272
공정 : 충청북도 충주시 양성면 북상골길 28

【제 조 자】 코스맥스파마(주)

충청북도 제천시 바이오밸리3로 30 일부

설명서 작성(개정)년월일 : 2026.01.23