

코 감기약 디펜콜^{노즈} 캡슐

코감기 / 코막힘 / 콧물 / 재채기

본 약을 사용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽어야 하며, 본 첨부문서를 본 약과 함께 보관하시기 바랍니다.

[원료약품 및 그 분량] 1캡슐 중

- 유효성분 : 벨라돈나총알카로이드(알칼로이드)로서 0.15밀리그램(JP) 0.15mg
클로르페니라민말레산염(KP) 4.00mg
DL-메틸에페드린염산염(JP) 10.00mg

■ 첨가제(타르색소) : 적색3호, 청색1호

■ 첨가제(동물유래성분) : 유당수화물(소의 우유), 캡슐(젤라틴, 소의 가죽)

■ 기타첨가제 : 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘

[성상]

흰색의 분말이 든 상부는 암청색, 하부는 흰색의 경질 캡슐제

[효능·효과]

코감기(급성비염), 알레르기성 비염 또는 부비동염에 의한 다음 증상의 완화 : 코막힘, 콧물, 재채기, 눈물, 인후통, 머리무거움

[용법·용량]

만 15세 이상 및 성인 : 1회 1캡슐씩 1일 3회 식후 복용한다.

복용간격은 4시간 이상으로 한다

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것

- 1) 만 3개월 미만의 영아(갓난아기)
- 2) 이 약 및 이 약의 구성성분에 대한 과민반응 및 그 병력이 있는 사람
- 3) MAO억제제(항우울제, 항정신병제, 감정조절제, 항파킨슨제 등)를 복용하고 있거나 복용을 중단한 후 2주 이내의 사람
- 4) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용(사용)하지 말 것.

다른 비염(코염)용 경구제, 항히스타민제를 함유하는 내복약(감기약, 진해(기침을 그치게 함)거담제, 멀미약, 알레르기용약 등)

3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의 할 것.

- 1) 본인, 양친 또는 형제 등이 두드러기, 접촉성 피부염, 편두통, 음식물알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람
- 2) 지금까지 약에 의해 알레르기 증상(예 : 발열, 발진, 관절통, 천식, 가려움증 등)을 일으킨 적이 있는 사람
- 3) 고혈압, 심장질환, 녹내장(예 : 눈의 통증, 눈이 침침함 등), 배뇨(소변을 누)곤란, 갑상선질환, 당뇨병 등이 있는 사람, 몸이 약한 사람 또는 고열이 있는 사람
- 4) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부
- 5) 고령자(노인)
- 6) 의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람
- 7) 다음과 같은 기침이 있는 사람
흡연, 천식, 만성 기관지염, 폐기종, 과도한 가래가 동반되는 기침, 1주 이상 지속 또는 재발되는 기침, 만성 기침, 발열·발진이나 지속적인 두통이 동반되는 기침

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부 문서를 소지할 것.

- 1) 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우
출혈성뇌졸중, 구역·구토, 목마름(지속적이거나 심한), 변비, 식욕부진, 발진·발적(종혈되어 붉어짐), 가려움, 배뇨(소변을 누)곤란, 두통, 안면홍조, 비정상적인 눈부심
- 2) 이 약의 복용에 의해 드물게 아래의 중증 증상이 나타난 경우
속(아나필락시스)과민성쇼크 : 복용 후 바로 두드러기, 부종, 가슴답답함 등과 함께 안색이 창백하고, 손발이 차고, 식은땀, 숨쉬기 곤란함 등이 나타날 수 있다.
- 3) 5 ~ 6회 복용하여도 증상이 좋아지지 않을 경우

5. 소아에 대한 투여

만 2세 미만에게 투여하지 않는다. 다만, 꼭 필요한 경우 의사의 진료를 받는다.

6. 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
- 2) 장기간 계속 복용하지 말 것.
- 3) 복용하는 동안 졸음이 오는 경우가 있으므로 자동차 운전 또는 기계류의 운전 조작을 피할 것.
- 4) 복용 시에는 음주하지 말 것.

7. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에(밀폐하여) 보관할 것
- 3) 오용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

[저장방법] 기밀용기, 실온보관(1~30℃)

[사용기간] 제조일로부터 36개월

[포장단위] 10캡슐/피티피

※ 의약품 부작용 신고 및 피해구제신청 : 한국 의약품안전관리원(1644-6223, 14-3330)

본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입 시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품일 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드리며, 공정거래위원회 고시 “품목별 소비자 분쟁 해결기준”에 의거 정당한 피해는 보상하여 드립니다.

DS-2512-00

첨부문서 최초 작성년월일 2025. 12. 22

이 첨부문서의 작성일자 이후 변경된 내용은 동성제약 홈페이지(www.dongsung-pharm.com) 및 식품 의약품안전처 홈페이지 의약품통합정보시스템(http://nedrug.mfds.go.kr)의 해당 제품정보란에서 확인할 수 있습니다.



[제조 및 판매자]

동성제약주식회사

[공정] 충남 아산시 둔포면 관대안길 45

[소비자 상담전화] 080-001-0921

www.dongsung-pharm.com