

생각함유 효과 빠른 종합감기약

아임파인-콜드

연질캡슐

[아세트아미노펜, DL-메틸에페드린염산염, 덱스트로메토르판브롬화수소산염수화물, 슈도에페드린염산염, 클로르페니라민말레산염, 육계 가루]

이 약은 사용하기 전에 반드시 사용설명서를 주의깊게 읽어보시고, 사용설명서는 항상 약과 함께 보관하시기 바랍니다.

[원료약품 및 그 분량] 1캡슐(1,110 mg) 중

유효성분 : 아세트아미노펜(USP)	200mg
클로르페니라민말레산염(KP)	1.25mg
슈도에페드린염산염(USP)	15mg
DL-메틸에페드린염산염(KP)	8.4mg
덱스트로메토르판브롬화수소산염수화물(KP)	5.4mg
육계 가루(생규)	22.3mg

첨가제(동물유래성분) : 젤라틴(돼지, 가축)

기타 첨가제 : 폴리에틸렌글리콜400, 폴리에틸렌글리콜4000, 소르비톨스페셜
글리세린올렌드, 정제수, 카카오색소, 치자청색소, 산화티탄, 프로필렌글리콜

[성상] 갈색의 내용물을 함유한 암갈색의 타원형 연질캡슐

[효능·효과] 감기의 증상상(여러 증상) (코막힘, 재채기, 인후(목구멍)통, 기침, 가래,
오한(춥고 떨리는 증상), 발열, 두통, 관절통, 근육통)의 완화

[용법·용량]

- 만 15세 이상 및 성인: 1일 3회, 1회 2캡슐 식후 30분에 복용
- 만 8세 이상 ~ 만 15세 미만: 1일 3회, 1회 1캡슐 식후 30분에 복용

[사용상의 주의사항]

1. 경고

- 매일 세 잔 이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열진통제를 복용해야 할 경우 반드시 의사 또는 약사와 상의해야 한다.
이러한 사람이 이 약을 복용하면 간 손상이 유발될 수 있다.
- 아세트아미노펜을 복용한 환자에서 매우 드물게 급성 전신성 발진성 농포증 (급성 전신성 발진성 고름물집증)(AGEP), 스티븐스-존슨 증후군(SJS), 독성 표피 괴사증(TEN)과 같은 중대한 피부 반응이 보고되었고, 이러한 중대한 피부 반응은 치명적일 수 있다. 따라서 이러한 중대한 피부 반응의 징후에 대하여 환자들에게 충분히 알리고, 이 약 투여 후 피부 발진이나 다른 과민 반응의 징후가 나타나면 즉시 복용을 중단하도록 하여야 한다.
- 이 약은 아세트아미노펜을 함유하고 있다. 아세트아미노펜으로 일일 최대 용량(4,000mg)을 초과할 경우 간 손상을 일으킬 수 있으므로 이 약을 일일 최대 용량(4,000mg)을 초과하여 복용하여서는 아니 되며, 아세트아미노펜을 포함하는 다른 제품과 함께 복용하여서는 안 된다.
- 슈도에페드린 함유 제제 복용 시 급성 전신성 발진성 농포증(AGEP)과 같은 중증 피부 이상 반응이 나타날 수 있다. 발열, 홍반, 다수의 작은 농포와 같은 증상이 관찰될 경우 이 약의 복용을 중단하고 의사 또는 약사와 상의해야 한다.

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것

- 이 약 및 이 약의 구성 성분에 대한 과민 반응 및 그 병력이 있는 사람
- 이 약 및 이 약의 구성 성분, 다른 해열진통제, 감기약 복용 시 천식을 일으킨 적이 있는 사람
- 만 3개월 미만의 영아(갓난아기)
- MAO 억제제(항우울제, 항정신병제, 감정조절제, 항파킨슨제 등)를 복용하고 있거나 복용을 중단한 후 2주 이내의 사람
- 중증 또는 조절되지 않는 고혈압 환자

3. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것

진해(기침을 그치게 함) 거담제(가래약), 다른 감기약, 해열진통제, 진정제, 항히스타민제를 함유하는 내복약(비염(코염)용 경구제, 멸미약, 알레르기용약)

4. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것

- 수두 또는 인플루엔자에 감염되어 있거나 또는 의심되는 영아 및 만 15세 미만의 어린이(구역이나 구토를 수반하는 행동의 변화가 있다면, 드물지만 심각한 질병인 레이 증후군의 초기 증상일 수 있으므로 의사와 상의할 것.)
- 슈도에페드린 성분과 관련하여 허혈성 대장염의 증상(급격한 복통, 직장 출혈 등)이 발현될 경우
- 본인, 양친 또는 형제 등이 두드러기, 접촉성 피부염, 기관지 천식, 알레르기성 비염, 편두통, 음식을 알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람
- 지금까지 약에 의해 알레르기 증상(예: 발열, 발진, 관절통, 천식, 가려움증 등)을 일으킨 적이 있는 사람
- 간장 질환, 신장(콩팥) 질환, 심장 질환, 갑상선 질환, 당뇨병, 고혈압, 위십이지장궤양, 녹내장(예: 눈의 통증, 눈이 침침함 등), 배뇨(소변을 누) 곤란 등이 있는 사람, 고령자(노인), 몸이 약한 사람 또는 고열이 있는 사람
- 속쓰림, 위부 불쾌감, 위통과 같은 위장 문제가 지속 혹은 재발되거나 궤양, 출혈 문제를 가지고 있는 사람
- 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부 (임신 30주 이후 살리실산나트륨, 살리실아미드, 아스피린, 아스피린알루미늄, 살리실산콜린, 이부프로펜 성분 함유 제제의 투여가 권고되지 않는다)
- 의사 또는 치과 의사의 치료를 받고 있는 사람(당뇨약, 동통약, 관절염약, 항응고제, 스테로이드제 등 다른 약물을 투여받고 있는 사람)
- 다음과 같은 기침이 있는 사람: 흡연, 천식, 만성 기관지염, 폐기종, 과도한 가래가 동반되는 기침, 1주 이상 지속 또는 재발되는 기침, 만성 기침, 발열·발진이나 지속적인 두통이 동반되는 기침