

흡수율이 다른 피돌산 마그네슘 함유

마그액티브^정

근육경련 및 혈액순환 개선제

【원료약품 및 그 분량】 1정(1,217밀리그램) 중

■ 유효성분

· 산화마그네슘(KP)(마그네슘으로서 241.2mg)	400mg
· 피돌산마그네슘(EP)(마그네슘으로서 8.6mg)	100mg
· 벤포티아민(KP)(티아민염산염으로서 18mg)	25mg
· 푸르실티아민(KP)	25mg
· 피리독살포스페이트수화물(KP)	25mg
· 피리독신염산염(KP)	25mg
· 메코발라민(KP)	0.5mg
· 토코페롤아세테이트 2배산(KP)(비타민E로서 50 IU)	100mg
· 감마-오리자놀(KP)	5mg

■ 기타 첨가제 : 경질무수구산, 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 크로스포비돈, 탭실드갈색(29B1093), 히드록시프로필셀룰로오스

【성상】 갈색의 정방형 필름코팅정

【효능·효과】

1. 다음 경우의 비타민 E, B₁, B₆의 보급

－ 육체피로－ 임신·수유기－ 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력 저하시－ 노년기

2. 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같다.

－ 말초혈행장애 및 갱년기시 다음 증상의 완화 : 어깨·목결림, 수족저림·수족냉증(손발이 차가움)

－ 다음 증상의 완화 : 신경통, 근육통, 관절통(요(허리)통, 어깨결림 등), 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염

－ 각기

－ 눈의 피로

3. 마그네슘결핍으로 인한 근육경련

【용법·용량】 만 12세 이상 성인 : 1일 1회 2정 복용한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자

2) 만 12개월 미만의 젖먹이

3) 심한 증상의 신부전 환자

4) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자

5) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.

1) 인산염, 칼슘염, 경구(먹는, 복용하는)용 테트라사이클린계 제제, 제산제

2) 레보도파

3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

1) 의사의 치료를 받고 있는 환자

2) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아

3) 심장·순환기계기능 장애 환자

4) 신장(콩팥)장애 환자

5) 저단백혈증 환자

일반의약품

6) 임부

7) 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 해당염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우 : 위부불쾌감, 설사, 변비, 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 구역, 구토, 묽은 변, 구내염(입안염), 식욕부진, 복부(배부분)팽만감, 붉은반점, 부전수축(심장박동정지), 중추신경계 기능저하

2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있다.

3) 에스트로겐을 포함한 경구(먹는, 복용하는)용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전성 소인이 있는 환자가 비타민 E를 복용할 경우 혈전증의 위험이 증가될 수 있다.

4) 피리독신을 1일 500mg ~ 2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있다.

5) 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B₁₂를 1일 10μg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있다.

6) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈심부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다.

7) 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용(함께 복용(사용)) 투여 시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것

8) 우발적으로 과량복용한 경우

9) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.

2) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피할 것

3) 일반적 주의 : 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장한다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절한다.
환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 한다.

6. 저장상의 주의사항

1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.

2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 (밀폐하여) 보관할 것.

3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

【저장방법】 밀폐용기, 실온(1 ~ 30 ℃)보관

【포장단위】 60정/병, 120정/상자(60정/병×2)

【사용기간】 제조일로부터 36개월

【소비자상담실】 080-811-3011

· 본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질·변패·오염되거나 손상된 제품은 약국개설자 또는 의약품판매업자에 한하여 교환하여 드리며, 공정거래위원회에서 고시한 “소비자 분쟁해결기준”에 의거, 정당한 소비자피해에 대해 보상해 드립니다.

· 의약품들 사용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽어야 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.

· 첨부문서 최종 개정연월일(2026.06.04)이후 변경된 내용은 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>)에서 확인 할 수 있습니다.

· 제품의 사용기한은 외부 포장에 표기되어 있습니다.

· 부작용보고 및 피해구제신청 : 한국 의약품안전관리원(14-3330 혹은 1644-6223)

첨부문서 작성 연월일 : 2026.06.04(Rev.01)

[판매처] **온누리^{Health}** (주)온누리에이치엔씨 : 서울 양천구 목동서로 159-1, 13층

[제조사] **Medix 메딕스제약** 메딕스제약(주) : 전북특별자치도 완주군 봉동읍 완주산단6로 170