

생약 성분 함유 소화효소제

오하엔정



【원료약품 및 그 분량】 1정 중

- 유효성분 : 판크레아틴(USP) 170 mg 우르소데옥시콜산(UP) 10 mg
시메티콘(KP) 30 mg 리파제(KP) 10 mg
브로멜라인(KP) 10 mg 건강가루(생규) 50 mg
사인가루(생규) 50 mg
- 첨가제(타르색소) : 황색203호알루미늄레이크, 청색1호알루미늄레이크
- 기타첨가제 : 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 아산화규소, 전분글리콜산나트륨, 크로스포비돈, 탭실 드녹색(39G1628), 탭실드클리어(92C569), 탭실드흰색(19W623), 히드록시프로필셀룰로오스

【성상】 녹색의 장방형 장용성 필름코팅정

【효능·효과】

소화불량, 식욕감퇴(식욕부진), 과식, 체함, 소화촉진, 소화불량으로 인한 위부팽만감, 구역, 구토

【용법·용량】

만 15세 이상 : 1회 2정

1일 3회 식후 30분에 복용(사용)한다. 단, 복용시간은 4시간 이상으로 한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

- 1) 만 7세 이하의 어린이
- 2) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
- 3) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.

- 1) 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 췌장염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자

3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

- 1) 본인 또는 가족이 알레르기 체질인 사람
- 2) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성
- 3) 다른 약물을 복용하고 있는 사람

4. 다음과 같은 사람(경우) 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담시 이 첨부 문서를 소지할 것.

- 1) 2주 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
- 2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도·감독하에 투여할 것.
- 3) 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장한다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절한다. 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 한다.

6. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것.
- 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃) 보관

【포장단위】 2정/포, 120포/상자

【수신자부담고객상담실】 080-988-8888

【제조회사】

조아제약(주) 경상남도 함안군 함안면 광정로 318 www.choa.co.kr

【제조자】

정우신약(주) 충청남도 아산시 신창면 서부남로790번길 60

※ 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나, 변질, 변패, 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국에서 교환해 드립니다.

※ 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품정보는 의약품안전나라(<https://nedrug.mfds.go.kr>)를 참조하십시오.

※ 의약품 사용 후 부작용 발생 시, 부작용 신고 및 피해구제 신청은 한국의약품안전관리원에 할 수 있습니다.

- 신청방법 : 1644-6223, 14-3330 / karp.drugsafe.or.kr
- 신청대상 : 의약품 부작용으로 사망, 장애, 질병 피해를 입은 환자 및 유족
- 보상범위 : 사망일시보상금, 장례비, 장애일시보상금, 진료비

개정연월일 : 2026. 01. 22 (Rev.0)