

※ 의약품은 사용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽으시고, 의약품과 함께 보관하십시오

일 반 의 약 품
KGMP | 적격업체

NAD Tablet

나드정

【원료약품 및 그 분량】 1정 중

- 유효성분 : 니코틴산(USP) 30 mg
니코틴산아미드(KP) 220 mg
레티놀팔미테이트(USP) 1.18mg
(비타민A로서) 2000 IU(1.7MIU/g)
토코페롤아세테이트2배산(KP) 200 mg
(비타민E로서 100 IU)
- 첨가제(동물유래) : 유당수화물(소의 우유)
- 기타 첨가제 : 경질무수구산, 스테아르산마그네슘, 전분글리콜산나트륨, 탭실드흰색(21W002), 히드록시프로필셀룰로오스

【성 상】

흰색의 장방형 필름코팅정

【효능 · 효과】

○ 다음 경우의 비타민 A, E의 보급

- 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력자하시
- 노년기

○ 이 약에 함유된 비타민 등의 효능 효과는 다음과 같습니다.

- 말초혈행장애 및 갱년기시 다음 증상의 완화 : 어깨·목결림, 수족저막·수족냉증(손발이 차가움)
- 눈의 건조감의 완화
- 야맹증(밤에 잘 못보는 증상)

【용법 · 용량】

성인 : 1일 1회 1정 ~ 2정 복용

【사용상의 주의사항】

1. 경고

- 1) 임부에 비타민 A(레티놀)를 1일 5,000 IU 이상 투여하는 경우에는 선천성 기형을 유발할 위험이 있으므로 임신 3개월 이내 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에는 비타민 A를 5,000 IU/일 이상 투여하지 마십시오(비타민 A결핍증 환자는 제외).

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.

- 1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
- 2) 만 3개월 미만의 젖먹이
- 3) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안됩니다.

3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과 의사, 약사와 상의하십시오.

- 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 2) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
 - ① 외국에서 임신 전 3개월부터 임신초기 3개월까지 비타민 A를 10,000 IU/일 이상 섭취한 여성으로부터 태어난 아이에서 두부 신경통 등을 중심으로 하는 기형 발현(기형발생) 증가가 추정된다는 역학조사 결과가 있으므로 임신 3개월 이내 또는 임신하고 있을 가능성이

있는 여성에는 비타민 A 결핍증 치료에 사용하는 경우를 제외하고는 이 약을 투여하지 않습니다. 또한 비타민 A 보급을 목적으로 이 약을 사용하는 경우는 식품 등으로부터의 섭취량에 주의하고 이 약에 의한 비타민 A 투여는 5,000 IU/일 미만에 머물도록 하는 등 적절한 주의를 합니다.

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과 의사, 약사와 상의하십시오. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오.

- 1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우 : 구역, 구토, 가려움, 건조하고 거친 피부, 통증성 관절부종, 위부 불쾌감, 설사, 변비, 발진, 발적
- 2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있습니다.
- 3) 에스트로겐을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전성 소인이 있는 환자가 비타민 E를 복용할 경우 혈전증의 위험이 증가될 수 있습니다.
- 4) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당내성) 손상(glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 고요산혈증(hyperuricemia, 혈액 중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간 손상을 일으킬 수 있습니다.
- 5) 장기간 고용량의 비타민 A(베타카로틴으로부터 전환된 것을 제외한) 섭취는 폐경기를 지난 여성의 골다공증(뼈연성증) 위험을 높일 수 있습니다.
- 6) 우발적으로 과량복용 한 경우
- 7) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지키십시오.
- 2) 이 약에 함유된 비타민 A는 정상적인 식이에서 충분히 공급되므로 보조요법의 용량은 1일 5,000 IU 이상을 넘지 않도록 합니다.

6. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에(밀폐하여) 보관하십시오.
- 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

【저장방법】

밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

【사용기간】

제조일로부터 36개월

【포장단위】

30정/병, 60정/병

【제 조 자】

(주)킵스바이오파마, 충청남도 서천군 종천면 종천공단길32번길 26

【판 매 자】

피비센트릭, 서울특별시 서초구 논현로 131

※ 본 의약품은 우수약품제조관리기준을満た한 제품입니다. 첨부문서를 읽은 후 사용(유효) 기한을 반드시 확인하시고 복용하여 주시기 바랍니다. 구입 시 사용(유효) 기한이 경과되었거나 유통 과정에서 변질, 변태 또는 오손된 제품을 구입했을 때에는 구입한 약국이나 병·의원을 통해 교환해드립니다.(소비자상담실 : 041-951-4300)

※ 부작용 피해 구제 상담 : 한국의약품안전관리원(14-3330)

※ 부작용 피해 구제 신청 : 한국의약품안전관리원(1644-6223)

※ 설명서가 작성된 이후 변경된 내용은 의약품안전나라(nedrug.mfds.go.kr)의 의약품 정보 또는 당사 홈페이지 www.keepsbiopharma.co.kr 의 각 제품란에 기재되어 있으니 참조하시기 바랍니다.

..... 약은 어린이 손에 닿지 않게 보관해야 합니다.

설명서 제정일자 2026년 01월 15일 [Rev.00]