

노바부틴 정 150mg

[트리메부틴말레산염]

일반의약품

분류번호 239

【원료약품 및 그 분량】 이 약 1정 중,

- 유효성분 : 트리메부틴말레산염(KP) 150mg
- 첨가제(동물유래) : 유당수화물(소, 우유)
- 기타첨가제 : 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 옥수수전분, 카르복시메틸셀룰로오스칼슘, 탕크, 포비돈

【성상】 흰색의 원형 정제

【효능·효과】

1. 주효능 효과

- 1) 식도역류 및 열공헤르니아, 위 십이지장염, 위 십이지장궤양에 있어서의 소화기능이상(복통, 소화불량, 구역, 구토)
- 2) 과민성대장증후군 및 경련성 결장
- 3) 소아 질환: 습관성 구토, 비감염성 장관통과장애(변비, 설사)

【용법·용량】

성인 : 말레산트리메부틴으로서 1회 100~200mg 1일 3회 식전에 경구투여한다.

연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

- 1) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 부작용

- 1) 소화기계 : 드물게 변비, 설사, 복명, 구역, 구토, 소화장애, 구갈, 구내마비감 등이 나타날 수 있다.
- 2) 순환기계 : 드물게 심계항진이 나타날 수 있다.
- 3) 정신신경계 : 드물게 피로감, 졸음, 현기, 권태감, 두통등이 나타날 수 있다.
- 4) 간장 : 드물게 GOT, GPT 상승이 나타날 수 있다.
- 5) 과민증 : 드물게 발진등이 나타날 수 있으므로 이러한 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지한다.

3. 임부에 대한 투여

임신중의 투여에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료상의 유의성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여한다.

4. 수유부에 대한 투여

수유중의 투여에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으므로 수유중인 부인에는 투여를 피하고 부득이 투여시는 수유를 중지한다.

【저장방법·사용기한】 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관 / 외부포장용기에 표시된 사용기한 내에 사용하십시오.

【포장단위】 30정/병, 500정/병

【제조외의·판매자】 한올바이오파마(주) 대전광역시 대덕구 상서당1길 43

【제조사】 한국유니온제약(주) 강원특별자치도 원주시 문막읍 문막공단길 247 A동 1층, 2층, C동, D동(시험동) 2층, 3층, E동(완제보관소)

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패, 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

※ 최신허가변경사항은 홈페이지(www.hanall.co.kr)에서 확인하시기 바랍니다.

※ 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품정보는 의약품통합정보시스템(<http://nedrug.mfds.go.kr>)을 참조하시기 바랍니다.

※ 부작용 피해구제 신청 : 한국의약품안전관리원(1644-6223, 14-3330)

NVB-I-00

작성연월일 : 2025.11.25

HANALL
BIOPHARMA

제조의뢰판매자

한올바이오파마 | 주

대전광역시 대덕구 상서당 1길 43
고객지원팀 : 1644-5515 www.hanall.co.kr