

바이포 정
(시트룰린말산염)

MK26062901-H

일반의약품

조제용

기능 무력증 보조 치료제

바이포 정

(시트룰린말산염)

Byfo Tab.

[성분·함량] 1정 중

· 유효성분 : 시트룰린말산염(별규).....500mg
· 기타 첨가제 : 메타규산알루민산마그네슘, 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 침강탄산칼슘, 카르나우바납, 크로스포비돈, 탭실드노란색 (29Y1543), 탭실드흰색 (11W001), 탭크

[성상] 노란색의 타원형 필름코팅정

[효능·효과] 기능 무력증의 보조치료

[용법·용량] 성인 : 시트룰린말산염으로서 1회 2정, 1일 3회 복용한다.
소아(6세이상) : 시트룰린말산염으로서 1회 2정, 1일 2회 복용한다.
단, 4주 이상 투여하지 않는다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
6세 미만의 유아

2. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 이 첨부문서를 소지할 것.

- 임부(동물실험에서 기형발생은 보고되지 않았으며 임상에서도 기형발생 또는 태자독성이 보고된 바 없으나 임신 중 투여에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으므로 임신 중에는 투여하지 않는 것이 바람직하다.)
- 수유부(유즙 분비에 대한 자료가 없으므로 이 약은 수유부에게 투여하지 않는 것이 바람직하다.)
- 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의할 것

3. 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항

- 정해진 용법·용량을 지킬 것.
- 소아에 투여할 경우에는 보호자의 지도 감독 하에 복용시킬 것
- 드물게 투여초기에 약한 위장관 장애가 나타날 수 있다.

4. 저장상의 주의사항

- 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용에 의한 사고발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃) 보관

[포장단위] 42정/병, 84정/병

제조의뢰자 : (주)메디카코리아 경기도 화성시 만세구 향남읍 제약공단4길 96

제 조 자 : (주)한국팜비오 충청북도 충주시 대소원면 첨단산업9로 36

저희 메디카코리아 제품은 KGMP에 적합하게 철저한 품질 관리를 통해서 제조됩니다. 혹시 사용기간이 경과되었거나, 유통과정 중 변질·훼손된 제품은 구입 경로를 통하여 교환해 드립니다.

* 부작용 피해구제 신청 : 한국의약품안전관리원(1644-6223)

* 피해구제 제도 전용 상담 전화번호 : 14-3330

* 첨부문서 작성일자 2026년 06월 29일 이후 변경된 내용은 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>) 또는 메디카코리아 홈페이지(www.medicakorea.com)에서 확인할 수 있습니다.

* 제품 문의 및 상담은 메디카코리아(1522-1131)로 문의 바랍니다.