



일반의약품

이 약은 사용하기 전에 반드시 사용설명서를 주의 깊게 읽어보시고, 사용설명서는 항상 약과 함께 보관하시기 바랍니다.

[원료약품 및 그 분량] 1정 중

유효성분 : 독시라민속신산염 (USP) 25.00 mg

첨가제 (동물유래성분) : 유당수화물(소, 우유)

기타 첨가제 : 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 전분글리콜산나트륨, 콜로이드성아산화규소

[성상] 흰색의 타원형 정제

[효능·효과] 불면증의 보조치료 및 진정

[용법·용량]

성인 : 독시라민속신산염으로서 1일 1회 25 mg을 반드시 수면 30분전에 경구투여한다. 연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것

- 1) 폐기증, 만성 기관지염 천식 등의 호흡장애 환자
- 2) 녹내장 환자
- 3) 전립선(전립샘) 비대 환자
- 4) 수유부
- 5) 15세 이하의 소아
- 6) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당) 분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것

이미프라민계 항우울약, 항파킨슨제, 디소피라미드와 병용(함께 복용)시 소변축적, 빈비 등의 이상 반응이 증가할 수 있으므로 주의한다.

3. 이 약을 복용하는 동안 다음의 행위를 하지 말 것

- 1) 의사 또는 약사와 상의 없이 다른 약물과 병용(함께 복용)하거나 2주 이상 투여하지 않는다.
- 2) 과도한 진정이 나타날 수 있으므로 고소작업이나 자동차 운전 등 위험이 수반되는 기계조작을 하지 않도록 주의한다.
- 3) 음주 후 또는 음주 시에 이 약을 투여하지 않는다.

4. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 약사와 상의할 것

임부 및 임신을 하고 있을 가능성이 있는 사람

5. 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항

- 1) 때때로 항콜린작용이 나타날 수 있다.
- 2) 이 약 투여 시 졸음이 올 수 있으므로 취침 시에 투여한다.
- 3) 낮에 졸음이 나타날 경우에는 용량을 감소한다.

6. 저장상의 주의사항

- 1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 2) 의약품을 원래 용기에서 꺼내서 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관한다.

[저장방법] 차광, 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

[포장단위] 10정/PTP

[제조사] (주)와이에스생명과학 경기도 이천시 모가면 공원로 133-1

※ 부작용 보고 : 한국의약품안전관리원(1644-6223)

※ 의약품 사용 후 부작용 발생 시 한국의약품안전관리원에 피해구제 신청을 할 수 있습니다.

※ 이 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결 기준에 따라 소비자의 정당한 피해는 보상받을 수 있습니다. 구입시 사용기한 또는 유효기한이 지났거나 변질, 변패, 오염, 손상된 제품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

※ 이 첨부문서의 작성일자(2026년 3월 9일)이후 변경된 내용은 홈페이지(www.gcbiopharma.com)나 소비자상담실(080-260-0033)로 문의하시기 바랍니다.

제조의뢰 및 판매자



(주)녹십자

충청북도 음성군 금왕읍 무극로65번길 26
TEL.031)260-9300 소비자상담실 TEL.080-260-0033
www.gcbiopharma.com