

효과 빠른 코막힘 완화, 알레르기성·급성 비염

# 콜민노즈

연질캡슐

|                                                                                             |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>[원료약품 및 그 분량]</b>                                                                        | 1캡슐(650mg) 중          |
| • 유효성분 : 벨라돈나총알칼로이드(JP) .....                                                               | 0.2mg (알칼로이드로서 0.2mg) |
| 클로르페니라민말레산염(KP) .....                                                                       | 4.00mg                |
| DL-메틸에페드린염산염(KP) .....                                                                      | 10.00mg               |
| • 첨가제(동물유래) : 젤라틴(돼지피부)                                                                     |                       |
| • 기타 첨가제 : 시트르산, 정제수, 소르비톨스페셜글리세린블렌드, 정제수, 치자청색소, 프로필렌글리콜, 부틸히드록시톨루엔, 폴리에틸렌글리콜400, 포비돈      |                       |
| <b>[성상]</b> 무색 내지 연한 청색의 투명한 내용물을 함유한 청색의 타원형 연질캡슐                                          |                       |
| <b>[효능·효과]</b> 코감기(급성비염), 알레르기성 비염 또는 부비동염에 의한 다음 증상의 완화: 코막힘, 콧물, 재채기, 눈물, 인후통, 머리무거움      |                       |
| <b>[용법·용량]</b> 만 15세 이상 및 성인 : 1일 3회, 1회 1캡슐 매 식후에 복용한다. 복용 간격은 4시간 이상으로 한다.                |                       |
| <b>[사용상의 주의사항]</b>                                                                          |                       |
| 1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것                                                                 |                       |
| 1) 만 3개월 미만의 영아(갓난아기)                                                                       |                       |
| 2) 이 약 및 이 약의 구성성분에 대한 과민반응 및 그 병력이 있는 사람                                                   |                       |
| 3) MAO억제제(항우울제, 항정신병제, 감정조절제, 항파킨슨제 등)를 복용하고 있거나 복용을 중단한 후 2주 이내의 사람                        |                       |
| 2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용(사용)하지 말 것.                                                        |                       |
| 다른 비염(코염)용 경구제, 항히스타민제를 함유하는 내복약(감기약, 진해거담제, 멀미약, 알레르기용약 등)                                 |                       |
| 3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의 할 것.                                            |                       |
| 1) 본인, 양친 또는 형제 등이 두드러기, 접촉성 피부염, 편두통, 음식물알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람                      |                       |
| 2) 지금까지 약에 의해 알레르기 증상(예 : 발열, 발진, 관절통, 천식, 가려움증 등)을 일으킨 적이 있는 사람                            |                       |
| 3) 고혈압, 심장질환, 녹내장(예 : 눈의 통증, 눈이 침침함 등), 배뇨곤란, 갑상선질환, 당뇨병 등이 있는 사람, 몸이 약한 사람 또는 고령이 있는 사람    |                       |
| 4) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부                                                            |                       |
| 5) 고령자(노인)                                                                                  |                       |
| 6) 의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람                                                                 |                       |
| 7) 다음과 같은 기침이 있는 사람                                                                         |                       |
| 흡연, 천식, 만성 기관지염, 폐기종, 과도한 가래가 동반되는 기침, 1주 이상 지속 또는 재발되는 기침, 만성 기침, 발열·발진이나 지속적인 두통이 동반되는 기침 |                       |

- 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.  
상당 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.
  - 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우  
출혈성뇌졸중, 구역·구토, 목마름(지속적이거나 심한), 변비, 식욕부진, 발진·발적(충혈되어 붉어짐), 가려움, 배뇨(소변을 눕)곤란, 두통, 안면홍조(붉어짐), 비정상적인 눈부심
  - 이 약의 복용에 의해 드물게 아래의 중증 증상이 나타난 경우
    - 속(아나필락시)(과민성 쇼크) : 복용후 바로 두드러기, 부종(부기), 가슴답답함 등과 함께 안색이 창백하고, 손발이 차고, 식은땀, 숨쉬기 곤란함 등이 나타날 수 있다.
  - 5~6회 복용하여도 증상이 좋아지지 않을 경우
- 소아에 대한 투여  
만2세 미만에게 투여하지 않는다. 다만, 꼭 필요한 경우 의사의 진료를 받는다.
- 기타 이 약의 복용시 주의할 사항
  - 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
  - 장기간 계속 복용하지 말 것.
  - 복용하는 동안 졸음이 오는 경우가 있으므로 자동차 운전 또는 기계류의 운전 조작을 피할 것.
  - 복용시에는 음주하지 말 것.
- 저장상의 주의사항
  - 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
  - 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에(밀폐하여) 보관할 것.
  - 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

**[저장방법]** 기밀용기, 실온(1~30℃)보관**[포장단위]** PTP) 20 캡슐/피티피((10캡슐/PTP)X2)**[제조사]** 알피바이오(주) / 경기도 화성시 만세구 제약공단4길 35-7**[제조의뢰자]** 영진약품(주) / 공장 : 경기도 화성시 만세구 남양읍 무하로 66

- 의사 또는 약사의 지시에 따라 사용하십시오.
- 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 구입하신 약국, 병원, 의원, 도매상을 통하여 교환하여 드립니다.
- 이 문서 작성일자 (2026년 00월 00일) 이후 변경된 내용은 홈페이지나 소비자상담실에서 확인 할 수 있습니다.
- 의약품 부작용 발생 신고 및 피해구제 상담은 한국의약품안전관리원(1644-6223) 또는 피해구제 제도 전용상담번호(14-3330)를 통하여 신청할 수 있습니다.

소비자 상담실 : 080-990-8200

홈페이지 : www.yungjin.co.kr

문서최초일 : 2026년 00월 00일