

나이아미정

(니코틴산아미드)

복용하시기 전에 설명서를 주의깊게 읽어보시고, 반드시 의약품과 함께 보관하십시오.

【제품명】 나이아미정(니코틴산아미드)

【원료약품 및 그 분량】 1정 중

- 유효성분 : 니코틴산아미드(KP) 500 mg
- 첨가제(타르색소) : 청색2호, 황색203호, 황색5호
- 기타 첨가제 : 라우릴황산나트륨, 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 이산화규소, 전분글리콜산나트륨, 크로스카르멜로오스나트륨, 탭실드주황색(2901491), 포비돈, 폴리에틸렌글리콜 6000, 히프로멜로오스

【성상】 주황색의 타원형 필름코팅정

【효능·효과】 니코틴산아미드 결핍의 치료

【용법·용량】 성인 1일 1회 1정을 물과 함께 복용한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것

- 1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 약사와 상의할 것

- 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 2) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성(임상적 경험이 없기 때문에, 니코틴산아미드 결핍이 명확히 확인된 경우를 제외하고는 복용을 권장하지 않는다)
- 3) 수유부(수유 중에는 복용을 권장하지 않는다)
- 4) 이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.

3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것

- 1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우: 홍조, 가려움증
- 2) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성 손상(glucose tolerance impairment: 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 고요산혈증(hyperurisemia: 혈액중에 요산이 과잉으로 존재

하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있다.

3) 우발적으로 과량 복용한 경우

4) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

4. 기타 이 약의 복용시 주의사항

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것
- 2) 여러 약물 간 발생할 수 있는 상호작용을 방지하기 위해, 처방중인 다른 치료에 대해 의사나 약사에게 반드시 알려야 한다.

5. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 뚜껑을 꼭 닫아 보관할 것
- 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

【저장방법】 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】 100정/병

【제조사】 **NOVA M³** 주 노바엠헬스케어 경상북도 경산시 하양읍 지식산업4로 16-53

【제조의뢰자】 **경남제약**주 충청남도 아산시 신창면 서부남로790번길 49

【판매자】 **S Sejong Medix** 서울특별시 송파구 동남로 134, 명노빌딩 6F(송파본사)

※ 기타 주의

1. 허가된 효능·효과와 다른 용도로 사용시에는 예상하지 못한 부작용이 나타날 수 있습니다.
2. 사용기한이 지난 제품은 변질의 우려가 있으므로 복용을 금하시기 바랍니다.

※ 올바른 사용법을 모르거나 의문사항이 있는 경우 의사·약사 및 자사 소비자 상담실로 문의하시기 바랍니다. 소비자 상담전화 : 080-232-8600, www.kyungnampharm.com

※ 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오염된 제품이 발견될 경우 공정거래위원회 고시 “소비자분쟁해결기준”에 의거 구입한 곳에서 교환 또는 환불받을 수 있습니다.

※ 의약품의 용어설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 의약품통합정보시스템 「<https://nedrug.mfds.go.kr>」 → 「의약품 등 검색」을 참조하시기 바랍니다.

※ 의약품 사용 후 부작용 발생 시 [한국의약품안전관리원](http://www.kafda.go.kr)에 피해구제 신청을 할 수 있습니다. 부작용 보고 및 피해구제 신청: [한국의약품안전관리원](http://www.kafda.go.kr)(1644-6223, 14-3330)