

코감기약

코름 | 코막힘 | 재채기 | 가래

【원료약품 및 그 분량】 1캡슐(625mg) 중

- 유효성분:
 - 이부프로펜(KP) 75mg
 - 클로르페넨라민말레산염(KP) 1.25mg
 - 슈도에페드린염산염(USP) 15mg
 - 구아이페네신(KP) 21mg
- 첨가제(동물유래성분): 젤라틴(소, 가축)
- 기타첨가제: 폴리메탈렌글리콜400, 정제수, 수산화칼륨, 폴리메탈렌글리콜, 포도분, 부틸레이티드트리스틸루렌, 부분탈수유동소르비톨, 에틸바닐린, 치자청색소, 홍화황색소

【성상】

미황색 내지 연한 초록색의 투명한 내용물을 함유한 초록색 투명의 타원형 연질캡슐

【효능효과】

감기의 제증상(여러증상)(코름, 코막힘, 재채기, 인후(목구멍)통, 가래, 오한(춥고 떨리는 증상), 발열, 두통, 관절통, 근육통)의 완화

【용법용량】

- 만 15세 이상 및 성인: 1일 3회, 1회 2캡슐 식후 30분에 복용
- 만 7세 초과·만 15세 미만: 1일 3회, 1회 1캡슐 식후 30분에 복용

【사용상의 주의사항】

1. 경고

- 슈도에페드린 함유 제제 복용 시 급성 전신성 발진성 홍포증(AGEP)과 같은 중증 피부 이상반응이 나타날 수 있다. 발열, 홍반, 다수의 작은 농포와 같은 증상이 관찰될 경우 이 약의 복용을 중단하고 의사 또는 약사와 상의해야 한다.

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

- 이 약 및 이 약의 구성성분에 대한 과민반응 및 그 병력이 있는 사람
- 이 약 및 이 약의 구성성분, 다른 해열진통제, 감기약 복용 시 전신을 일으킨 적이 있는 사람
- 만 3개월 미만의 영아
- MAO억제제(항우울제, 항장신병제, 감정조절제, 항파킨슨제 등)를 복용하고 있거나 복용을 중단한 후 2주 이내의 사람
- 중증 또는 조절되지 않는 고혈압 환자
- 중증 급성 또는 만성 신장질환/신부전 환자

3. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.

진해(기침을 그치게 함)제(가래약), 다른 감기약, 해열진통제, 진정제, 항히스타민제를 함유하는 내복약(비염(코염)용 경구제, 열미약, 알레르기용약)

4. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의 할 것.

- 수두 또는 인플루엔자에 감염되어 있거나 또는 의심되는 영아 및 만 15세 미만의 어린이(구역이나 구토를 수반하는 행동의 변화가 있다면, 드물지만 심각한 질병인 레이증후군의 초기 증상일 수 있으므로 의사와 상의 할 것.)
- 슈도에페드린 성분과 관련하여 허혈성 대장염의 증상(급격한 복통, 직장 출혈 등)이 발견될 경우
- 본인, 양친 또는 형제 등이 두드러기, 접촉성피부염, 기관지천식, 알레르기성비염, 편두통, 음식물 알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람
- 지금까지 의사에 의해 알레르기 증상(예: 발열, 발진, 관절통, 천식, 가려움증 등)을 일으킨 적이 있는 사람
- 간장질환, 신장질환, 심장질환, 갑상선질환, 당뇨병, 고혈압, 내과제(예: 눈의 통증, 눈이 침침함 등), 배뇨관장애가 있는 사람, 고령자, 몸이 약한 사람 또는 고령이 있는 사람
- 속쓰림, 위부불쾌감, 위통과 같은 위장문제가 지속 혹은 재발되거나 제양, 출혈문제를 가지고 있는 사람
- 구토와 설사로 많은 수분을 손실하거나 수분을 흡수하지 않는 사람 또는 이뇨제를 복용하는 사람
- 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부(임신 30주 이후 살리실산나트륨, 살리실아미드, 아스피린, 아스피린알루미늄, 살리산콜린, 이부프로펜 성분 함유 제제의 투여가 권고되지 않는다)
- 의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람(당뇨병, 통풍약, 관절염약, 항응고제, 스테로이드제 등 다른 약물을 투여 받고 있는 사람)
- 다음과 같은 기침이 있는 사람
 - 흡연, 천식, 만성 기관지염, 폐기종, 과도한 가래가 동반되는 기침, 1주 이상 지속 되는 재발되는 기침, 만성 기침, 발열·발진이나 지속적인 두통이 동반되는 기침

5. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의 할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

- 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우
 - 발진·발적, 가려움, 구역·구토, 식욕부진, 변비, 위통, 소화관출혈, 위부불쾌감, 부종, 배뇨곤란, 목마름(지속적이거나 심한), 어지러움, 불면, 떨림, 불면
- 이 약의 복용에 의해 드물게 아래의 증상(심한 증상) 증상이 나타난 경우
 - 속(아나필락시스): 복통 후 바로 두드러기, 부종, 가슴답답함 등과 함께 안색이 창백하고, 손발이 차고, 식은땀, 숨쉬기 곤란함 등이 나타날 수 있다.
 - 피부정맥안종후군(스티븐스-존슨증후군), 중독성표피괴사증후군(리엘증후군): 고열을 동반하고, 발진·발적(충혈되어 붉어짐), 화상과 같이 물집이 생기는 등의 심한 증상이 전신피부, 입이나 눈점막에 나타날 수 있다.
 - 천식
 - 가역적 또는 비가역적 중추근 및 가역적 뇌혈관 수축 증후군: 갑작스러운 심한 두통, 빈맥, 두통, 구토, 구토, 혼돈, 발작, 시각 장애 등이 발현될 수 있다.
 - 심장: 코니스 증후군(빈도불명)
- 5-6회 복용하여도 증상이 좋아지지 않을 경우

6. 소아에 대한 투여

만 2세 미만에게 투여하지 않는다. 다만, 꼭 필요한 경우 의사의 진료를 받는다.

7. 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항

- 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
- 장기간 계속 복용하지 말 것.
- 어린이에게 복용시킬 경우에는 보호자의 지도 감독하에 복용시킬 것.
- 복용 시에는 음주하지 말 것.
- 복용하는 동안 출혈이 오는 경우가 있으므로 자동차 운전 또는 기계류의 운전 조작을 피할 것.
- 이 약 투여 환자에서서 코니스 증후군 사례가 보고되었다. 코니스 증후군은 관상동맥 수축과 관련이 있는 알레르기 또는 과민반응 후 발생하는 심혈관계 증상으로 심근경색을 초래할 수 있다.

8. 저장상의 주의사항

- 어린이의 손에 닿지 않는 장소에 보관할 것.
- 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에(밀폐하여) 보관할 것.
- 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃) 보관

【사용기한】 제조일로부터 36개월

【포장단위】 10캡슐/상자(10캡슐/PTP x1)

【제조자】 ㈜서창 / 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명로 61

【제조의뢰자】 씨아이디지제약 주식회사 / 경기도 부천시 원미구 정정로 14번길 65

- ※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품이며, 공정거래 위원회 고시 소비자 분쟁해결 기준에 의거 보상받을 수 있습니다. 만약 구입 시 사용(유효)기한이 지나거나 변질, 또는 사용되거나 손상된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환해드립니다.
- ※ 부작용 보고 및 피해구제 신청: 한국 의약품안전관리원(1644-6223, 14-3330)
- ※ 본 의약품에 대한 자세한 허가사항은 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>)을 참고하시기 바랍니다.
- ※ 첨부문서를 주의 깊게 읽고, 의약품과 함께 보관하십시오.
- ※ 소비자 상담실(전화): 032-675-5561

첨부문서 작성일: 2026. 05. 13