

슈퍼라민우르스정

[원료약품 및 그 분량]

1정 중

- **유효성분** : 푸르셀티아민(KP) 30.0mg, 벤포티아민(KP)(티아민염산염으로서 21.69mg) 30.0mg, 리보플라빈부티레이트(KP) 12.0mg, 니코틴산아미드(KP) 10.0mg, 판토텐산칼슘(KP) 50.0mg, 피리독살포스페이트수화물(KP) 5.0mg, D-비오틴(USP) 0.3mg, 폴산(KP) 0.3mg, 메코발라민(KP) 0.5mg, 산화아연(KP)(아연으로서 14.7mg) 18.3mg, 우르소데옥시콜산(KP) 50.0mg, 오로트산수화물(KP) 100.0mg, 콜린타르타르산염(별규) 150.0mg, 글루쿠로노락톤(KP) 100.0mg, 타우린(KP) 100.0mg, 베타인염산염(USP) 20.0mg, 로알젤리(생규)(10-히드록시-2-데세노인산으로서 0.2mg) 5.0mg
- **첨가제(동물유래성분)** : 유당(젓당)수화물(소, 우유)
- **기타 첨가제** : 경질무수규산, 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 크로스카르멜로오스나트륨, 탭실드빨간색(99R1259), 폴리에틸렌글리콜6000, 히드록시프로필셀룰로오스

[성상] 적갈색의 타원형 필름코팅정

[효능·효과]

○ 다음 경우의 비타민 B₁, B₂, B₆의 보급

- 육체피로 - 임신·수유기
- 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력 저하 시
- 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같다.
 - 다음 증상의 완화: 신경통, 근육통, 관절통(요(허리)통, 어깨결림 등), 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염
 - 각기 • 눈의 피로

[용법·용량] 만 19세 이상 성인: 1일 1회, 1회 1정 복용

[사용상의 주의사항]

복용하시기 전에 아래의 주의사항을 잘 읽어보신 후 복용하시기 바랍니다.

1) 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

(1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자 (2) 만 12개월 미만의 젖먹이 (3) 이 약은 유당(젓당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젓당)분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2) 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.

(1) 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제 (2) 레보도파

3) 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
(1) 의사의 치료를 받고 있는 환자 (2) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아 (3) 심장·순환기계기능 장애 환자 (4) 신장(콩팥)장애 환자 (5) 저단백혈증 환자 (6) 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증, 췌장염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성유제를 신중히 투여해야 하는 환자 및 임부, 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 고령자(노인)

4) 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

(1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우 : 구역, 구토, 묽은 변, 설사, 구내염(입안염), 식욕부진, 복부(배부분)팽만감, 위장관장애, 소화장애, 상복부통증, 저혈압, 폐부종, 복부(배부분)불쾌감, 변비, 발진 (2) 피리독신을 1일 500mg ~ 2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy: 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있다. (3) 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B₁₂를 1일 10μg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있다. (4) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당내성) 손상(glucose tolerance impairment: 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 고요산혈증(hyperuricemia, 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있다. (5) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈심부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다. (6) 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용(함께 복용)투여 시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것. (7) 우발적으로 과량복용 한 경우 (8) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

5) 기타 이 약의 복용 시 주의사항

(1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것 (2) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있다. (3) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피할 것

6) 저장상의 주의사항

(1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것. (2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것. (3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

[포장단위] 30정/병, 60정/상자(30정/병X2)

※ 개봉한 약을 냉장고, 욕실, 주방 등 습기가 많은 곳이나 직사광선이 닿는 곳에는 보관하지 마십시오. ※ 습기, 열, 빛은 약의 효과와 안정성에 영향을 줄 수 있으니 보관에 주의 바랍니다. ※ 본 의약품은 "우수의약품 제조 및 품질관리기준(KGMP)"에 따라 제조 및 품질검사를 한 의약품입니다. ※ 제품 구입 시 사용기한 또는 유효기한이 지났거나 변질·변패·오염되거나 손상된 의약품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁해결 기준에 의거, 약국개설자, 안전상비약품 판매자 및 의약품 판매업자를 통해 교환 또는 환불받을 수 있습니다. ※ 이 설명서는 2026년 03월 30일자로 작성되었으며 이후로 변경된 내용은 식품의약품안전처 의약품 등 검색(<https://nedrug.mfds.go.kr>)에서 확인할 수 있습니다. ※ 의약품 부작용 신고·피해구제 상담 : 한국 의약품안전관리원(1644-6223, 14-3330)

[제조사] (주)한풍제약

전북특별자치도 완주군 봉동읍 완주산단6로 301, 봉동로 705

[판매자] 일동제약(주)

본사 : 서울특별시 서초구 바우로27길 2 공장 : 경기도 안성시 공단1로 25

www.ildong.com 고객센터상담 : 080-022-1010 (수신자부담)