

SUPERB PREMIUM VITAMIN

슈퍼라민 판트로정

일반의약품

[원료약품 및 그 분량]

1정 중

■ 유효성분 :

푸르셀티아민(KP)	60.0mg
벤포티아민(KP)(티아민염산염으로서 32.54mg)	45.0mg
비스벤티아민(KP)(티아민염산염으로서 4.37mg)	5.0mg
리보플라빈부티레이트(KP)	12.0mg
파리독살포스페이트수화물(KP)	5.0mg
시아노코발라민(KP)	1.5mg
메코발라민(KP)	1.0mg
이노시톨(KP)	50.0mg
D-비오틴(USP)	0.25mg
폴산(KP)	0.5mg
니코틴산아미드(KP)	10.0mg
판토텐산칼슘(KP)	50.0mg
콜레칼시페롤농축분말(EP)(비타민 D로서 1,000IU)(동물유래성분 : 양, 양모)	10.0mg
우르소데옥시콜산(KP)	10.0mg
콜린타르타르산염(별규)	50.0mg
산화마그네슘(KP)(마그네슘으로서 90.48mg)	150.0mg
아스파르트산마그네슘수화물(KP)(마그네슘으로서 0.75mg)	10.0mg
글리세로인산마그네슘(BP)(마그네슘으로서 1.25mg)	10.0mg
타우린(KP)	100.0mg

■ 첨가제 : 경질무수구산, 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 크로스카르멜로오스나트륨, 탭설드빨간색 (99R1259), 폴리에틸렌글리콜6000, 히드록시프로필셀룰로오스

[성상] 적갈색의 타원형 필름코팅정

[효능·효과]

○ 다음 경우의 비타민 D, B₁, B₂, B₆의 보급

- 육체피로 - 임신·수유기 - 발육기 - 노년기

- 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력 저하 시

- 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같다.

• 뼈, 이의 발육불량 • 구루병의 예방 • 각기 • 눈의 피로

• 다음 증상의 완화: 신경통, 근육통, 관절통(요(허리)통, 어깨결림 등), 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염

[용법·용량] 만 15세 이상 및 성인: 1일 1회, 1회 1정 복용

[사용상의 주의사항]

복용하시기 전에 아래의 주의사항을 잘 읽어보신 후 복용하시기 바랍니다.

1) 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

(1) 고칼슘혈증(hypercalcemia: 혈액중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태) 환자, 유육종증(sarcoidosis: 원인을 알 수 없는 전신 염증질환), 신장(콩팥)질환 환자 (2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자 (3) 만 12개월 미만의 정맥이 (4) 신장(콩팥)결석 환자 (5) 심한 증상의 신부전 환자

2) 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.

(1) 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제 (2) 레보도파

3) 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것.

(1) 의사의 치료를 받고 있는 환자 (2) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아

① 비타민 D는 모유로 분비되어 신생아에게 고칼슘혈증을 일으킬 수 있다. ② 태어난 지 3주 이내 마우스 및 랫트에 아스파르트산으로 250mg/kg 이상을 투여하면, 시상하부 공상핵에 병리조직학적 변화를 확인했다는 보고가 있으므로 미숙아, 신생아, 젖먹이에게는 투여하지 않는 것이 바람직하다.

(3) 심장·순환기계기능 장애 환자 (4) 신장(콩팥)장애 환자 (5) 저단백혈증 환자 (6) 신장(콩팥)결석 병력이 있는 환자

(7) 임부 (8) 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증, 췌장염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성유제를 신중히 투여해야 하는 환자 및 임부, 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 고령자(노인)

4) 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

(1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우: 구역, 구토, 설사, 땀은 변, 구내염(입안염), 식욕부진, 복부(배부분)팽만감, 붉은 반점, 부전수축(심장박동정지), 중추신경계 기능 저하, 복부(배부분)불쾌감, 변비, 발진 (2) 피리독신을 1일 500mg ~ 2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy: 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있다. (3) 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B₁₂를 1일 10μg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있다. (4) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당내성) 손상(glucose tolerance impairment: 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 고요산혈증(hyperuricemia, 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있다. (5) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 우울혈심부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다. (6) 항알도스테론제, 트리암테덴과 병용(함께 복용)투여 시 고칼슘혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것. (7) 우발적으로 과량복용 한 경우 (8) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

5) 기타 이 약의 복용 시 주의사항

(1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것 (2) 요를 황색으로 변화하여 임상검사에 영향을 줄 수 있다. (3) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피할 것

6) 저장상의 주의사항

(1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것. (2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것. (3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

[포장단위] 60정/병, 120정/상자(60정/병×2)

※ 개봉한 약을 냉장고, 욕실, 주방 등 습기가 많은 곳이나 직사광선이 닿는 곳에는 보관하지 마십시오. ※ 습기, 열, 빛은 약의 효과와 안정성에 영향을 줄 수 있으니 보관에 주의 바랍니다. ※ 본 의약품은 “우수의약품 제조 및 품질관리기준(KGMP)”에 따라 제조 및 품질검사를 한 의약품입니다. ※ 제품 구입 시 사용기한 또는 유효기한이 지났거나 변질·변패·오염되거나 손상된 의약품은 공정거래 위원회 고시 소비자 분쟁해결 기준에 의거, 약국개설자, 안전상비의약품 판매자 및 의약품 판매업자를 통해 교환 또는 환불받을 수 있습니다. ※ 이 설명서는 2026년 03월 30일자로 작성되었으며 이후로 변경된 내용은 식품의약품안전처 의약품 등 검색(<https://nedrug.mfds.go.kr>)에서 확인할 수 있습니다. ※ 의약품 부작용 신고·피해구제 상담: 한국의약품안전관리원(1644-6223, 14-3330)

[제조사] (주)한동제약 전북특별자치도 완주군 봉동읍 완주산단6로 301, 봉동로 705

[판매자] 일동제약(주)

본사: 서울특별시 서초구 바우뫼로27길 2 공장: 경기도 안성시 공단1로 25

www.ildong.com 고객센터상담실: 080-022-1010 (수신자부담)