

KGMP

일반의약품(조제용)

Ver.00

기능 무력증 보조 ↑ 치료제

케이업정

(시트룰린말산염)

※ 의약품을 사용하시기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽고, 의약품과 함께 보관하십시오.

【원료약품 및 그 분량】이 약 1정 중

- 유효성분 : 시트룰린말산염(별규) 500mg
- 기타첨가제 : 메타규산알루미늄산마그네슘, 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 침강탄산칼슘, 카르나우바납, 크로스 포비돈, 탭크, 탭실드노란색(29Y1543), 탭실드흰색(11W001)

【성상】 노란색의 타원형 필름코팅정

【효능·효과】 기능 무력증의 보조치료

【용법·용량】 성인 : 시트룰린말산염으로서 1회 2정, 1일 3회 복용한다.

소아(6세이상) : 시트룰린말산염으로서 1회 2정, 1일 2회 복용한다.
단, 4주 이상 투여하지 않는다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

6세 미만의 유아

2. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 이 첨부문서를 소지할 것.

- 1) 임부(동물실험에서 기형발생은 보고되지 않았으며 임상에서도 기형발생 또는 태자독성이 보고된 바 없으나 임신 중 투여에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으므로 임신 중에는 투여하지 않는 것이 바람직하다.)
- 2) 수유부(유즙 분비에 대한 자료가 없으므로 이 약은 수유부에게 투여하지 않는 것이 바람직하다.)
- 3) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의할 것

3. 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항

- 1) 정해진 용법·용량을 지킬 것.
- 2) 소아에 투여할 경우에는 보호자의 지도 감독 하에 복용시킬 것.
- 3) 드물게 투여초기에 약한 위장관 장애가 나타날 수 있다.

4. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 2) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용에 의한 사고발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관 【포장단위】 12정/병, 42정/병, 84정/병

【제조회자】 (주)케이에스제약 / 전남광주통합특별시 화순군 화순읍 산단길 126

【제조자】 (주)한국팜비오 / 충청북도 충주시 대소원면 침단산업9로 36

※ 본 의약품은 KGMP(의약품 제조 및 품질관리 기준)에 의하여 엄격한 관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용(유효)기간이 경과되었거나 변질·변패·오염되거나 손상된 의약품이 발견된 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

※ 의약품을 어린이의 손에 닿지 않게 보관하여야 합니다.

※ 사용(유효)기간이 지난 의약품을 사용하지 않도록 합니다.

※ 이 첨부문서 개정연월일 이후 변경된 내용은 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>)에서 확인하실 수 있습니다.

※ 제품에 관한 문의사항은 (주)케이에스제약 소비자 상담실(061-371-0074)로 문의주시기 바랍니다.

※ 부작용 피해구제 신청은 한국 의약품안전관리원(1644-6223) 또는 피해구제 제도 전용 상담번호(14-3330)로 문의바랍니다.

개정연월일 : 2026년 07월 31일