

알츠하이머병 치료제

도메틴엠정 10/20mg

(도네패질염산염수화물 / 메만틴염산염)

【원료약품 및 그 분량】 1정 중
· 유효성분：도네패질염산염수화물(USP) 10.43mg(도네패질염산염(으)로서 10.00mg), 메만틴염산염(별구) 20.00mg
· 첨가제(동물유래성분)：유당수화물(소,우유)
· 기타첨가제：D-만니톨, 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 오파드라이노란색(03852037), 히드록시프로필셀룰로오스, 히프록셀로오스

【성상】 진노란색의 타원형 필름코팅정
【효능·효과】 중등도에서 중증의 알츠하이머병 치료를 위한 도네패질과 메만틴 병용요법 대체
【용법·용량】 도네패질염산염 10mg과 메만틴염산염 20mg을 병용으로 투여하여야 하는 환자에서 복용의 편리함을 위하여 이 약(개개의 주 성분 함량이 동일한 복합제)으로 전환하여, 1일 1회 1정을 취침 전 매일 동일한 시간에 투여한다. 이 약은 음식물의 섭취와 상관없이 복용할 수 있다. 중등증 및 중증 신장애 환자, 간장애 환자, 저체중인 85세 이상 여성 환자에 대한 이 약의 안전성,유효성은 연구되지 않았다.

【사용상의 주의사항】 1. 다음 환자에는 투여하지 말 것. 1) 이 약 및 이 약의 구성성분에 과민증이 있는 환자 2) 중증의 간장애 환자 3) 중증의 신장애 환자 (크레아티닌 청소율 < 5 mL/min) 4) 도네패질염산염, 피페리딘 유도체 또는 이 약의 구성성분에 과민반응 환자 5) 일부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성 및 수유부 6) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), lapp(유당분해효소 결핍증(lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose-malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안된다. 2. 다음 환자에게는 신중히 투여할 것 1) 뇌전증 환자, 과거 경련 경험자, 뇌전증에 걸리기 쉬운 소인이 있는 환자. 2) 아만티딘, 케타린 또는 메크스토메토르판과 같은 NMDA(N-methyl-D-aspartate) 길항제를 병용 투여하는 환자. 이들 약물은 이 약과 동일한 수용체에 작용하므로 부작용 (주로 중추신경계 관련) 발생 비율이 증가하거나 부작용 지속 시간이 연장될 수 있으므로 병용투여하지 않는다. 3) 노 pH를 증가시킬 수 있는 요인이 있는 환자, 육식에서 채식으로의 급격한 식이 변경, 알칼리성 음료의 대량 섭취 또는 신세뇨관산중증(RTA, renal tubular acidosis), Proteus bacteria에 의한 심한 요로 감염 환자의 경우 노 pH를 증가시킬 수 있으므로 주의하여 모니터링한다. 4) 최근의 심근경색, 유행성 심부전증, 조절되지 않은 고혈압이 있는 환자. 메만틴 제제로 수행된 대부분의 임상시험에서 이들 환자는 제외되었기 때문에 자료가 없다. 5) 동부전증후군, 심방내 및 방실결절방문전도장애 등 심장질환 환자(미주신경자극작용으로 인해 사맥을 일으키고 부정맥이 발생할 가능성이 있다.) 6) 비스테로이드성 소염진통제를 투여중인 환자 또는 소화성궤양의 병력 환자(위산분비 촉진 및 소화관운동 촉진으로 소화성궤양이 악화될 가능성이 있다.) 7) 천식 및 폐쇄폐질환 병력 환자(기관지평활근의 수축 및 기관지점막 부비 항진으로 증상이 악화될 수 있다.) 8) 추체외로장애(파킨슨병, 파킨슨증후군 등) 환자(신체계의 콜린ergic기능의 항진으로 증상을 유발 또는 악화시킬 가능성이 있다.)

3. 이상반응 이 약은 각 단일제인 도네패질염산염 및 메만틴염산염의 이상반응을 포함한다. ○도네패질염산염 1) 경증~중등도 알츠하이머병 치매증상의 치료 (1) 다음은 임상시험에서 보고된, 이 약과 인과관계가 있다고 판단되는 빈도불령의 중요한 이상반응이다. 다음과 같은 증상이 나타날 때는 투약을 중지하는 등 적절한 처치를 하여야 한다. ① 실신, 사맥, 심장차단. QT 구간의 연장, 심근경색, 심부전 ② 소화성궤양, 천장상심아지장 천공, 위양관 출혈 ③ 간염, 간기능 장애, 황달 ④ 뇌성방각뇌전증, 경련 등), 뇌출혈, 뇌혈관 장애 ⑤ 추체외로장애 : 운동기능장애, 운동실조, 운동장애, 근긴장이상, 진전, 불수의운동, 보행장애, 비정상적 자세, 언 어장애 ⑥ 신경이원제작용증후군 : 무동성 무인증, 극도의 근경직, 삼킴곤란, 빈맥, 혈압변동, 발한과 같은 증상이 나타날 수 있으며, 이와 같은 증상은 주로 발열이 동반된다. 이 경우 약물의 중단과 함께 열을 내리는 진신요법과 수액, 전해질 공급과 같은 집중적인 치료를 하여야 한다. 백혈구와 혈장 CK(CPK)의 증가는 미오글로빈뇨증을 동반 하는 신기능장애를 유발할 수 있으므로 관찰을 요한다. ⑦ 혈문근용해증이 나타날 수 있으므로 근육통, 무력감, 혈액과 요에서의 CK(CPK)의 증가를 주의 깊게 관찰해야 한다. 혈문근용해증으로 인한 신기능장애가 나타나지예 대한 주의를 요한다. ⑧ 호흡곤란 ⑨ 급성 채장염 ⑩ 급성 신부전 ⑪ 원인을 알 수 없는 돌연사 (2) 다음은 임상시험에서 보고된, 이 약과 인과관계가 있다고 판단되는 이상반응이다. 이상반응 발현빈도는 매우 자주 (10%~2%), 자주(1~<10%), 때때로(0.1~<1%), 드물게(0.01~<0.1%), 매우 드물게 <0.01%)로 구분하였다.

발현빈도 간격	매주	자주	때때로	드물게	빈도불령
감염		감기			
대사 및 영양		식욕부진			
			불안증 불면증 졸음 성용증가 수다 조증		악동 신경과민 헛소리 망상 우울증 혼돈 무관심 운동과다증
정신계		환각** 흥분** 공격적행동**			
신경계		실신* 어지러움 불면 진전	발작*	추체외로증상	흔미
심혈관계			사맥 심계항진	동방심차단 방실차단	염전성 심실 빈맥 (Torsade de pointes) 을 포함한 여러 형태 심실 빈맥 심전도 QT 간격 연장
소화기계	설사 구역	구토 복부장애 (복통포함)	위장관출혈 위십이지장궤양 변비 타액분비		삼킴곤란 대변실금
간-담도계				간염을 포함한 간 장애***	
피부 및 피하조직		발진 가려움증			
근골격계, 접합 조직 및 뼈		근육 경련			근육통
신장 및 비뇨기계		요실금			빈뇨 요정체 부종 (인번증소 포함) 발열 체온감소
전신 및 투여 부위	두통	피로 통증 치통	안면홍조 견대강 무기력증		

전문의약품 알츠하이머병 치료제 도메틴엠정 10/20mg (도네패질염산염수화물 / 메만틴염산염)	2026. 03. 06
---	--------------

혈액계	해마토크리트감소	백혈구감소증	빈혈 혈소판감소증
심해 및 중독	낙상을 포함한 사고		

* 실신이나 발작에 대한 임상연구시 심블록 또는 통유지 연장의 가능성이 고려되어야 한다.
** 환각, 흥분 및 공격적 행동은 용량 강량 또는 치료 중단시 사라졌다.
*** 설명할 수 없는 간기능 장애의 경우, 이 약의 투여 중단이 고려되어야 한다.

(3) 이 약과의 인과관계가 상관없이 이 약의 투여 후 보고된 이상반응은 다음과 같다.

① 혈관계 및 림프계: 빈상출혈
② 신경계: 비정상적 꿈

(4) 국내 시판후 조사결과

국내에서 6년 동안 2,563명을 대상으로 실시한 시판후 사용성적조사결과와 이상반응은 인과관계와 상관없이 5.31% (136례/2,563례)로 보고되었고, 이 중 이 약과 인과관계가 있는 것으로 조사된 것은 4.25% (109례/2,563례)이다. 이 약과의 인과관계가 있는 것으로 조사된 (또는 인과관계를 배제할 수 없는) 이상반응을 발현빈도율이 높은 순으로 다음과 같이 나타내었다.

구역이 1.72% (44례/2,563례)로 가장 많았고, 구토 0.82% (21례/2,563례), 어지러움 0.62% (16례/2,563례), 설사 0.47% (12례/2,563례), 불면 0.39% (10례/2,563례), 복부통증 0.31% (8례/2,563례)의 순으로 나타났다. 식욕부진, 두통, 피로, 추체외로장애가 각 0.2%로 근긴장이상, 배뇨장애가 각 0.1%로 보고되었으며, 0.1% 미만에서 불안증, 비정상적 꿈, 심계항진, 무기력증, 발한, 피부발진, 공격적행동, 진전, 보행장애, 불수의운동, 집중력저하, 정신둔함, 졸음, 심장정지가 보고되었다.

이 중 시판 전 임상시험에서 확인되지 않은 새로운 이상반응으로 심장정지 1건이 보고되었다.

중증 알츠하이머형 치매증상의 치료

(1) 투여중단의 원인이 된 이상반응

통제된 임상 시험에서의 이상반응으로 인한 약물을 투여 중단율은 이 약의 투여군이 12%, 위약군이 7%였다. 투여 중단된 가장 빈번한 이상반응은, 이 약의 투여군에 최소 2%에서 발생했고 그 빈도가 위약군의 2배 이상으로 정의되며, 식욕감퇴(이 약의 투여군 2%, 위약군 1%), 구역(이 약의 투여군 2%, 위약군 1% 미만), 설사(이 약의 투여군 2% 위약군 0%), 오토감염증(이 약의 투여군 2% 위약군 1%) 등이 해당되었다.

(2) 이 약의 투여와 관련성이 있을 것으로 보이는 가장 빈번한 이상반응

이 약을 투여받은 환자에서 적어도 5%의 빈도를 보이고 위약군에 비해 2배 이상이며, 이 약의 플린유사작용에 기인한 것으로 추정되는 이상반응으로 정의한 가장 흔한 이상반응은 설사, 식욕감퇴, 구토, 구역과 빈상출혈 등이었다. 이러한 이상반응은 주로 경증이고 일시적이며 투여 기간 동안 용량 조절의 필요 없이 회복되었다. 다음 표는 위약군과 임상에서 이 약을 투여받은 피험자 중 적어도 2% 이상에서 보고되고 위약 투여군에 비해 발생률이 더 높은, 투여로 인한 참후나 증상을 목록화한 것이다.

통제된 임상시험에서 보고된 이상반응

중증 알츠하이머형 치매증상에 대한 통제된 임상시험에서, 이 약을 투여받은 피험자 중 최소 2%에서 보고되고 위약 투여군에 비해 발생률이 높은 이상반응		
신체 기면/이상반응	위약(n=392)	이 약(n=501)
17지 이상의 이상반응을 경험한 피험자 백분율	73	81
전신		
사고	12	13
감염	9	11
두통	3	4
통증	2	3
등통증	2	3
발열	1	2
홍통	<1	2
심혈관계		
고혈압	2	2
출혈	1	2
심신	1	2
소화기계		
설사	4	10
구토	4	8
식욕 감퇴	4	8
구역	2	6
혈액계 및 림프계		
빈상 출혈	2	5
대사 및 영양계		
CPK 증가	1	3
탈수	1	2
고지지방혈증	<1	2
신경계		
불면증	4	5
적개심	2	3
신경질	2	3
환각	1	3
졸음	1	2
어지러움	1	2
우울증	1	2
혼란	1	2
감정 불안정성	1	2
성격 이상	1	2
피부 및 피부 부속기		
습진	2	3
비뇨기계		
요실금	1	2

신체 기판/이상반응	위약(n=392)	이 약(n=501)
17가지 이상의 이상반응을 경험한 피험자 백분율	73	81
전신		
사고	12	13
감염	9	11
두통	3	4
통증	2	3
등통증	2	3
발열	1	2
홍통	<1	2
심혈관계		
고혈압	2	3
출혈	1	2
실신	1	2
소화기계		
설사	4	10
구토	4	8
식욕 감퇴	4	8
구역	2	6
혈액계 및 림프계		
빈상 출혈	2	5
대사 및 영양계		
CPK 증가	1	3
탈수	1	2
고지방혈증	<1	2
신경계		
불면증	4	5
적개성	2	3
신경질	2	3
환각	1	3
졸음	1	2
어지러움	1	2
우울증	1	2
혼란	1	2
감정 불안정성	1	2
성적 이상	1	2
피부 및 피부 부속기계		
습진	2	3
비노기계		
요실금	1	2

(3) 임상시험 동안 보고된 다른 이상반응 이 약은 3건의 이매정형 위약대조군 시험(이 중 1건의 임상시험은 공개 라벨시험으로 확장되었음)을 포함하여 최 소 6개월 이상 진행된 임상시험에서 600명이 넘는 중증 알츠하이머병의 피험자에게 투여되었다. 아래 표에는 적 어도 2번 이상 발생한 모든 이상반응을 포함시키되, 상기 표에서 이미 목록화된 이상반응과, COSTART 용어가 너 무 일반적이어서 유익한 정보를 제공하지 않거나, 혹은 약효물과의 관련성이 적은 것은 제외하였다. 이상반응은 COSTART 용어집을 사용하여 신체 기관에 따라 분류되었고 발현빈도 0.1% 이상 또는 0.1%~1%에 따라 목록화하였 다.
--

이러한 이상반응은 반드시 이 약의 투여와 관련성이 있는 것은 아니며, 대부분의 경우 통제된 임상시험에서 위약 투여군에서의 빈도와 유사하였다.
--

신체 기관	1% 이상	0.1~1%
전신	복통, 무력증, 진근감염, 인플루 엔자유사증후군	알레르기, 연조직염, 권태, 패혈증, 열골 부종, 탈장
심혈관계	저혈압, 사맥, ECG 이상, 심부전	심근경색, 협심증, 심방성세동, 유행성 심부전, 말초 혈관 질환, 상상실성 기외수축, 심상성 기외수축, 심장 비대
소화기계	Y-GT 증가, 위염, 삼킴곤란, 지주염, 위궤양, 지주농양, 복부 팽만감, 간기능 이상, 트림, 식도염, 항문출혈	당뇨
내분비계		백혈구 증가증
혈액 및 림프계	빈혈	고콜레스테롤혈증, 지질불혈증, 저혈당증, 체중증가, 빌리루 빈혈증, BUN 증가, B12 결핍성 빈혈, 악액질, 크레아티닌 증 가, 통풍, 저나트륨증, 저단백혈증, 혈 결핍성 빈혈, AST 증가, ALT 증가
대사 및 영양계	체중감소, 말초부종, 부종, LDH 증가, 알칼리인산분해효소 증가	
근골격계	관절염	관절증, 골 골절, 관절통, 다리 경련, 골다공증, 근육통
신경계	초조, 불안, 진전, 경련, 유주성의 정신 이상, 보행 이상	무관절, 어지러움, 망상, 공이성, 뇌혈관 이상, 타액 분비 증 가, 운동 실조증, 이상행동강, 혈관확장, 뇌출혈, 뇌경색, 뇌 허혈, 치매, 추체외로증상, 대발작경련, 빈신분소, 간성 항진, 운동감소증
호흡기계	인두염, 폐렴, 기침 증가, 기관지염	호흡 곤란, 비염, 천식
피부 및 피부부속기계	발진, 피부 궤양, 가려움	건선, 피부 변색, 대상포진, 건조한 피부, 발한, 두드러기, 수 포성 발진
특수 감각기계		결막염, 녹내장, 시각 이상, 귀통증, 눈물 이상
비노생식기계	요로감염증, 방광염, 혈뇨, 당뇨	질염, 배뇨장애, 빈뇨, 단백뇨

3) 시판후 자발적으로 보고된 이상반응 중 위에 언급되지 않은 이상반응은 다음과 같으며, 이 약과의 관련 여부는 확실 하지 않다. : 복부통증, 초조, 담낭염, 혼란, 경련, 환각, 심장차단(모든 유형), 유행성 빈혈, 간염, 저나트륨혈증, 신장이 원재작용증후군, 채장염 및 발진 ○메만틴염산염 경증에서 중증의 알츠하이머병 환자를 대상으로 실시된 메만틴 제제를 투여한 1,784명의 환자와 위약을 투여한 1,595명의 환자를 포함하는 임상시험에서 전반적인 이상반응 발생률은 위약과 비슷하였으며, 이상반응은 대체로 경미함에서 중 등도의 강도를 보였다. 위약 투여군에 비해 이 약 투여군에서 발생률이 높은 이상반응 중 가장 빈번히 발생한 이상반응 은 어지러움 (Dizziness) (6.3% 대 5.6%), 두통(5.2% 대 3.9%), 변비(4.6% 대 2.6%), 졸림 (3.4% 대 2.2%), 고혈압(4.1% 대 2.8%)이었다. 메만틴 제제 시판 후 임상시험에서 축적된 이상반응은 아래 표와 같다. 같은 빈도군 내에서는 중대한 순으로 이상반응 을 표시하였다. 기관계 분류에 따른 이상반응 발생빈도는 다음과 같이 분류하였다: 매우 흔함(≥1/10), 흔함(≥1/100 에서 <1/10), 흔하지 않음(≥1/1,000 에서 <1/100), 드물(≥1/10,000 에서 <1/1,000), 매우 드물(<1/10,000), 빈도 불명
--

간염과 침습	흔하지 않음	진근감염
면역계 장애	흔함	악물과민반응
	흔함	졸림
정신계 장애	흔하지 않음	혼돈
	흔하지 않음	환각
	알려지지 않음	정신변반응?
	흔함	어지러움(Dizziness)
신경계 장애	흔함	균형장애
	흔하지 않음	결음이상
	매우 드물	발작
심장 장애	흔하지 않음	심부전
	흔함	고혈압
혈관계 장애	흔하지 않음	정맥혈전증/혈전색전증
호흡기계 장애	흔함	호흡곤란
	흔함	변비
소화기계 장애	흔하지 않음	구토
	알려지지 않음	체장염*
간담도계 장애	흔함	간기능검사 수치 상승
	알려지지 않음	간염
	흔함	두통
전신장애 및 투여부위 상태	흔하지 않음	피로

1 환자는 중증 알츠하이머병 환자에서 주로 관찰되었다. 2 시판 후 경험에서 보고된 예외적인 예 알츠하이머병은 우울증, 자살관념, 자살과 관련이 있었으며, 시판 후 경험에서 이러한 사례가 보고되었다.

4. 일반적 주의 이 약은 각 단일제인 도네패질염산염 및 메만틴염산염의 일반적 주의를 포함한다. ○도네패질염산염 (1) 다른 형태의 치매 또는 다른 형태의 기억력 장애(예 : 나이와 연관된 인지기능 저하)에 대한 이 약의 사용은 승인되지 않았다. 알츠하이머병과 다른 유형의 치매를 구분함에 있어 진단의 주의를 요한다. 치료는 알츠하이머 치매의 진단과 치료에 있어 경험있는 의사에 의해 시작되고 감독되어야만 한다. 진단은 인정된 지침(예 : DSM IV, ICD 10)에 따라 이루어져 야 한다. 이 약 치료는 보호자들이 환자의 약을 복용을 정기적으로 관찰할 수 있는 때에만 시작되어야 한다. 유지기 치료는 환자 생존에 치료적 효과가 있는 동안만 계속되어야 한다. 즉, 이 약의 임상적 효과는 정기적으로 재평가되어야 한다. 치료 효과의 증가가 더 이상 나타나지 않을 때 치료중단을 고려하여야 한다. 이 약에 대한 개개인의 반응은 예상할 수 없다. (1) 심혈관계 : 이 약은 플린에스테라제 억제작용으로 미주신경 긴장효과를 가져와 사맥을 일으키고 심장차단(동방결절차단 또는 방실차단), QT구간의 연장, 염전성 심실 빈맥(Torsade de pointes)과 같은 증상을 유발할 수 있다. 특 히, QTc 연장 병력 또는 가족력이 있는 환자, QTc 간격에 영향을 미치는 약물 치료 환자, 심장질환(예, 심근경색, 심장근병증, 심장판막질환, 동부전증후군 또는 심상성부심전도 증상, 심방내 전도장애, 심방상실 절합부 전도장애, 사맥 부정맥)과 전해질 이상(예 : 저칼륨혈증, 저마그네슘혈증)을 가진 환자는 심각한 부정맥으로 진행될 수 있 어 이 약의 사용시 특별한 주의해야 한다. ECG 모니터링이 필요할 수 있다. 심혈관계 질환을 가진 환자들에게서 이 약의 사용으로 실신과 발작이 보고된 바 있다. (2) 소화기계 : 플린에스테라제 억제작용으로 위산을 증가시키거나 소화기관의 운동성을 증가시킬 수 있어 소화궤양 병력이 있거나 비스테로이드성 소염진통제를 투약받고 있는 환자는 그 증상에 대한 모니터링이 필요하다. 이 약 의 임상연구에서 위약에 비해 위궤양 또는 위양관 출혈 증가는 없는 것으로 나타났다. (3) 비뇨기계 : 이 약의 임상시험에서는 나타나지 않았지만, 플린유사작용으로 인해 방광의 배뇨를 방해할 수 있다. (4) 정신신경계 : 플린유사작용으로 선조체에 플린성 신경의 운동을 자극함으로써 추체외로장애증상(파킨슨병이나 파 킨슨증후군과 같은 질환)을 유발 또는 악화시키거나 발작을 일으킬 가능성이 있지만 이러한 발작은 알츠하이머병으 로 인한 것 일 수 있다. (5) 호흡기계 : 플린유사작용으로 기관지 평활근 수축을 증가시키거나 기관지 반비기능을 증가시킴으로 천식 또는 기 관지 질환이나 폐쇄폐질환의 병력을 가지고 있는 환자에게는 주의하여 처방한다. (6) 간기능 장애 : 10명의 만성적 알코올성 간경화 환자 연구에서 이 약의 청소율은 성별 및 연령을 감안한 10명의 건 강한 대상자에 비해 20%가 감소하였다.

2) 이 약은 운전능력과 기계사용능력에 경도에서 중등도의 영향을 미친다. 치매로 인해 운전능력이나 기계사용능력이 떨어질 수 있다. 특히 이 약 투여를 시작하거나 용량을 증가할 때 피로, 어지러움, 근육 경련이 일어날 수 있다. 의사는 주각적으로 이 약을 사용하는 환자의 운전능력이나 복잡한 기계사용 능력을 확인해야 한다. 3) 혈관성 치매 임상시험에서의 사망률: NINDS-AIREN 분류에서 혈관성 치매(VaD)로 의심되거나 가능성이 있는 환자들을 대상으로 3가지의 6개월 임상시험 이 진행되었다. NINDS-AIREN 분류에 따라 순수 혈관성 치매환자를 진단하고 알츠하이머 치매 환자를 제외시켰다. 첫번째 연구에서, 이 약 5 mg군에서의 사망률은 2/198(1.0%), 이 약 10 mg군에서의 사망률은 5/206(2.4%), 위약군에서의 사망률은 7/199(3.5%)였다. 두번째 연구에서, 이 약 5 mg군에서의 사망률은 4/208(1.9%), 이 약 10 mg군에서의 사망률은 3/215(1.4%), 위약군에서의 사망률은 1/193(0.5%)였다. 세번째 연구에서, 이 약 5 mg군에서의 사망률은 11/648(1.7%), 위약군에서의 사망률은 0/326(0%)였다. 세 종류의 혈관성 치매 연구에서 전체 사망률은 이 약 투약군 에서(1.7%) 위약군(1.1%)보다 수치상으로 높았으나, 통계적으로 유의하지는 않았다. 투약군 또는 위약군에서의 주요 사 망 원인은 혈관성 질환을 가진 노령 연구에서 나타날 수 있는 여러 혈관성 원인에 기인하였다. 모든 중대한 혈관성 이 상반응에 대한 분석에서 투약군은 위약군과 발생률이 있어 차이를 보이지 않았다. 알츠하이머 임상 전체 시험군(n=4146) 및 알츠하이머병과 혈관성 치매를 포함한 모든 형태의 치매 임상 시험군(총 n=6888)에 대한 전체 분석에서는 위약군의 사망률이 투약군보다 수치상으로 더 높았다.

4) 마취시 : 플린에스테라제 억제제인 이 약은 마취중 적신발결합된 근이완제의 작용을 극대화시키는 경향이 있다. 5. 상호작용 이 약으로 다른 약물과 상호작용연구는 수행되지 않았다. 이 약은 도네패질염산염과 메만틴염산염 복합제로 각 단일제의 상호작용함을 참고한다. ○도네패질염산염 1) 이 약은 주로 CYP3A4에 의해 대사되므로 부분적으로 CYP2D6가 관여한다. 억제나 유도 정도는 아직까지 알려지지 않 았지만 아래 약물과 병용시 주의해야 한다. (1) CYP3A4 억제제(예 : 이트라코나졸, 에리트로마이신)과 CYP2D6 억제제(예, 퀴니딘, 플루옥세틴)는 이 약의 대사를 방해하고 약효를 증가시킬 수 있다. (2) CYP3A4 및 CYP2D6 유도제(예 : 리팜피신, 페니토인, 카르바마제핀, 텍사메타손, 페노바르비탈, 알코올)는 이 약의 대사를 증가하고 약효를 감소시킬 수 있다. 2) 이 약은 속시메토논 근이완제나 다른 신경근육 차단제의 작용을 강화시킬 수 있다. 3) 플린성약물(예 : 카프로논, 베타네온, 아클루르메드, 니파디시메이트) 또는 아세틸콜린에스테라제 억제제(예 : 암페논, 디스틸린, 피리도스티그민, 네오스티그마인)의 병용투여는 미주신경 자극작용 등 콜린성 작용을 증가시킬 수 있으 므로 병용시 주의해야 한다. 4) 이 약과 항콜린성약물(예 : 아트로핀, 스코폴라민, 트리헥스페니틸, 피로헤파틴, 비베리딘)은 길항작용으로 인해 약효를 감소시킬 수 있다. 5) 이 약은 테오필린, 와르파린, 시메티딘, 디곡신의 대사를 저해하지 않으며, 디곡신이나 시메티딘과의 병용에 이 약의 대사는 영향을 받지 않는다. 6) 심장정동에 영향을 주는 베타차단제와 같은 약물의 병용투여로 상승작용을 일으킬 수 있다. 7) NSAIDs와의 병용은 콜린계 작용으로 위산의 분비를 증가시켜 소화성 궤양을 일으킬 수 있다. 8) 도네패질과 관련하여 QT구간의 연장과 염전성 심실 빈맥(Torsade de pointes) 사례가 보고되었다. QTc 간격을 연장시키는 다른 약물을 병용투여할 경우 주의해야 하며, ECG 모니터링이 필요할 수 있다.

○메만틴염산염 1) 메만틴염산염의 약리학적 효과와 작용기전으로 인하여 다음과 같은 반응이 나타날 수 있다: * 메만틴염산염과 같은 NMDA(N-methyl-D-aspartate) 길항제는 레보도파, 도파민 효능약 및 항콜린성 약물의 효능 과 부작용을 증강시킬 수 있다. * 메만틴염산염은 바르비탈계 약물 및 항정신병 약물의 효능을 감소시킬 수 있다. * 단토렌이나 바클로펜과 같은 골격근이완제와 병용투여하면 이들 약물의 효능에 영향을 미칠 수 있으므로 용량조
--

절이 필요하다. • 아만티딘, 케타린 또는 메크스토메토르판과 같은 NMDA(N-methyl-D-aspartate) 길항제와 병용투여하면 약물독 성 정신병과 같은 중추신경계 부작용을 유발할 수 있으므로 병용투여하지 않는다. • 메만틴염산염과 페니토인과의 병용투여시 위험에 대한 중례 보고가 있었다. • 시메티딘, 라니티딘, 프로카인아미드, 퀴니딘, 퀴닌 및 니코틴 등은 이 약과 동일한 배설 경로를 가지므로 병용투여 하면 이 약물의 혈중 농도를 상승시킬 수 있다. • 메만틴염산염은 하이드로클로로티아지드(hydrochlorothiazide)의 혈중 농도를 감소시킬 수 있다. • 시판 후 경험에서 와파린과 함께 투여 시 INR (international normalized ratio) 증가가 예외적으로 보고되었다. 이 약과의 인과관계는 성립되지 않았으나, 경구용 항응고제와 병용 시 프로트롬빈 시간 또는 INR의 모니터링이 필요 하다. 2) 건강한 젊은 피험자를 대상으로 한 단회투여 약동학 연구에서 memantine과 glyburide/metformin 또는 donepezil과 의 약물상호작용은 나타나지 않았다. 3) 건강한 젊은 피험자를 대상으로 한 임상시험에서 memantine은 galantamine의 약동학에 영향을 미치지 않았다. 4) 메만틴염산염은 실험실 조건(in vitro)에서 CYP 1A2, 2A6, 2C9, 2D6, 2E1, 3A, 플라빈 함유 모노옥시게나제, 에폭사 이드 하이드롤라제 및 황산화반응을 저해하지 않았다.

6. 일부 및 수유부에 대한 투여 이 약으로 일부 및 수유부에 대한 연구는 수행되지 않았다. 이 약은 도네패질염산염과 메만틴염산염 각 단일제 일부 및 수 유부에 대한 투여함을 참고한다. ○도네패질염산염 1) 일부 : 임신한 여성에 대한 이 약의 임상 자료가 없으므로 꼭 필요한 경우가 아니라면 임신중 이 약을 사용해서는 안 된다. 동물실험에서 기형발생을 일으키지 않았지만 어떤 세기의 생존율과 사산율에 영향을 주었다. 임부에 대한 잠재적인 위험은 알려지지 않았다. 2) 수유부 : 이 약은 젖트의 모유에 이행되었다. 이 약의 모유로의 이행여부는 알려져 있지 않다. 수유기 여성에 대한 연 구 결과는 없으므로 수유부에게 이 약을 사용해서는 안되며, 반드시 투여되어야 할 경우에는 수유를 치료기동안 중단 하여야 한다. ○메만틴염산염 1) 일부 임부를 대상으로 한 연구 없으므로 임상 자료는 없으나 동물실험에서 태자의 성장을 감소하는 위험 가능성이 나타 났다. 따라서 일부 또는 임신 가능성이 있는 부인에게는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여해야 한다. 2) 수유부 이 약의 모유로의 이행 여부는 밝혀지지 않았으나 이 약의 지용성을 고려하면 가능성이 있다. 따라서 이 약을 투여하 는 경우, 수유를 중단하여야 한다.

7. 소아에 대한 투여 소아 및 18세 이하 청소년에 대하여는 이 약에 대한 안전성 및 유효성이 확립되어 있지 않다.(소아에서의 사용경험이 없 다.) 8. 과량투여시의 처치 이 약의 과량투여에 대한 정보는 없다. 이 약은 도네패질염산염과 메만틴염산염으로 각 단일제 과량투여시에 대한 처치항 을 참고한다. ○도네패질염산염 1) 증상 : 플린에스테라제 억제제의 과량투여로 중증의 구역, 구토, 타액분비과다, 발한, 사맥, 저혈압, 호흡억제, 식욕, 경 력 등의 콜린성 작용과 관련된 위험이 나타날 수 있다. 근육 쇠약증상이 일어날 수 있으며 호흡기에 근육이 이완되어 사망할 수도 있다. 마우스와 랫드의 동물실험에서 치사용량의 중앙값은 45 mg/kg과 32 mg/kg로 각각 사람에 대한 최대용량(10 mg/1 일)의 225배와 160배였다. 동물실험에서의 용량 대비 콜린성 자극증상은 자발적 행동의 감소, 얕은 호흡, 어지러움, 비틀거리 는 걸음, 눈물, 간대성 경련, 호흡감소, 타액분비, 동공수축, 성욕수성억제, 체표온도 저하 등이었다. 2) 처치 : 과량투여하였을 때 일반적인 방법으로 처치한다. 3차항콜린제(예 : 아트로핀환산염)를 이 약의 과량투여에 대 한 해독제로 사용 할 수 있다. 아트로핀의 경우 초기용량 1.0~2.0 mg로 정맥투여 한 후 임상 반응에 따라 용량을 더 가시킴이 다. 단, 4차항콜린제와 콜린작용(예 : 글리코피롤레이트)을 병용투여하였을 때 혈압과 심박수에 있어서 비 전형적인 반응 발현에 대한 보고가 있었다. 도네패질염산염과 그 대사물질이 투석(혈액투석, 복막투석, 혈액여과)으로 제거되는지 여부는 알려져 있지 않다.
--

○메만틴염산염 임상시험이나 시판후 경험에서 과량 투여에 대한 경험은 매우 제한적이다. 1) 증상: 비교적 과량 (200mg/일, 105mg/일, 각각 3일간) 복용 시 피로감, 무력감 그리고/또는 설사 등의 증상 또는 무증상이 나타났다. 140mg 이하 또는 알려지지 않은 용량의 과량에서는 중추신경계 증상 (혼돈, 졸음, 울림, 어지러움 (Vertigo), 초조, 공격성, 환각, 절음장애) 그리고/또는 소화기계 증상(구토, 설사)이 나타났다. 가장 심한 과량 투여 예로는, 이 약을 2,000mg까지 과량 복용한 환자에서 중추신경계 증상 (10일간 혼수상태, 이후 에 경보임 및 초조)이 나타났다. 이 환자는 대증요법과 혈장분리나혈술 치료 후 영구적인 후유증 없이 회복되었다. 다른 과량 투여 예로, 이 약을 400mg까지 과량 복용한 환자에서 안절부절, 정신병, 환시, 경련, 졸림, 혼미, 무력감과 같은 중추신경계 증상이 나타났으며, 이 환자 또한 회복되었다. 2) 치료: 과량 복용 시의 처치는 대증요법을 실시한다. 특별한 해독제는 없으며, 활성성분 약물을 제거하기 위하여 위세척, 약 용탄 투여 (침재적인 장-간 세운환 방지), 요산성화, 강제이뇨 등의 일반적인 방법을 적절하게 사용한다. 일반적용 추중신경계 과다자극(overstimulation) 증상과 징후를 보이는 경우에는 주의 깊은 대증 임상 치료를 고려해 야 한다. 9. 운전 및 기계 조작에는 대한 영향 이 약의 투여 대상인 중등도에서 중증의 알츠하이머병 환자는 일반적으로 운전 및 기계 조작는 장애 상태이다. 더욱이 이 약은 환자의 반응성에 영향을 미칠 수 있으므로 이러한 외래 환자의 경우 운전 및 기계 조작시 특별한 주의의도록 경고해 야 한다. 10. 임상검사치에의 영향 임상시험결과 실험실 수치에서 주목할 만한 이상은 없었으나 이 약의 투여로 인해 근육CK(CPK), LDH, AST, ALT, γ-GPT, ALP, BUN, 총콜레스테롤, 중성지방, 아밀라아제, 소변아밀라아제의 농도가 약간 증가할 수 있다.

11. 보관 및 취급상의 주의사항 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다. 2) 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고원인이 되거나 품질 유지면에서 바람직하지 않으므로 이를 주의한다. 【저장방법】 기밀
--