

마그네코어TM

TM

연질
캡슐

MAGNECORETM Softcap.

■ 원료약품 및 분량 : 1캡슐 중

유효성분 : 산화마그네슘(KP)	350 mg
(마그네슘으로서 211.09 mg)	
글리세로인산마그네슘(EP)	50 mg
(마그네슘으로서 6.25 mg)	
아스파르트산마그네슘수화물(DAB)	50 mg
(마그네슘으로서 3.74 mg)	
토코페롤아세테이트(KP)	200 mg
(비타민E로서 200 IU)	
벤포티아민(KP)	69 mg
(티아민염산염으로서 49.89 mg)	
피리독신염산염(KP)	25 mg
시아노코발라민(KP)	0.5 mg
첨가제(동물유래성분) : 속신산셀라틴(돼지/토끼)	
기타첨가제 : 농글리세린, 레시틴, 산화티탄, 아자경화유, 치자청색소, 카카오색소, 콩기름, 향남	

■ 성상 : 흰색 또는 알칼색의 내용물을 함유한 알칼색의 장방형 연질캡슐

● 효능·효과

- 다음 경우의 비타민 E, B₁, B₆의 보급
 - 육체피로, 임신·수유기, 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하시, 노년기
 - 이 약에 함유된 티아민 등의 효능·효과는 다음과 같다.
 - 티아민E(토코페롤아세테이트)
 - 말초혈행장애 및 갱년기시 다음 증상의 완화: 어깨·목결림, 수족(손발)저림·수족냉증(손발이 차가움)
 - 티아민B₁(벤포티아민)
 - 다음 증상의 완화: 신경통, 근육통, 관절통(요(허리)통), 어깨결림 등)
 - 각기, 눈의 피로
 - 티아민B₆(피리독신염산염)
 - 다음 증상의 완화: 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염
- 마그네슘결핍으로 인한 근육경련

■ 용법·용량

만 12세 이상 및 성인: 1일 2회, 1회 1캡슐 복용한다.

■ 사용상의 주의사항

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
 - 1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
 - 2) 만 12개월 미만의 젖먹이
 - 3) 심한 증상의 신부전 환자
 - 4) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
 - 5) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자
- 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.
 - 1) 인산염, 갈슘염, 경구(먹는)용 테트라사이클린계 제제, 제산제
 - 2) 레보도파
- 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
 - 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
 - 2) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
 - ① 태어난 지 3주 이내 마우스 및 랫트에 아스파르트산으로 250 mg/kg 이상을 투여하면, 시상하부 공생핵에 병리조직학적 변화를 확인했다는 보고가 있으므로 미숙아, 산생아, 젖먹이에게는 투여하지 않은 것이 바람직하다.
 - 3) 심장·순환기계기능 장애 환자
 - 4) 신장(콩팥)장애 환자
 - 5) 저단백혈증 환자
 - 6) 임부
 - 7) 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 췌장염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자
- 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.
 - 1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우
 - 위부불쾌감, 설사, 변비, 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 구역, 구토, 묽은 변
 - 2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있다.
 - 3) 에스트로겐을 포함한 경구(먹는)용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전(혈관 막힘)성 소인이 있는 환자가 티아민 E를 복용할 경우 혈전(혈관 막힘)증의 위험이 증가될 수 있다.
 - 4) 피리독신을 1일 500 mg ~ 2 g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy: 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있다.
 - 5) 폴산이 부족한 환자에게 티아민 B₁₂를 1일 10 µg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있다.
 - 6) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈심부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다.
 - 7) 항알도스테론제, 트리암테네과 병용(함께 복용)투여시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것

- 8) 우발적으로 과량복용 한 경우
- 9) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우
5. 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항
 - 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것
 - 2) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피할 것
 - 3) 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장한다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절한다. 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 한다.
6. 저장상의 주의사항
 - 1) 어린이의 손에 닿지 않는 장소에 보관할 것
 - 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에(밀폐하여) 보관할 것
 - 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것
- 저장방법: 기밀용기, 실온(1~30°C) 보관
- 포장단위: 60 캡슐/상자(10캡슐/PTP X 6), 120 캡슐/상자((10캡슐/PTP X 6) X 2)
- 제조원: 삼진제약(주) - 경기도 화성시 만세구 향남읍 제약공단1길 52 (제조의뢰자)
 - (주)알피바이오 - 경기도 화성시 만세구 마도면 청원산단5길 60 (1층, 2층 일부, 3층 일부) (제조자)

※ 본 첨부문서 문안 개정일자(2026년 03월 23일) 이후 변경된 내용은 홈페이지 (www.samjin-pharm.co.kr) 또는 소비자상담실(수신자부담 전화 080-082-1234)에서 확인하실 수 있습니다.
 ※ 의약품 사용 후 부작용 발생 시 한국의약품안전관리원에 피해구제 신청을 할 수 있습니다.
 ※ 사용기한이 경과되었거나 변질·변패·오염되었거나 손상된 의약품은 약국등의 개설자에 한하여 교환하여 드립니다.
 ※ 사용기한이 지난 의약품을 사용하지 않도록 합니다.
 ※ 의사·약사의 지시에 따라 사용하십시오.
 ※ 제품의 사용기한은 제품포장에 따라 표기되어 있습니다.
 ※ 충분한 양의 물과 함께 복용하십시오.
 ※ 포장을 개봉하여 복용 시 가품 캡슐에 포장물이 같이 따라오는 경우가 있으니, 복용 시 캡슐에 포장물이 있는지 꼭 확인하시고 복용하시기 바랍니다.

SAMJIN 삼진제약(주)