

몸속부터 채워지는 활력에너지

맥스케어
메가파워정

【성분·함량】 1정 중

유효성분 : 벤포티아민(KP) (티아민염산염으로서 72.31mg)	100mg
푸로셀티아민(KP)	10mg
리보플라빈(KP)	100mg
니코틴아미드(KP)	100mg
판토틐산칼슘(KP)	100mg
피리독신염산염(KP)	100mg
D-비오틐(USP)	0.25mg
폴산(KP)	0.2mg
시아노코발린 1000배산(KP) (시아노코발라민으로서 30μg)	30mg
제피타스코르빈산(별규) (아스코르빈산으로서 100.01mg)	103.1mg
토코페롤아세테이트 2배산(KP) (비타민 E로서 10IU)	20mg
산화아연(KP) (아연으로서 15.02mg)	18.7mg
셀레늄함유건조효모(KP) (셀레늄으로서 25μg)	46.3mg
우르소데옥시콜산(KP)	15.0mg
이노시톨(KP)	100mg
콜린타르타르산염(별규)	100mg

첨가제 : 경질무수규산, 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 크로스카르멜로오스나트륨, 탭실드주황색(9901714), 탭실드흰색(91W243), 폴리에틸렌글리콜6000, 히드록시프로필셀룰로오스

【성 상】 주황색의 타원형 필름코팅정

【화평 · 화과】

1. 다음 경우의 비타민 E, B₁, B₂, B₆, C의 보급

- 육체피로
- 임신 · 수유기
- 병중 · 병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력 저하 시
- 노년기
- 이 밖에 함유된 비타민 등의 효능 · 효과는 다음과 같다.
 - 다음 증상의 완화: 신경통, 근육통, 관절통(요통, 어깨결림 등), 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염
 - 각기
 - 눈의 피로

2. 아연의 보급

【용법·용량】 만 12세 이상 및 성인: 1일 1회, 1회 1정 복용

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.

- (1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
(2) 만12개월 미만의 젖먹이

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 마십시오.

- (1) 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제 (2) 레보도파

3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.

- (1) 의사의 치료를 받고 있는 환자 (2) 고옥살산노증 환자(hyperoxaluria: 요중에 과량의 옥살염이 배설되는 상태)
(3) 입부 및 입심하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아 (4) 소화성궤양, 만성궤양성대장염,
국한성대장염 등의 위장질환 환자 (5) 심장·순환기계기능 장애 환자 (6) 신장장애 환자 (7) 저단백혈증 환자
(8) 통풍환자 또는 신장결석이 있는 환자

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오.

- (1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우
 위부불쾌감, 설사, 변비, 발진, 발적, 구역, 구수, 또는 변, 구내염(입안염), 피부염, 딸 - 호흡 시 악취, 탈모, 조금금, 위장관장애, 소화장애, 상복부부종, 저혈압, 폐부종
- (2) 이 약의 투여에 의하여 생기가 예전보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있습니다.
- (3) 에스트로겐을 포함한 경우 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전성 소인이 있는 환자가 비타민 D를 복용할 경우 혈전증의 위험이 증가될 수 있습니다.
- (4) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있습니다.
- (5) 피아독을 1일 500mg ~ 20의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy: 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있습니다.
- (6) 흡산이 투여한 환자에게 비타민 B₁₂를 1일 100g 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있습니다.
- (7) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키거나 구내염(포도당내성) 손상(glucose tolerance impairment: 신체의 포도당을 대하는 능력 장애), 고요산혈증(hyperuricemia, 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있습니다.
- (8) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈성부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있습니다.
- (9) 할랄도소나프렌, 트리암테렌과 병용투여 시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의해야 합니다.
- (10) 우발적으로 과량 복용한 경우
- (11) 1개월 정도 복용하더라도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

- (1) 정해진 용법·용량을 잘 지켜주시기 바랍니다.
- (2) 각종 요검사 시에 혈당의 검출을 방해할 수 있습니다.
- (3) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있습니다.
- (4) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피하시기 바랍니다.

6. 저장상의 주의사항

- (1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- (2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관하십시오.
- (3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

【저장방법】 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

【사용기한】 외부용기에 표기

【포장단위】 60정/병, 120정/상자(60정/병×2)

- * 본 약품은 엄격한 품질관리를 위한 제품입니다. 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변태 또는
오손된 제품도 구입처를 통해 교환하여 드립니다.
- * 본 제품은 공경거래위원회와 고시 소비자분쟁해결기준에 의거, 정당한 소비자 피해에 대해 보상해드립니다.
- * 약품들을 사용하기 전에 첨부문서 중의 각개 일러야 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.
- * 본 약품의 작성(개별)일련번호 이후 변경된 내용은 아래 제품, 품목 및 품명에는 의약품모판전지
의약품모판전지 의약품모판전지시스템(<http://nedrug.mfds.go.kr/23>)을 통하여 확인할 수 있습니다.
- * 부작용, 사고 및 피해구제 신청: 한국약품모판전지연립(1644-6223, 14-3330)

【제조의뢰 · 판매】  신일제약(주)

충청북도 충주시 앙성면 복상골길 28

【제조사】 (주)한풍제약

전북특별자치도 완주군 봉동읍 완주산단6로 301, 봉동로 705

