

일반의약품

500정

뉴아제 정

건위소화제

 **대한뉴팜**

[원료약품 및 분량] 1정 중

•유효성분:

시메티콘(KP) 30mg, 우르소데옥시콜산(KP) 10mg, 디아스타제·프로테아제·셀룰라제(별규) 20mg(전분당화력 250단위/일 이상, 전분호정화력 210단위/일 이상), 판크레아틴 장용과립(별규) 40mg(단백소화력 1500 단위/일 이상, 지방소화력 100단위/일 이상)

•첨가제(타르색소) : 청색1호, 황색4호

•기타첨가제 : 미결정셀룰로오스, 산화티탄, 스테아르산마그네슘, 이산화규소, 전분글리콜산나트륨, 탭크, 포비돈, 폴리에틸렌글리콜6000, 히프로멜로오스

[성상] 녹색의 원형 필름코팅정

[효능·효과] 소화불량, 식욕감퇴(식욕부진), 과식, 체함, 소화촉진, 소화불량으로 인한 위부팽만감

[용법·용량] 만 15세 이상 : 1회 2정, 1일 3회 식후에 복용한다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

1) 만 7세 이하의 어린이

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

1) 본인 또는 가족이 알레르기 체질인 사람

2) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성

3) 다른 약물을 복용하고 있는 사람

4) 이 약은 황색4호(타르트라진)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.

3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

2주 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우

4. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.

5. 저장상의 주의사항

1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.

2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에(밀폐하여) 보관할 것.

3) 오용(잘못사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

[포장단위] 500정/병

[저장방법] 밀폐용기, 실온보관(1~30°C)

[제조외회자] 대한뉴팜(주) / 경기도 화성시 만세구 향남읍 제약공단1길 66

[제조자] (주)노바엠헬스케어/ 경상북도 경산시 하양읍 지식산업4로 16-53

제조번호 :

사용기한 :

조제용

3011800-000

* 약은 어린이의 손에 닿지 않도록 보관해야 합니다.
* 본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입 시 유효기한 또는 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국, 병의원, 도매상을 통하여 교환하여 드립니다. 기타 자세한 문의사항은 당사 개발팀으로 문의하여 주시기 바랍니다.
(전화 : 031-778-2600)
* 자세한 품목허가 또는 신고사항은 의약품안전나라 (<https://nedrug.mfds.go.kr>)를 통하여 확인하시기 바랍니다.
* 의약품 부작용 발생 시 한국의약품안전관리원에 피해구제를 신청할 수 있습니다.

개정년월일 : 2026. 04. 27

HDPE
투명 : LDPE