

엄마 건강을 위한 선택! 하루 1번

헤모엠정

Fe

철 결핍성 빈혈의 예방 및 치료

철분, 판토텐산칼슘, 폴산 함유

일반의약품 30정

일반의약품 정보

이 약을 사용하기 전 반드시 사용상의 주의사항을 주의 깊게 읽어 주시길 바랍니다.

[원료약품 및 그 분량] 1정(520.0mg) 중

· 유효성분

폴리말토오스수산화제이철착염(KP) 125mg
(철로서 35mg), 판토텐산칼슘(KP) 100mg,
폴산(KP) 0.5mg

· 기타첨가제

규산칼슘, D-만니톨, 미결정셀룰로오스, 스테아르산, 스테아릴푸마르산나트륨, 옥수수전분, 카르복시메틸셀룰로오스칼슘, 코포비돈, 콜로이드성이산화규소, 탭탈드칼색(11B1572)

[성상]

적갈색의 장방형 필름코팅정제

[효능 · 효과]

철 결핍성 빈혈의 예방 및 치료

[용법 · 용량]

만 8세 이상 어린이 및 성인 :
1일 1회 1정 복용한다.

[포장단위] 30 정/상자(10정/PTPX3) **[저장방법]** 기밀용기, 실온보관(1-30℃)

[제조·의뢰자] 신신제약(주), 세종특별자치시 소정면 소정산단동로 9

[제조자] (주)마더스제약, 전북특별자치도 익산시 삼기면 산단오름길 38 마더스제약 제2공장

[사용상의 주의사항]

1. 경고 (1) 철 함유제제는 만 6세 이하의 어린이가 사고로 과량 복용하였을 경우 중독성 사망을 일으킬 수 있으므로 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것. (1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자 (2) 만 12개월 미만의 젖먹이 (3) 혈색소증(철대사 이상으로 철이 간장, 췌장(이자)에 침착하는 질환), 헤모시데린침착증, 비철결핍성 빈혈

3. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것. (1) 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제

4. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것. (1) 만 1세 미만의 젖먹이 (2) 의사의 치료를 받고 있는 환자 (3) 소화성궤양, 만성궤양성대장염, 국한성대장염 등의 위장질환 환자 (4) 심장·순환기계기능 장애 환자 (5) 신장장애 환자 (6) 저단백혈증 환자

5. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치료 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것. (1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우: 두드러기, 가려움, 광선과민반응, 복부·위통증, 경련, 구토, 설사, 열, 혼수 (2) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 율혈심부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다. (3) 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용투여시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것. (4) 우발적으로 과량복용한 경우 (5) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

6. 기타 이 약의 복용 시 주의사항 (1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것. (2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도·감독 하에 투여할 것. (3) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용 중, 복용전후에는 피할 것.

7. 저장상의 주의사항 (1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것. (2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관할 것. (3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

첨부문서 작성일자 : 2026.06.25

※ 부작용 보고 및 피해구제 신청 : 한국의약품안전관리원(1644-6223)

※ 본 제품의 자세한 허가사항은 의약품안전나라 의약품통합정보시스템(<http://nedrug.mfds.go.kr>)을 참조하시기 바랍니다.

※ 구입 시 사용기한이 경과되었거나, 유통과정 중 변질·변패·오염되거나 손상된 제품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.