

※ 의약품을 사용하시기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽으시고, 의약품과 함께 보관하십시오.

Aminoba 아미노바 정 [니코틴산아미드]

일반의약품
KGMP 적격업체

【유효성분 및 그 분량】 1정 중

- ▶ 유효성분 : 니코틴산아미드(KP) 500mg
- ▶ 첨가제(타르색소) : 황색203호, 황색5호, 청색2호
- ▶ 기타첨가제 : 이산화규소, 미결정셀룰로오스, 크로스카르멜로오스나트륨, 라우릴황산나트륨, 전분글리콜산나트륨, 포비돈, 스테아르산마그네슘, 히프로멜로오스, 폴리에틸렌글리콜6000, 탭실드주황색(2901491)

【성상】 주황색의 타원형 필름코팅정

【효능·효과】 니코틴산아미드 결핍의 치료

【용법·용량】 성인 1회 1정을 물과 함께 복용한다.

【사용상의 주의사항】

- ① 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것
(1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
- ② 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 약사와 상의할 것
(1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
(2) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성(임상적 경험이 없기 때문에, 니코틴산아미드 결핍이 명확히 확인된 경우를 제외하고는 복용을 권장하지 않는다)
(3) 수유부(수유 중에는 복용을 권장하지 않는다)
(4) 이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.
- ③ 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것
(1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우 : 흉조, 가려움증
(2) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성 손상 (glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대사하는 능력장애), 고요산혈증(hyperurisemia : 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있다.



- (3) 우발적으로 과량 복용한 경우
- (4) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

④ 기타 이 약의 복용시 주의사항

- (1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것
- (2) 여러 약물 간 발생할 수 있는 상호작용을 방지하기 위해, 처방중인 다른 치료에 대해 의사나 약사에게 반드시 알려야 한다.

⑤ 저장상의 주의사항

- (1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것
- (2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 뚜껑을 꼭 닫아 보관 할 것
- (3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

【저장방법】 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

【사용기간】 제조일로부터 36개월

【포장단위】 100정/병

【취급상의 주의사항】

- ※ 구입 시 사용(유효)기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오염되거나 손상된 의약품은 약국개설자 및 의약품판매업자에게만 바꾸실 수 있습니다.
- ※ 이 첨부문서 개정일자(2026년 4월 17일) 이후 변경된 내용은 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템 (<https://nedrug.mfds.go.kr>)의 의약품검색에서 확인할 수 있습니다.
- ※ 본 제품 사용으로 인한 부작용 피해구제 신청은 한국약품안전관리원(T.14-3330(상담) 또는 1644-6223 (신고 및 상담))에서 할 수 있습니다.
- ※ 사용(유효)기한이 지난 의약품은 사용하지 마십시오.
- ☎ 소비자상담실 02-6121-8000

【제조자】 성원애드코제약㈜ 경기도 김포시 양촌읍 김포대로 1644번길 54

【제조자】 (주)노바엠헬스케어 경상북도 경산시 하양읍 지식산업4로 16-53

【판매자】 (주)엘비아브노바 서울특별시 영등포구 당산로41길 11, 301호, 302호 (당산동4가, 에스케이 브이1 센터)