

종합감기약

몸살 | 발열 | 코감기 | 목감기

【원료약품 및 그 분량】 1캡슐(700mg) 중

- 유효성분 :
 - 이부프로펜(KP) 75mg
 - 클로르페니라민말레산염(KP) 1.25mg
 - DL-메틸에페드린염산염(KP) 12.5mg
 - 슈도에페드린염산염(USP) 15mg
 - 맥스트레모도판브롬화수소산염수화물(KP) 8mg
 - 구아이페네신(KP) 41.5mg
- 첨가제(동물유래성분) : 젤라틴(소, 가축)
- 기타 첨가제 : 폴리에틸렌글리콜400, 정제수, 수산화칼륨, 프로필렌글리콜, 포비돈, 부틸레 이터드히드록시메틸루틴, 부틸알수용도소르비톨, 에틸알닐린, 락색소

【성상】

미향색 내지 연한 적색의 투명한 내용물을 함유한 적색 투명의 타원형 연질캡슐

【효능효과】

감기의 제증상(여러감기)(코물, 코막힘, 재채기, 인후(목구멍)통, 기침, 가래, 오한(춥고 떨리는 증상), 발열, 두통, 관절염, 근육통)의 완화

【용법용량】

1. 만 15세 이상 및 성인: 1일 3회, 1회 2캡슐 식후 30분에 복용
2. 만 7세 초과-만 15세 미만: 1일 3회, 1회 1캡슐 식후 30분에 복용

【사용상의 주의사항】

1. 경고

1) 슈도에페드린 함유 제제 복용 시 급성 전신성 발진성 농포증(AGEP)과 같은 중증 피부 이상반응이 나타날 수 있다. 발열, 흉만, 다수의 작은 농포와 같은 증상이 관찰될 경우 이 약의 복용을 중단하고 의사 또는 약사의 상의해야 한다.

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

- 1) 이 약 및 이 약의 구성성분에 대한 과민반응 및 그 병력이 있는 사람
- 2) 이 약 및 이 약의 구성성분, 다른 해열진통제, 감기약 복용 시 전신성 일으킨 적이 있는 사람
- 3) 만 3개월 미만의 영아
- 4) MAO억제제(항우울제, 항정신병제, 강정조절제, 항파킨슨제 등)를 복용하고 있거나 복용을 중단한 후 2주 이내의 사람
- 5) 중증 또는 조절되지 않는 고혈압 환자
- 6) 중증 급성 또는 만성 신장질환/신부전 환자

3. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.

진해(기침을 그치게 함)거담제(가래약), 다른 감기약, 해열진통제, 진정제, 항히스타민제를 함유하는 내복약(비염(코염)용 경구제, 열미약, 알레르기용약)

4. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의 할 것.

- 1) 수두 또는 인플루엔자에 감염되어 있거나 또는 의심되는 영아 및 만 15세 미만의 어린이 (구역이나 구토를 수반하는 행동과 변화가 있다면, 드물지만 심각한 질병인 레이중후군의 초기 증상일 수 있으므로 의사와 상의할 것.)
- 2) 슈도에페드린 성분과 관련하여 허혈성 심장병의 증상(급격한 복통, 직격 찔림 등)이 발현 될 경우
- 3) 본인, 양친 또는 형제 등이 두드러기, 접촉성피부염, 기관지천식, 알레르기성비염, 편두통, 음식물 알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람
- 4) 지금까지 약에 의해 알레르기 증상(예: 발열, 발진, 관절염, 천식, 가려움증 등)을 일으킨 적이 있는 사람
- 5) 간장질환, 신장질환, 심장질환, 갑상선질환, 당뇨병, 고혈압, 녹내장(예: 눈의 통증, 눈이 침침함 등), 배뇨장애 등이 있는 사람, 고령자, 몸이 약한 사람 또는 고령이 있는 사람
- 6) 속쓰림, 위부불쾌감, 위통과 같은 위장문제가 지속 혹은 재발되거나 재발, 출혈문제를 가지 고 있는 사람
- 7) 구토와 설사로 많은 수분을 손실하거나 수분을 흡수하지 않는 사람 또는 이뇨제를 복용하 는 사람
- 8) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부 (임신 30주 이후 살리실산나트륨, 살리실아미드, 아스피린, 아스피린알루미늄, 살리실산칼슘, 이부프로펜 성분 함유 제제의 투여가 권고되지 않는다)
- 9) 의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람(당뇨약, 통풍약, 관절염약, 항응고제, 스테로이드 등 다른 약물을 투여 받고 있는 사람)
- 10) 다음과 같은 기침이 있는 사람

흡연, 천식, 만성 기관지염, 폐기종, 과도한 가래가 동반되는 기침, 1주 이상 지속 또는 재발 되는 기침, 만성 기침, 발열·발진이나 지속적인 두통이 동반되는 기침

5. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

- 1) 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우
발진·발적, 가려움, 구역·구토, 식욕부진, 변비, 위통, 소화불조, 위부불쾌감, 부종, 배뇨 곤란, 목아름(지속적이거나 심한), 어지러움, 불안, 떨림, 불면
- 2) 이 약의 복용에 의해 드물게 아래의 중증(심한 증상) 증상이 나타난 경우
① 속(아나필락시스): 복용 후 바로 두드러기, 부종, 가슴답답함 등과 함께 안색이 창백하고, 손발이 차고, 식은땀, 숨쉬기 곤란함 등이 나타날 수 있다.
② 피부점막만종후군(스티븐스-존슨증후군), 중독성표피괴사증후군(리절증후군): 고열을 동반하고, 발진·발적(중열되어 붉어짐), 화상과 같이 물집이 생기는 등의 심한 증상이 전신피부, 입이나 눈점막에 나타날 수 있다.
③ 천식
④ 가역적 후회 병증 증후군 및 가역적 뇌혈관 수축 증후군: 갑작스러운 심한 두통, 변개 두통, 구역, 구토, 혼돈, 발작, 시각 장애 등이 발현될 수 있다.
⑤ 심장: 코니스 증후군(반도불령)
- 3) 5~6회 복용하여도 증상이 좋아지지 않을 경우

6. 소아에 대한 투여

만 2세 미만에게 투여하지 않는다. 다만, 꼭 필요한 경우 의사의 진료를 받는다.

7. 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
- 2) 장기간 계속 복용하지 말 것.
- 3) 어린이에게 복용시킬 경우에는 보호자의 지도 감독하에 복용시킬 것.
- 4) 복용 시에는 음주하지 말 것.
- 5) 복용하는 동안 졸음이 오는 경우가 있으므로 자동차 운전 또는 기계류의 운전 조작을 피할 것.
- 6) 이 약 투여 환자에서 코니스 증후군 사례가 보고되었다. 코니스 증후군은 관상동맥 수축 과 관련이 있는 알레르기 또는 과민반응 후 발생하는 심혈관계 증상으로 심근경색을 초래 할 수 있다.

8. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 장소에 보관할 것.
- 2) 직사광선을 피하고 빛을 투할 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에(밀폐하여) 보관할 것.
- 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30°C) 보관

【사용기간】 제조일로부터 36개월

【포장단위】 10캡슐/상자(10캡슐/PTP x 1)

【제조자】 ㈜서흥 / 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명로 61

【제조외국】 씨아이제이제약 주식회사 / 경기도 부천시 원미구 정주로 14번길 65

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 위한 제품이며, 공정거래 위원회 고시 소비자 분쟁해결 기준에 의거 보상받을 수 있습니다. 만약 구입 시 사용(유효)기한이 지났거나 변질, 또는 오염되거나 손상된 제품이 발견된 경우에는 구입처를 통하여 교환해드립니다.

※ 부작용 보고 및 피해구제 신청: 한국약품안전관리원(1644-6223, 14-3330)
※ 본 의약품에 대한 자세한 허가사항은 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템 (<https://nedrug.mfds.go.kr>)을 참고하시기 바랍니다.

※ 첨부문서를 주의 깊게 읽고, 의약품과 함께 보관하십시오.

※ 소비자 상담실(전화): 032-675-5561

첨부문서 작성일: 2026. 05. 13