

트리아제캡슐

■ 원료약품 및 분량 1캡슐 중

- 유효성분 : 디메티콘(EP) 15밀리그램, 사카로마이세스보올라르디균(별규) 10밀리그램(사카로마이세스보올라르디균(으)로서 1.8×10^8 CFU), 셀룰라제(KP) 10밀리그램(섬유소당화력으로서 36 단위/일), 우르소데옥시콜산(KP) 5밀리그램, 판크레아틴(EP) 10밀리그램(전분당화력 250 단위/일 이상, 단백소화력 1,500 단위/일 이상, 지방소화력 100 단위/일 이상)
- 첨가제(동물유래성분) : 판크레아틴(돼지, 돼지, 유당수화물(소, 우유), 캡슐(소, 돼지)
- 첨가제(타르색소) : 황색4호, 황색5호
- 기타첨가제 : 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 전분글리콜산나트륨, 캡슐, 콜로이드성이산화규소, 히드록시프로필셀룰로오스

■ 성상

흰색 분말이 들어있는 상·하부 주황색 캡슐

■ 효능·효과

소화불량, 식욕감퇴(식욕부진), 과식, 체함, 소화촉진, 소화불량으로 인한 위부팽만감, 정장, 변비, 묽은 변, 복부 팽만감, 장내이상발효

■ 용법·용량

만 15세 이상 및 성인 : 1일 3회, 1회 1캡슐

■ 사용상의 주의사항

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

- 1) 만 7세 이하의 어린이
- 2) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스흡수장애(glucose-galactosemalabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

- 1) 본인 또는 가족이 알레르기 체질인 사람
- 2) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성
- 3) 다른 약물을 복용하고 있는 사람

- 4) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 5) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성
- 6) 이 약은 황색4호(타르트라진)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.
- 7) 이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.

3. 다음과 같은 사람(경우) 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 이 첨부문서를 소지할 것.

- 1) 2주(건위제, 소화제 중 효모·생균제제 및 생약만으로 된 제제는 2주를 1개월로 바꿀 수 있다) 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우

4. 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.

5. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에(밀폐하여) 보관할 것
- 3) 오용(잘못사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것

■ 저장방법·사용기간 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관, 제조일로부터 36개월

■ 포장단위 300 캡슐/병

■ 제조의뢰자·판매원 한국프라임제약(주) - 전북특별자치도 완주군 봉동읍 완주산단9로 100

■ 제조자 메디스제약(주) - 전북특별자치도 완주군 봉동읍 완주산단6로 170

■ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 한 제품입니다. 구입 시 사용기간이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통해 교환하여 드립니다.
■ 개정일자 이후 변경된 내용은 식약처 의약품통합정보시스템 (<https://nedrug.mfds.go.kr>)에서 확인하실 수 있습니다.
■ 의약품 부작용 피해구제 신청 : 한국약품안전관리원(1644-6223 또는 14-3330)

소비자상담실 080-700-0052 / <http://www.koreaprime.co.kr>

개정일자: 2026.04.23(Rev.01)

 **한국프라임제약**