

# 건투스정 50밀리그램

프란루카스트수화물

kuhntus Tab.

## 원료약품 및 그 분량 1정 중

- 유효성분: 프란루카스트수화물(미분화)(별규)..... 50.0mg
- 첨가제(동물유래성분): 유당수화물(건강한 소의 우유)
- 기타첨가제: 마크로골15히드록시스테아레이트, 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 오파드라이 II 흰색(85G680009), 저치환도히드록시프로필셀룰로오스, 콜로이드성산화규소, 크로스보미돈, 보미돈, 폴록사머

**성상**  
흰색 또는 연한 노란색의 장방형의 필름코팅정

**효능·효과**  
1. 기관지 천식  
2. 알레르기성 비염

**용법·용량**  
성인 : 프란루카스트수화물로서 1회 50mg을 1일 2회 아침, 저녁 식후 경구투여한다.

증상에 따라 적절한 증감한다.

## 사용상의 주의사항

- 다음 환자에는 투여하지 말 것
  - 1) 이 약 또는 이 약의 구성성분에 과민반응 환자
  - 2) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
- 이상반응
  - 1) 쇼크 : 쇼크 또는 아나필락시스모양 증상(빈도불명)이 나타날 수 있으므로 주의깊게 관찰한다. 혈압저하, 의식장애, 호흡 곤란, 발진 등의 증상이 나타나면, 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.
  - 2) 혈액계 : 백혈구감소(초기증상 : 발열, 인후통, 전신권태감 등), 혈소판감소(초기증상 : 자반, 코피, 치욕출혈 등의 출혈경향)가 나타날 수 있으므로, 이러한 증상이 나타난 경우에는 투여를 중지한다.
  - 3) 간장 : 황달, AST, ALT의 상승 등을 동반하는 간기능장애가 나타날 수 있으므로, 관찰을 충분히 하여 이러한 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다. 때때로 빌리루빈 상승, 드물게 ALP 상승 등이 나타날 수 있다.
  - 4) 호흡기계 : 발열, 기침, 호흡곤란, 흉부 X선 비정상, 호산구증가 등을 수반한 간질성 폐렴과 호산구성 폐렴(0.02%)이 나타날 수 있다. 이러한 증상이 발현될 경우에는 투약을 중지하고 부신피질호르몬 투여와 같은 적절한 처치를 한다.
  - 5) 근육골격계 : 횡문근융해가 나타날 수 있다. 근육통, 무력감, CK(CPK) 상승, 마이오글로빈 상승 등의 증상이 발현될 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다. 또한, 횡문근융해로 인한 급성신장장애의 발생에도 주의해야 한다. 드물게 관절통이 나타날 수 있다.
  - 6) 과민반응 : 때때로 발진, 두드러기, 드물게 가려움, 다형성출혈성반 등이 나타날 수 있으므로 이상이 나타나는 경우에는 투여를 중지하는 등 적절한 처치를 한다.
  - 7) 정신신경계 : 진전, 경련, 흥분, 불안, 때때로 두통, 졸음, 어지러움, 드물게 불면, 자립, 미각이상 등이 나타날 수 있다.
  - 8) 소화기계 : 때때로 구역, 복통, 위부불쾌감, 설사, 드물게 구토, 속쓰림, 식욕부진, 변비, 복부팽만감, 구내염, 혀염, 허파비가 나타날 수 있다.
  - 9) 순환기계 : 드물게 부정맥(빈맥·심방세동·기외수축 등), 심계항진, 흉조가 나타날 수 있다.
  - 10) 비뇨기계 : 드물게 단백뇨, 요잠혈, 빈뇨 빈도불명의 요량감소 및 배뇨장애가 나타날 수 있다.
  - 11) 기타 : 경직, 무력, 체중증가, 유루증, 수전증, 객담증가, 기침, 위장염, 탈모, 월경불순, 드물게 흉부교액감, 부종, 권태감, 트리글리세라이드 상승, 출혈, 호산구증가증, 인두불쾌감, 구갈, 이명이 나타날 수 있다.
- 기관지천식에 사용시
  - (1) 국외(일본)에서 승인시 조사부터 시판후 조사까지 이상반응집계의 대상이 된 4963례중 174례(3.5%)에서 216건의 이상반응(임상검사 이상 포함)이 나타났다. 주요한 것은 발진·가려움에 30례(0.6%), 복통·위부불쾌감이 29례(0.6%), 설사 19례(0.4%), 구역 15례(0.3%), AST·ALT 상승 등의 간기능이상 17례(0.3%), 빌리루빈 상승이 7례(0.1%) 등이다.
  - (2) 국내에서 6년 동안 3,271례를 대상으로 실시한 시판후 조사 결과 160례(4.9%)에서 이상반응이 보고되었고 주된 이상반응은 소화불량 34례(1.0%), 가려움 30례(0.9%) 등이었다.
- 알레르기성 비염에 사용시
  - (1) 국외(일본)에서 승인시 조사부터 시판후 조사까지 이상반응집계의 대상이 된 4277례중 200례(4.7%)에서 258건의 이상반응(임상검사 이상 포함)이 나타났다. 주요한 것은 설사 42례(1.0%), 복통·위부불쾌감 35례(0.8%), 발진·가려움 24례(0.6%), 졸음 17례(0.4%), 구역 13례(0.3%), AST·ALT 상승 등의 간기능이상 8례(0.2%), 빌리루빈 상승 8례(0.2%) 등 이다.
  - (2) 국내에서 4년동안 696례를 대상으로 실시한 시판후조사 결과 4례(0.6%)의 이상반응이 보고되었고, 주된 것은 가려움 2례(0.3%)였다.

## 일반적 주의

- 1) 이 약은 기관지확장제, 스테로이드제 등과는 달리 이미 일어나고 있는 천식발작을 경감시키는 약물이 아니므로, 이것을 환자에게 충분히 설명할 필요가 있다.
- 2) 이 약의 투여중에 대발작이 일어난 경우에는 기관지확장제 또는 스테로이드제를 투여할 필요가 있다.
- 3) 장기 스테로이드요법을 받고 있는 환자 중, 이 약의 투여에 의해 스테로이드를 감당하는 경우에는 충분한 관리하에 천천히 한다.
- 4) 이 약의 투여에 의해 스테로이드 유지량을 감량한 환자 중 이 약의 투여를 중지하는 경우에는 원질환 재발의 우려가 있으므로 주의한다.

- 5) 이 약을 포함하여 류코트리엔길항제 사용시에 Churg-Strauss 증후군과 같은 혈관염이 나타났다는 보고가 있다. 이들 증상은 대체로 경구스테로이드제의 감량·중지시에 나타나고 있다. 이 약 사용시는 호산구수, 혈관염증상(저림, 사지약화, 발열, 관절통, 폐의 침윤 등) 등의 추이에 주의한다.
- 6) 다른 류코트리엔 길항제를 투여 받은 환자에서 인과관계는 명확하지 않으나 우울증, 자살생각, 자살 및 공격적 행동 등의 정신 증상이 보고되었으므로 이 약을 투여한 후 환자의 상태를 주의 깊게 관찰해야 한다.
- 7) 이 약의 투여에 의해 효과가 나타나지 않을 경우에는, 장기간에 걸쳐 투여하지 않도록 주의한다.
4. 상호작용
- 1) 이 약은 in vitro 시험에서 CYP3A4에 의해 대사되어, 이들 약물의 대사를 경쟁적으로 저해하므로 주로 CYP3A4에 의해 대사되는 약물과 병용투여시 주로 CYP3A4에 의해 대사되는 약물의 혈중농도가 상승할 가능성이 있다.
- 2) 이 약의 대사는 in vitro 시험 및 in vivo 시험에서 CYP3A4를 저해하는 약물에 의한 이 약의 대사가 저해된다는 보고가 있으므로 CYP3A4를 저해하는 약물(이트라코나졸, 에리트로마이신 등)과 병용투여시 이 약의 혈중농도가 상승할 가능성이 있다.
5. 임부 및 수유부에 대한 투여
- 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에게는, 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단될 경우에만 투여한다 (임신중의 투여에 관한 안전성은 확립되어 있지 않다).
6. 소아에 대한 투여
- 저체중출생아, 신생아, 영아 또는 소아에 대한 안전성은 확립되어 있지 않다(사용경험이 많지 않다).
7. 고령자에 대한 투여
- 일반적으로 고령자는 생리기능이 저하되어 있으므로 감량(예를 들어, 1회 성인 용량의 1/2을 1일 2회)하는 등 주의한다.
8. 보관 및 취급상의 주의사항
- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 2) 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고원인이 되거나 품질 유지면에서 바람직하지 않으므로 이를 주의한다.
9. 의약품동등성시험 정보 <sup>주1</sup>
- 가. 시험약 프란카스정50밀리그램(프란루카스트수화물)(주)동구바이오제약과 대조약 씨투스정50mg(프란루카스트수화물) [삼아제약(주)]을 2x2 교차시험으로 각 1정씩 건강한 성인에게 공복 시 단회 경구투여하여 57명의 혈중 프란루카스트를 측정한 결과, 비교평가항목치(AUC<sub>i</sub>, C<sub>max</sub>)를 로그 변환하여 통계처리하였을 때, 기하평균비율의 90% 신뢰구간이 80.00 ~ 125.00% 이내로서 생물학적으로 동등함을 입증하였다.

| 구분                                         |                                            | 비교평가항목                              |                             | 참고평가항목                |                       |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                            |                                            | AUC <sub>0-24hr</sub><br>(ng·hr/mL) | C <sub>max</sub><br>(ng/mL) | T <sub>max</sub> (hr) | t <sub>1/2</sub> (hr) |
| 대조약                                        | 씨투스정50mg<br>(프란루카스트수화물)<br>[삼아제약(주)]       | 1515±564                            | 391.8±179.9                 | 2.00<br>[1.00~6.00]   | 3.01±1.29             |
| 시험약                                        | 프란카스정50밀리그램<br>(프란루카스트수화물)<br>[(주)동구바이오제약] | 1466±568                            | 371.4±162.0                 | 2.50<br>[1.00~5.00]   | 2.88±1.26             |
| 기하평균비율의 90% 신뢰구간<br>(기준 : 80.00 ~ 125.00%) |                                            | 89.58 ~ 102.81%                     | 88.77 ~ 101.60%             | —                     | —                     |

(AUC<sub>i</sub>, C<sub>max</sub>, t<sub>1/2</sub>; 평균값±표준편차, T<sub>max</sub>; 중앙값(범위), n=57)

AUC<sub>i</sub>: 투약시간부터 최종혈중농도 정량시간 t까지의 혈중농도-시간곡선하면적

C<sub>max</sub>: 최고혈중농도

T<sub>max</sub>: 최고혈중농도 도달시간

t<sub>1/2</sub>: 말단 소실 반감기

주1. 이 약은 (주)동구바이오제약 프란카스정50밀리그램(프란루카스트수화물)과 동일한 원료를 사용하여 동일한 제조방법으로 전공정을 (주)동구바이오제약에 위탁 제조하였음.

**저장방법** 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

**포장단위** 30정/병, 300정/병

**제조사** (주)동구바이오제약 경기도 화성시 만세구 향남읍 제약공단 2길 18

**제조의뢰자** 건일바이오팜주식회사 충청남도 천안시 서북구 직산읍 거리막길 33 제일동

- 부작용 피해구제 신청 : 한국의약품안전관리원(1644-6223, 14-3330)
  - 반드시 첨부문서를 읽은 후 사용(복용)하시고 첨부문서는 약과 함께 보관하시기 바랍니다.
  - 반드시 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
  - 올바른 사용법을 모르거나 의문사항이 있는 경우 반드시 의사·약사와 상담 후 사용하십시오.
  - 본 제품의 모든 문헌사항(품질관련은 (02)714-0091로 연락하시기 바랍니다.
- 만약 구입시 사용(유효)기한이 지났거나 변질·변패·오염되었거나 손상된 의약품은 약국개설자 및 의약품 판매업자에게만 교환하여 드립니다.
  - 본사는 제조물 책임법 시행에 따라 고객상담 전용창구(전화 080-719-2000)를 운영하고 있습니다.
- 최신 정보 확인방법** : 이 첨부문서 작성년월일 이후 변경된 내용은 홈페이지([www.kuhnibiopharm.com](http://www.kuhnibiopharm.com))에서 확인할 수 있습니다.
  - 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품정보는 의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>)을 참조하시기 바랍니다.

작성년월일: 2026.04.15  
207894(뒤)



건일바이오팜(주)