

투월스_{포점}

근육경련을 한번에!

일반의약품

【원료약품 및 분량】 1정(1248.2 mg)중

▶ 유효성분

벤포티아민(KP)(티아민질산염)으로	사8.2 mg)	50 mg
셀레늄 함유건조 효모(KP)(셀레늄)으로	사3.5 µg)	25 mg
산화마그네슘(KP)(마그네슘)으로서	3015 mg)	500 mg
감마-오리자놀(KP)		5 mg
메코발란민(JP)		1000 µg
산화아연(KP)(아연)으로	사5 mg)	18.7 mg
피리독신염산염(KP)		25 mg
도코페롤아세테이트 2배산(KP)(비타민E)로서	50 I.U)	100 mg
▶ 기타첨가제: 경질무수구산, 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 크로스 폴리머, 탭식도갈색(59B346), 탭식도흰색(19W623), 히드록시프로		

【성상】 갈색의 장방형 필름코팅정

【용법·용량】 성인: 1일 1회, 1회 1정 복용한다.

【효능·효과】

- 다음 경우의 비타민 B1, B6, E의 보급 - 육체피로 - 임신·수유기 - 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하시 - 노년기
- 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같다. - 다음 증상의 완화: 신경통, 근육통, 관절통(요(허리)통, 어깨결림 등) - 각기 - 눈의피로
- 마그네슘결핍으로 인한 근육경련
- 아연의 보급

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

- 1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자 2) 만 12개월 미만의 젖 먹이 3) 심한 증상의 신부전 환자 4) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자 5) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.

- 1) 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제 2) 레보도파

3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의 할 것.

- 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자 2) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아 3) 소화성궤양, 만성궤양성대장염, 국한성 대장염 등의 위장질환 환자 4) 심장·순환 기계기능 장애 환자 5) 신장장애 환자 6) 저단백혈증 환자 7) 임부 8) 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 혈장염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성유제를 신중히 투여해야 하는 환자

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 중단하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

- 1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우: 구역, 구토, 팽·호흡시 작칙, 묽은 변, 발적, 발진, 변비, 상복부통증, 설사, 소화장애, 위부불쾌감, 위장관장애, 저혈압, 조급증, 탈모, 폐부종, 피부염 2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있다. 3) 에스트로겐을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전성 소인이 있는 환자가 비타민 E를 복용할 경우 혈전증의 위험이 증가될 수 있다. 4) 피리독신을 1일 500 mg ~ 2 g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy: 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있다. 5) 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B12를 1일 10 µg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있다. 6) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈성부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다. 7) 항알도스테론제, 트리암테네과 병용투여시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것. 8) 우발적으로 과량복용 한 경우 9) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것. 2) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피할 것. 3) 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장한다. 이 점검을 통해 지방의 체외 배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절한다. 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 한다.

6. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것. 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에(밀폐하여) 보관할 것. 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

【저장방법】 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

【사용기한】 제조일로부터 36개월

【포장단위】 120정/상자(60정/병×2)

【제조·외의자】 한솔신약(주) 충청북도 음성군 금왕읍 청평길 2-11

【제조자】 (주)시어스제약 경기도 화성시 만세구 향남읍 발안공단로 32

【판매자】 일일약품(주) 경기도 용인시 기흥구 하갈로 110

※ 본 제품은 우수의약품 제조 및 품질관리기준(KGMP)에 따라 제조 및 품질검사를 필한 제품입니다. 만약 구입하신 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패, 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입하신 약국을 통해 교환하여 드립니다.

※ 본 제품의 기타 자세한 정보는 본사(043)881-6333으로 문의하시거나 또는 의약품통합정보시스템(<https://hedrug.mfds.go.kr>)에서 확인할 수 있습니다.

※ 부작용 피해구제 신청: 한국 의약품안전관리원(1644-6223, 14-3330)

개정연월일: 2026.05.12

한솔신약(주)
Hansol Pharm., Co., Ltd.

(주)시어스제약