

## 일반의약품

해열 진통, 소염까지 모두 잡은 **종합감기약**

**모드콜**<sup>®</sup> **이부프로펜**  
연질캡슐

몸살감기 | 코감기 | 목감기

제품정보 QR코드



※ 이 약을 복용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽으시고 약과 함께 보관하십시오.

### [원료약품 및 분량] 1캡슐 중

· **유효성분**: 이부프로펜(KP) 75mg, dL-메틸에페드린염산염(KP) 12.5mg, 구아이페네신(KP) 41.6mg, 덱스트로메토르판브롬화수소산염수화물(KP) 8mg, 슈도에페드린염산염(USP) 15mg, 클로르페니라민말레산염(KP) 1.25mg, 브로페신염산염(BP) 2mg  
· **기타 첨가제**: 디에틸렌글리콜모노메틸에테르, 부분탈수유동소르비톨, 부틸하이드록시톨루엔, 수산화칼륨, 정제수, 젤라틴, 포비돈, 폴리소르베이트80, 폴리에틸렌글리콜400, 홍화황색소

[성상] 미황색 내지 노란색의 투명한 내용물을 함유한 노란색 투명한 타원형 연질캡슐

[효능·효과] 감기의 증상(콧물, 코막힘, 재채기, 인후(목구멍)통, 기침, 가래, 오한(춥고 떨리는 증상), 발열, 두통, 관절통, 근육통)의 완화

### [용법·용량]

| 구 분                | 용법·용량                    |
|--------------------|--------------------------|
| 만 15세 이상 및 성인      | 1일 3회, 1회 2캡슐 식후 30분에 복용 |
| 만 8세 이상 ~ 만 15세 미만 | 1일 3회, 1회 1캡슐 식후 30분에 복용 |

### [사용상의 주의사항]

#### 1. 경고

슈도에페드린 함유 제제 복용 시 급성 전신성 발진성 농포증(AGEP)과 같은 중증 피부 이상반응이 나타날 수 있습니다. 발열, 홍반(붉은 반점), 다수의 작은 농포(고름물집)와 같은 증상이 관찰될 경우 이 약의 복용을 중단하고 의사 또는 약사와 상의해야 합니다.

#### 2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.

- 이 약 및 이 약의 구성성분에 대한 과민반응 및 그 병력이 있는 사람
- 이 약 및 이 약의 구성성분, 다른 해열진통제, 감기약 복용 시 전식을 일으킨 적이 있는 사람
- 만 3개월 미만의 영아(갓난아기)
- MAO억제제(항우울제, 항정신병제, 감정조절제, 항파킨슨제 등)를 복용하고 있거나 복용을 중단한 후 2주 이내의 사람
- 중증 또는 조절되지 않는 고혈압 환자
- 중증 급성 또는 만성 신장질환/신부전 환자

#### 3. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 마십시오.

진해(기침을 그치게 함)거담제(가래약), 다른 감기약, 해열진통제, 진정제, 항히스타민제를 함유하는 내복약(비염용 경구제, 멸미약, 알레르기용약)

#### 4. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.

- 수두 또는 인플루엔자에 감염되어 있거나 또는 의심되는 영아(갓난아기) 및 만 15세 미만의 어린이(구역이나 구토를 수반하는 행동의 변화가 있다면, 드물지만 심각한 질병인 레이중후군의 초기 증상일 수 있으므로 의사와 상의하십시오.)
- 슈도에페드린 성분과 관련하여 허혈성 대장염의 증상(급격한 복통(배아픔), 직장 출혈 등)이 발현될 경우
- 본인, 양친 또는 형제 등이 두드러기, 접촉성 피부염, 기관지천식, 알레르기성비염, 편두통, 음식물 알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람
- 지금까지 약에 의해 알레르기 증상(예: 발열, 발진, 관절통, 천식, 가려움증 등)을 일으킨 적이 있는 사람
- 간장질환, 신장질환, 심장질환, 갑상선질환, 당뇨병, 고혈압, 녹내장(예: 눈의 통증, 눈이 침침함 등), 배뇨(소변을 놓)곤란 등이 있는 사람, 고령자, 몸이 약한 사람 또는 고령이 있는 사람
- 속쓰림, 위부불쾌감, 위통과 같은 위장문제가 지속 혹은 재발되거나 궤양, 출혈문제를 가지고 있는 사람
- 구토와 설사로 많은 수분을 손실하거나 수분을 흡수하지 않는 사람 또는 이뇨제를 복용하는 사람
- 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부
- 의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람(당뇨약, 통풍약, 관절염약, 항응고제, 스테로이드제 등 다른 약물을 투여 받고 있는 사람)

10) 다음과 같은 기침이 있는 사람

흡연, 천식, 만성 기관지염, 폐기종, 과도한 가래가 동반되는 기침, 1주 이상 지속 또는 재발되는 기침, 만성 기침, 발열·발진이나 지속적인 두통이 동반되는 기침

#### 5. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오.

- 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우  
발진·발적, 가려움, 구역·구토, 식욕부진, 변비, 위통, 소화관출혈, 위부불쾌감, 부종(부기), 배뇨(소변을 놓)곤란, 목마름(지속적이거나 심한), 어지러움, 불안, 떨림, 불면
- 이 약의 복용에 의해 드물게 아래의 중증 증상이 나타난 경우
  - 속(아나필락시)(과민성 쇼크): 복용후 바로 두드러기, 부종(부기), 가슴답답함 등과 함께 안색이 창백하고, 손발이 차고, 식은땀, 숨쉬기 곤란 등이 나타날 수 있습니다.
  - 피부점막안종후군(스티븐스-존슨증후군), 중독성표피괴사증후(리엘증후군): 고열을 동반하고, 발진·발적(충혈되어 붉어짐), 화상과 같이 물집이 생기는 등의 심한 증상이 전신피부, 입이나 눈점막에 나타날 수 있습니다.
  - 천식
  - 가역적(회복가능한) 후뇌 병증 증후군 및 가역적 뇌혈관 수축 증후군: 갑작스러운 심한 두통, 번개 두통, 구역, 구토, 혼돈, 발작, 시각 장애 등이 발현될 수 있습니다.
  - 심장: 코니스 증후군(빈도불명)
- 5~6회 복용하여도 증상이 좋아지지 않을 경우

#### 6. 소아에 대한 투여

만 2세 미만에게 투여하지 않습니다. 다만, 꼭 필요한 경우 의사의 진료를 받으십시오.

#### 7. 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항

- 정해진 용법·용량을 잘 지켜십시오.
- 장기간 계속 복용하지 마십시오.
- 어린이에게 복용시킬 경우에는 보호자의 지도 감독 하에 복용시키십시오.
- 복용시에는 음주하지 마십시오.
- 복용하는 동안 졸음이 오는 경우가 있으므로 자동차 운전 또는 기계류의 운전 조작을 피하십시오.
- 동물실험에서 브로페신염산염을 장기간 다량 연속 투여할 경우 혈청 중에 아미노산전이효소와 가래양이 일시적으로 상승한다는 보고가 있습니다.
- 이 약을 복용하면 일시적으로 가래 양이 증가하는 경우가 있습니다.
- 이 약 투여 환자에서 코니스 증후군 사례가 보고되었습니다. 코니스 증후군은 관상동맥 수축과 관련이 있는 알레르기 또는 과민반응 후 발생하는 심혈관계 증상으로 심근경색을 초래할 수 있습니다.

#### 8. 저장상의 주의사항

- 어린이의 손에 닿지 않는 장소에 보관하십시오.
- 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관하십시오.
- 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

[저장방법] 기밀용기, 실온보관(1~30°C)

[포장단위] 10캡슐/PTP

[제조회자] (주)종근당 / 충청남도 천안시 서북구 성거읍 망향로 797-48

[제조자1] (주)알피바이오 / 경기도 화성시 만세구 향남읍 제약공단4길 35-7

[제조자2] (주)알피바이오 / 경기도 화성시 만세구 마도면 청원산단5길 60(1층, 2층일부, 3층일부)

[소비자상담실] 080-6776-080(수신자부담)

[제품 상세 정보] [www.ckdpharm.com](http://www.ckdpharm.com) 참조

구입시 사용기간이 경과되었거나 변질, 변태 또는 오손된 제품은 사용하지 마시고 구입하신 곳에서 교환하십시오.

약은 어린이의 손이 닿지 않도록 보관해야 합니다.

KGMP(우수약품 제조 및 품질관리기준) 적격업소 제품

※ 제품 사용 후 이상반응(부작용)이 발생된 경우 한국의약품안전관리원(1644-6223)에 부작용 피해구제 신청을 할 수 있습니다.

※ 이 첨부문서 작성일자(2026.05.13) 이후 변경된 내용은 종근당 인터넷 홈페이지([www.ckdpharm.com](http://www.ckdpharm.com))나 소비자 상담전화(080-6776-080)를 통해 확인할 수 있습니다.

◎ = 등록상표 101



**종근당**

