

위산과다·속쓰림 치료엔

속크린^정

☑ 위산과다 ☑ 위부팽만감
 ☑ 소화불량 ☑ 위통·체함
 ☑ 속쓰림 ☑ 신트림

이 내용은 소비자의 안전한 선택을 위해 허가사항을 요약한 것으로 복용 전 반드시 “첨부문서”를 확인할 것.

【원료약품 및 분량】 1정(1,015 mg)중

■ 유효성분

진피(KP)	11 mg	육계(KP)	46 mg
회향(KP)	12 mg	육두구(KP)	10 mg
정향(KP)	6 mg	겐티아나(KP)	7.5 mg
고목(KP)	7.5 mg	탄산수소나트륨(KP)	320 mg
침강탄산칼슘(KP)	70 mg		
탄산마그네슘(KP)	13.0 mg(산화마그네슘으로서 5.46 mg)		
합성규산알루미늄(KP)	136.7 mg		
디아스타제·프로테아제·셀룰라제(KP)	20 mg(전분당화력 250단위/일 이상)		

■ 동물유래성분 : 유당수화물(소/우유)

■ 기타첨가제 : L-멘톨, 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 전분글리콜산나트륨, 탭실드흰색(11W287), 포비돈, 히드록시프로필셀룰로오스

【성상】 백색의 장방형 필름코팅정

【효능·효과】 위산과다, 속쓰림, 위부불쾌감, 위부팽만감, 체함, 구역, 구토, 위통, 신트림, 식욕감퇴(식욕부진), 소화불량, 과식, 소화촉진, 소화 불량으로 인한 위부팽만감

【용법·용량】 만 15세 이상 : 1회 2정, 1일 3회 식후 30분에 복용한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

1) 투석요법을 받고 있는 환자 2) 만 7세 이하의 어린이 3) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.

1) 테트라사이클린계 항생제

3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

1) 신장(콩팥)장애 환자 2) 본인 또는 가족이 알레르기 체질인 사람 3) 다른 약물을 복용하고 있는 사람

4. 다음과 같은 사람(경우) 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 이 첨부문서를 소지할 것.

1) 이 약을 복용하는 동안 변비 또는 설사의 증상이 나타날 경우 2) 2주 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항

1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것. 2) 나트륨 제한 식이를 하는 사람

6. 저장상의 주의사항

1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것. 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에(밀폐하여) 보관할 것.

3) 오용(잘못사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

【저장방법】 밀폐용기, 실온 보관(1~30℃) 【사용기간】 제조일로부터 36개월 【포장단위】 10정/피티피, 20정/피티피, 100정/피티피

※ 본 제품은 우수약품 제조 및 품질관리기준(KGMP)에 따라 제조 및 품질검사를 필한 제품입니다. 만약 구입 시 사용기한이 경과 되었거나 변질, 변패, 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입하신 약국을 통해 교환하여 드립니다. ※ 본 제품의 기타 자세한 정보는 본사 (043)881-6333으로 문의하시거나 또는 의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>)에서 확인할 수 있습니다. ※ 부작용 피해구제 신청 : 한국약품안전관리원(1644-6223, 14-3330)